

sante Ø at kende med Selvsyn, ligesom det ogsaa vilde være heldigt, om vore egne geografiske Forfattere vilde tage det ingenlunde utaknemlige Arbejde op at udføre grundige Beskrivelser af Øens Natur og Menneskeliv.

O. B. Bøggild.

Arnold Heim: Über Grönlands Eisberge. Neujahrsblatt d. Naturf. Gesell. Zürich auf das Jahr 1911. (1—7, 4 Tvl.)

Giver nogle ganske overordentlig pragtfulde Billeder af Isbjerge fra Nordgrønland, vistnok de smukkeste Reproduktioner, der eksisterer af saadanne. I den meget kortfattede Tekst indeles Isbjærgene i flere Typer, begyndende med den flade, tavleformede og endende med den ganske uregelmæssig formede; endvidere gives en Beskrivelse af det i alle Retninger storslaaede Skuespil, som en isbjærgfyldt Fjord frembyder.

O. B. Bøggild.

Wm. Herbert Hobbs: Characteristics of the Inlandice of the arctic Regions. Philadelphia. The Amer. Philos. Soc. 49, Nr. 194, 1910. (57—129, 5 Tvl.)

I denne Afhandling gives en let læselig og interessant, sammenfattende Fremstilling af hvad man ved om arktiske Gletsjere. Som Kilder er væsentlig benyttede alle mulige arktiske Rejseberetninger, og det eneste nye er vistnok enkelte af de Betragtninger, som Forfatteren knytter dertil. Efter en kortere Gennemgang af de øvrige Omraader drejer Fremstillingen sig udelukkende om Grönlands Indlandsis, hvis Form, Overfladeforhold, Aflejringer

m. m. gennemgaas. Den sidste Halvdel af Afhandlingen behandler, hvad man kan kalde Indlandsisens »Regnskab«, Forholdet mellem dens Indtægter og Udgifter; de første repræsenteres væsentlig af Snefaldet paa dens Overflade, de sidste af Afsmeltningen og Udstødelsen af Isbjerge. Afhandlingen er ledsaget af talrige Kort og Figurer, for største Delen kendte fra tidligere Værker.

O. B. Bøggild.

M. C. Engell: Über die Entstehung der Eisberge. Berlin. Zeitschr. d. Gletscherkunde, 5, 1910. (122—132).

Giver en klar Oversigt over de forskellige Maader, paa hvilke Isbjerge kan dannes, paa Grundlag, dels af Forfatterens egne Iagttagelser i Nordgrønland, dels af den foreliggende Literatur over dette Emne. Tre Dannelsesmaader kan betragtes som sikkert konstaterede: 1) ved Nedstyrtning fra Gletsjernes øverste Del, som kan blive overhængende, enten ved at Bevægelseshastigheden er større foroven end forneden, eller ved at Isen undermineres af Vandet; den Slags Isbjerge, der herved dannes, er smaa og gaar i Reglen under Betegnelsen Kalvis. 2) Ved Opdrift; Gletsjernes forreste Ende presses ud paa saa dybt Vand, at den, naar den gaar løs fra den øvrige Del af Gletsjeren, stiger til Vejrs og bliver til et Isbjærg. Denne Dannelsesmaade er ikke iagttaget af Forfatteren selv, men derimod af Drygalski. 3) Kalvning ved Udflyden af større Stykker af den paa Fjorden svømmende Gletsjerende; herved dannes flade Isbjerge, der er karakteristiske ved, at de har samme Højde som Gletsjeren selv, og at de har en ujævn, takket Overflade; de er i det hele sjældne.

O. B. Bøggild.

Ny Literatur.

(Indkommet til Det kongelige danske geografiske Selskab.)

Evropa.

Beretning til Landbrugsministeriet fra Den danske biol. Station. Bd. XX 1911. 4°, 73 S. med Tabeller og Kort.

Norges Geologi, Dr. Hans Reusch, 1910. 8°, 196 S. med Illustr. og 3 Kort.

Vers L'Italiè, Turin, Exposition, Internat. G. Le Bourgeois & Cie 1911, 8°, 31 S.

Espagna, Portugal, Maroc, G. Le Bourgeois & Cie, 8°, 31 S.