

	Indførsel i Tusinder cwts. af:		
	Oksekød	Faarekød	Svinekød
Nordamerikas Forenede Stater	3361	42	3645
Britisk Nordamerika	799	7	1351
Argentina	3628	1558	•
Australien	155	672	•
Ny Zealand.....	355	1757	1
Holland	4	267	418
Danmark	10	6	2253

I ovenstaaende Oversigt er der forbigaaet de Lande, hvis Kødsalg til England er af mindre Betydning (Uruguay, Belgien, Tyskland osv.). Tyskland udførte i Halvfjerds-erne og Firserne et ikke ringe Kvantum Kød til England (navnlig Flæsk), men fra 1884, da Vægten androg over 1 Mill. cwts., gik Tallene tilbage Aar for Aar, og nu er den tyske Kødudførsel til England kun en halv Snes Tusind cwts. aarlig.

Hvad særlig Flæskeindførselen angaar, har United States i de senere Aar tabt i Betydning som Leverandør; i 1898 og 1899 var Mængden $6\frac{1}{3}$ Mill. cwts. aarlig, nu kun godt $3\frac{1}{2}$ Mill. Derimod sender Canada en stigende Mængde Flæsk til England: i 1889 ca. 1 Mill. cwts., nu over 2 Mill. Hollands Flæskeeksport til England var indtil Slutningen af Firserne ubetydelig, men fra Aar 1900 andrager den fra $\frac{1}{3}$ til noget over $\frac{1}{2}$ Mill. cwts. aarlig. Fra Danmark har England derimod modtaget en stadig stigende Mængde Svinekød: i Slutningen af Halvfjerds-erne $\frac{1}{3}$ Mill. cwts. aarlig, i Slutningen af Firserne 1 Mill., i Slutningen af Halvfemserne $1\frac{1}{2}$ Mill. og nu over 2 Mill.

III.

Legemskonstitutionens Arvelighed.

Der er for nylig offentliggjort nogle interessante Undersøgelser til Belysning af Spørgsmaalet om, i hvilket Omfang Forældrenes mere eller mindre kraftige Konstitu-

tion nedarves paa Børnene. *) Paa Grundlag af en stor Mængde Familiemonografier har man beregnet Børnenes Dødelighed efter den af Moderen, resp. Faderen opnaaede Alder. Man har f. Eks. delt Familierne i følgende 5 Grupper:

1. Moderen død før det fyldte 38te Aar
2. — — i Alderen 39—53 Aar
3. — — — 54—68 —
4. — — — 69—83 —
5. — — efter det fyldte 83de Aar.

Dernæst har man undersøgt, hvor mange af 100 levendefødte Pigebørn i hver af disse 5 Grupper, der døde før det fyldte 6te Aar. Resultatet var, at i første Gruppe, hvor Moderen var død i ung Alder, døde over Halvdelen af Børnene (52 %) inden 6 Aars Alderen; i anden Gruppe var Børnedødeligheden vel ogsaa betydelig, men dog langt mindre end i den første, idet knap to Femtedele (38 %) af Børnene døde før 6 Aars Alderen. Tredje Gruppe, altsaa Børnene af de Mødre, der døde mellem 54 og 68 Aars Alderen, havde en endnu lavere Dødelighed, idet kun imellem en Tredjedel og en Fjerdedel (30 %) døde, inden de blev 6 Aar. I Fjerde Gruppe var det tilsvarende Tal gaaet ned til 20 %. Endelig havde de Mødre, der blev meget gamle (over 83 Aar), saa levedygtigt Afkom, at kun lidt over en Tiendedel (11 %) døde før 6 Aars Alderen.

Paa samme Maade har man for de samme fem Grupper af Familier undersøgt Dødeligheden for de Børn, der overlevede det 5te Aar. Af disse blev i den første Gruppe kun 21 % over 63 Aar, men i femte Gruppe var det 41 %, der opnaaede denne Alder.

Ganske tilsvarende Resultater har man fundet ved en Gruppering af Familierne efter Faderens Levealder.

*) K. Pearson, Ueber Zweck und Bedeutung einer nationalen Rassenhygiene für den Staat, (Arch. f. Rassen- und Ges.-Biol. Bd. 5, 1908, S. 67. Cit. af Prinzing i Conrads Jahrbücher, Sept. 1909).