

ANTALLET AF SYGEDAGE I DEN DANSKE BEFOLKNING I ALDERSKLASSERNE 15—74 AAR

Af

Povl Heiberg,
Dr. med., Vicesadslæge.

For de 2 Tiaar 1890—1899 og 1900—1909 kan man ved at benytte de tyske Letalitetstavler¹⁾ og de danske Erfaringer om Dødeligheden ad to noget forskellige Veje udfinde det aarlige Antal af Sygedage i den danske Befolkning mellem 15 og 75 Aar.

Man kan nemlig enten regne gennem de 6 tiaarige Aldersklasser mellem 15 og 74 Aar eller ved sine Beregninger benytte Dødsaarsagerne indenfor de 3 tyveaarige Aldersklasser mellem 15 og 74 Aar.

I de to omstaaende Tabeller, Tabel I og Tabel II, er vist de Resultater, som man faar ved at gaa de to omtalte Veje.

Beregningen i Tabel I — altsaa gennem de 6 tiaarige Aldersklasser — er sikkert den mindst upaalidelige, men det har dog ogsaa nogen Interesse at

¹⁾ En Letalitetstavle angiver det Antal Sygedage, der indenfor de forskellige Aldersklasser eller de forskellige Sygdomsgrupper svarer til et Dødsfald.

ANTALLET AF SYGEDAGE I DEN DANSKE BEFOLKNING I ALDERSKLASSERNE 15—74 AAR

Af

Povl Heiberg,
Dr. med., Vicesadslæge.

For de 2 Tiaar 1890—1899 og 1900—1909 kan man ved at benytte de tyske Letalitetstavler¹⁾ og de danske Erfaringer om Dødeligheden ad to noget forskellige Veje udfinde det aarlige Antal af Sygedage i den danske Befolkning mellem 15 og 75 Aar.

Man kan nemlig enten regne gennem de 6 tiaarige Aldersklasser mellem 15 og 74 Aar eller ved sine Beregninger benytte Dødsarsagerne indenfor de 3 tyveaarige Aldersklasser mellem 15 og 74 Aar.

I de to omstaaende Tabeller, Tabel I og Tabel II, er vist de Resultater, som man faar ved at gaa de to omtalte Veje.

Beregningen i Tabel I — altsaa gennem de 6 tiaarige Aldersklasser — er sikkert den mindst upaalidelige, men det har dog ogsaa nogen Interesse at

¹⁾ En Letalitetstavle angiver det Antal Sygedage, der indenfor de forskellige Aldersklasser eller de forskellige Sygdomsgrupper svarer til et Dødsfald.

Tabel I. Det samlede Antal af Sygedage¹⁾ i de 6 tiaarige Aldersklasser fra 15—74 Aar og i Aldersklassen 15—74 Aar.

Aldersklasser	1890—1899 aarlig				1900—1909 aarlig			
	Hovedstaden	Provinsbyerne	Landdistrikterne	Hele Landet	Hovedstaden	Provinsbyerne	Landdistrikterne	Hele Landet
Mænd (Tusind Dage)								
15—24	297	299	1 150	1 747	292	278	943	1 513
25—34	298	221	688	1 207	338	238	607	1 183
35—44	320	213	1 556	1 089	340	208	487	1 035
45—54	284	210	634	1 127	363	228	579	1 170
55—64	237	224	814	1 275	310	235	747	1 292
65—74	197	225	1 083	1 515	240	265	987	1 491
15—74	1 633	1 402	4 925	7 960	1 883	1 453	4 349	7 686
Kvinder (Tusind Dage)								
15—24	273	330	1 424	2 027	318	379	1 238	1 935
25—34	385	367	1 266	2 019	429	379	1 145	1 952
35—44	497	424	1 431	2 353	556	427	1 229	2 212
45—54	334	260	977	1 571	438	315	867	1 620
55—64	295	265	1 068	1 629	355	305	983	1 642
65—74	261	282	1 191	1 734	319	312	1 086	1 717
15—74	2 046	1 929	7 358	11 333	2 415	2 116	6 548	11 079

se, hvor lidt Resultaterne i Tabel II afviger fra dem i Tabel I, uagtet Sygdomsgruppen „Selvmord“ her i Landet, navnlig for Mændenes Vedkommende, indfører et særligt stærkt forstyrrende Moment ved sin relativ

¹⁾ I Tabel I og II er Tallene afrundede til Tusinder efter at Beregningerne er udførte.

store Størrelse, og uagtet flere af Sygdomsgruppernes Letalitetstal, navnlig for Kvindernes Vedkommende, kun er baserede paa et ret ringe Materiale¹⁾.

For hele Landet er Antallet af Sygedage i Aldersklasserne 15—74 Aar i begge de to Tiaar 1890—1899 og 1900—1909 omtrent 19 Millioner — i det først nævnte Tiaar $\frac{1}{4}$ Million over og i det sidst nævnte $\frac{1}{4}$ Million under de 19 Millioner.

I Hovedstaden er Tallet af Sygedage i de undersøgte Aldersklasser steget fra 3.8 Millioner i det første Tiaar til 4.3 Millioner i det andet Tiaar. I Provinsbyerne er Stigningen fra 3.3 til 3.6 Millioner, medens der derimod i Landdistrikterne fra det første til det andet Tiaar er sket et Fald i Sygedagenes Tal fra 12.3 til 10.9 Millioner.

Af de omtrent 8 Millioner Sygedage, som for hele Landets Vedkommende falder paa Mændene, tager i Tiaaret 1890—1899 Hovedstaden 1.6, Provinsbyerne 1.4 og Landdistrikterne 4.9 Millioner, medens i Tiaaret 1900—1909 Hovedstaden tager 1.9, Provinsbyerne atter 1.4 og Landdistrikterne 4.3 Millioner. Af de omtrent 11 Millioner Sygedage, der falder paa Kvinderne i hele Landet, bruger i det først nævnte Tiaar Hovedstadens Kvinder 2.0, Kvinderne i Provinsbyerne 1.9 og Kvinderne i Landdistrikterne 7.4 Millioner, medens i det sidst nævnte Tiaar de tilsvarende Tal er henholdsvis 2.4, 2.1 og 6.5 Millioner.

Regner man Udgiften og det økonomiske Tab ved hver Sygedag blot til 4 Kroner, har altsaa Hoved-

¹⁾ Se Letalitetstavlen i „Sygelighed i By og paa Land o. s. v.“ Ugeskrift for Læger 1915, S. 1230.

stadens aarlige Tab paa Grund af Sygdom i de arbejdende Aldersklasser i de to undersøgte Tidsperioder været henholdsvis 15 og 17 Millioner Kr. Provinsbyernes tilsvarende aarlige Tab maa sættes til henholdsvis 13 og 14 Millioner Kr., medens Landdistrikternes aarlige Tab maa sættes til henholdsvis 19 og 44 Millioner Kr.

I den foran citerede Artikel: „Sygelighed i By og paa Land“ er der gjort Rede for den forskellige Sygelighed (maalt ved det aarlige Antal af Sygedage pr. 100 Individer) i Hovedstaden, i Provinsbyerne og paa Landet, men ved Siden af de der anførte relative Tal turde de her offentliggjorte absolute Tal ogsaa frembyde nogen Interesse, navnlig i nationaløkonomisk Henseende og desuden ved Sammenligninger f. Eks. med det Antal Sygedage, som vore Sygekasser betaler for, eller med det Antal Dage, som vor Arbejdsløshedsstatistik opviser.

I Tabel II er endvidere vist den procentvise Andel, som de enkelte Sygdomsgrupper har i det samlede Antal af Sygedage. Man lægger Mærke til, at de smitsomme Sygdomme i det sidste Tiaar spiller en langt mindre Rolle end i det første.

At Tuberkulosen kun tager 4—8 % af samtlige Sygedage, hænger sikkert sammen med, at de benyttede Letalitetstavler er udarbejdede efter et Erfaringsmateriale, der er indhøstet inden Sanatoriebehandlingen af arbejdsdygtige Tuberkuløse tog Fart. Overhovedet maa man ved Bedømmelsen af disse Tal huske, at en Sygedag betyder en tabt Arbejdsdag, og at derfor en Sammenligning mellem de for Mænd og de for Kvinder fundne Tal kun kan gøres med meget stor Varsomhed.