

Vielser, Fødsler og Dødsfald i Danmark.

Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk, 4de R. Litr. A. Nr. 2.
 Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1875—79 samt Dødsaa-
 rsagerne i Aarene 1876—79. Udgivet af det statistiske Bureau.
 Kbhvn. 1882.

Antallet af **Vielser** var i Kongeriget i Aarene 1875—79
 76,105, nemlig:

i Kjøbenhavn.....	11,304,
i Kjøbstæderne	10,242,
i Landdistrikterne	54,559.

I det foregaaende Femaar, 1870—74, havde det samlede Antal af Vielser været 70,131, i hele Tiaaret 1870—79 altsaa tilsammen 146,236 Vielser. Dette Tal er næsten 15 pCt. (nøjagtig 14,9) højere end Tallet paa Vielser i det foregaaende Tiaar, 1860—69, da Vielsestallet kun var 127,287. Men denne Tilvæxt skyldes hovedsagelig Kjøbenhavn, hvor den stærke Befolkningstilvæxt medførte, at Tallet paa Vielser gik op fra 14,131 i 1860—69 til 20,079 i 1870—79, altsaa en Tilvæxt paa 42,1 pCt. I Kjøbstæderne var Tilvæksten kun 24,1, og i Landdistrikterne endog kun 9,6 pCt.

Det aarlige Gjennemsnitstal af Vielser var i 1870—79 14,623; dybest under Gjennemsnittet staar 1870 med 13,134 Vielser; højest over Gjennemsnittet

Vielser, Fødsler og Dødsfald i Danmark.

Danmarks Statistik. Statistisk Tabelværk, 4de R. Litr. A. Nr. 2.
 Vielser, Fødsler og Dødsfald i Aarene 1875—79 samt Dødsaa-
 rsagerne i Aarene 1876—79. Udgivet af det statistiske Bureau.
 Kbhvn. 1882.

Antallet af **Vielser** var i Kongeriget i Aarene 1875—79
 76,105, nemlig:

i Kjøbenhavn.....	11,304,
i Kjøbstæderne	10,242,
i Landdistrikterne	54,559.

I det foregaaende Femaar, 1870—74, havde det samlede Antal af Vielser været 70,131, i hele Tiaaret 1870—79 altsaa tilsammen 146,236 Vielser. Dette Tal er næsten 15 pCt. (nøjagtig 14,9) højere end Tallet paa Vielser i det foregaaende Tiaar, 1860—69, da Vielsestallet kun var 127,287. Men denne Tilvæxt skyldes hovedsagelig Kjøbenhavn, hvor den stærke Befolkningstilvæxt medførte, at Tallet paa Vielser gik op fra 14,131 i 1860—69 til 20,079 i 1870—79, altsaa en Tilvæxt paa 42,1 pCt. I Kjøbstæderne var Tilvæksten kun 24,1, og i Landdistrikterne endog kun 9,6 pCt.

Det aarlige Gjennemsnitstal af Vielser var i 1870—79 14,623; dybest under Gjennemsnittet staar 1870 med 13,134 Vielser; højest over Gjennemsnittet

staa Aarene 1874—77, især Aaret 1876 med 16,180 Vielser.

Vielsernes Antal er i 1870—79 forholdsvis steget c. 4 pCt. ligeoverfor 1860—69; der kom nemlig

	1860—69	1870—79
paa 10,000 Mennesker	150 Viede	156 Viede
eller 1 Vielse paa ...	133 Mennesker	128 Mennesker

Mellem 1000 ægteviede Mænd og Kvinder var i 1875—79 Aldersfordelingen saaledes:

i en Alder	Mænd	Kvinder
under 20 Aar	»	69
mellem 20 og 25 Aar	233	377
— 25 - 30 —	379	299
— 30 - 35 —	190	135
— 35 - 40 —	89	59
— 40 - 45 —	45	32
— 45 - 50 —	26	16
— 50 - 55 —	17	8
— 55 - 60 —	11	4
— 60 - 65 —	6	1
— 65 - 70 —	3	0
over 70 Aar	1	0
	1000	1000

Gjennemsnitsalderen for viede Mænd er omtrent 31 Aar, for viede Kvinder 27 à 28 Aar. Gjennemsnitsalderen er siden 1855 stadig bleven noget yngre.

Af 100 Vielser i 1870—79 var godt 30 mellem Individier af samme Aldersklasse; ved næsten 52 pCt. af Vielserne er Manden ældre end Kvinden, medens 18 pCt. falde paa de Vielser, hvor Kvinden er ældst.

I 1875—79 vare de Viedes Forhold til tidligere Ægteskab saaledes:

Af hver 1000 Vielser var:

Ungkarle	med Piger.....	830
—	— Enker.....	42
—	— fraskilte Koner	4
Enkemænd	— Piger.....	94
—	— Enker.....	22
—	— fraskilte Koner	2
Fraskilte Mænd	— Piger.....	5
—	— Enker.....	1
—	— fraskilte Koner	0,3

En Sammenligning med de foregaaende Femaar udviser, at det er Ægteskaberne mellem Ungkarle og Piger, der ere tiltagne, medens de andre Forbindelser forholdsvis ere aftagne.

Af de i 1875—79 viede 76,105 Mænd viedes

1ste Gang.....	66,661
2den —	8,820
3dje —	582
4de — (eller derover).....	42

Af de 76,105 Kvinder indtraadte i Ægteskab

1ste Gang.....	70,706
2den —	5,182
3dje —	209
4de — (eller derover).....	8

Hvad angaaar Aarstidernes Forhold til Ægteskabs Indgaaelse, er at bemærke, at i Foraars- og Efteraarsmaanederne, og navnlig da i Maj og November, falde de fleste Vielser, hvad nedenstaaende Oversigt udviser.

Af 100 Vielser falde paa en Dag i

	1870—74	1875—79
Januar.....	4,53	4,33
Februar.....	5,63	5,40
Marts.....	6,93	6,58

	1870—74	1875—79
April.....	10,00	9,68
Maj.....	12,77	13,48
Juni.....	7,54	7,47
Juli.....	5,79	5,45
Avgust.....	4,39	4,30
September.....	5,79	5,71
Oktober.....	10,55	10,93
November.....	15,69	16,75
December.....	10,37	9,92
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00

Fødslernes Antal var i 1875—79 ialt 317,037 (d. v. s. saa mange Børn fødtes), eller i aarligt Gjennemsnit 63,407. Sammenlignes Fødslernes Antal med Folketallet, ses det, at der i 1870—79 (ligesom i det foregaaende Tiaar) paa 1000 Mennesker kom 32,2 Fødsler, for hele Landet. I Kjøbenhavn var Forholdstallet 34,3, i Kjøbstæderne 32,5 og i Landdistrikterne 31,9. Sammenlignes Fødslernes Antal med Tallet paa Kvinder mellem 16 og 50 Aar (eller 20—50 Aar) ses, at paa 1000 Kvinder i nævnte Alder kom i 1870—79 135,5 (resp. 159,8) aarlige Fødsler. Men medens i Kjøbenhavn Forholdstallet er betydeligt under anførte Gjennemsnit (nemlig resp. 115,8 og 131,5), er det i Landdistrikterne adskilligt derover (nemlig resp. 138,1 og 167,0); Kjøbstæderne indtage en Mellestilling (med resp. 130,3 og 152,9 p. M.).

Af samtlige Fødsler er noget over 10 pCt. (i 1875—79 10,21) uægte; men dette Forholdstal naar i Kjøbenhavn omtr. op til 20 pCt., medens det i Kjøbstæderne (i 1875—79) var 9,06 og i Landdistrikterne 8,83. Sammenlignes nu de ægte Fødslers og de uægte Fødslers aarlige Antal henholdsvis med Folketallet paa gifte og

ugifte Kvinder i Alderen 16—50 Aar, ses for Tiaaret 1870—79, at der paa 1000 Kvinder kom:

	Ægtefødte paa 1000 gifte Kv. i Alderen 16—50 Aar.	Uægtefødte p. 1000 ugifte Kv. i Alderen 16—50 Aar.
Kongeriget.....	238,4	29,5
Kjøbenhavn.....	219,0	41,2
Kjøbstæderne.....	243,9	24,7
Landdistrikterne.....	240,3	27,8

Om Mødrenes Alder ved Fødselen (i Aarene 1878—79) giver følgende Oversigt en Forestilling. Af 10,000 Mødre var

Alder	gifte	ugifte	gifte + ugifte
under 20 Aar.....	103	94	197
mellem 20 og 25 Aar...	1,341	427	1,768
— 25 - 30 — ...	2,506	284	2,790
— 30 - 35 — ...	2,349	124	2,473
— 35 - 40 — ...	1,789	57	1,846
— 40 - 45 — ...	828	21	849
— 45 - 50 — ...	75	2	77
— 50 - 55 — ...	0,3	>	0,3
over 55 Aar.....	>	>	>
tilsammen	8,991	1,009	10,000

Paa 1000 Pigefødsler kom i 1870—79 1059 Drengfødsler.

De ovenanførte Tal af fødte Børn omfatte ogsaa Dødsfødsler. Hvormange af de Fødte der (i 1875—79) vare Dødfødte, fremgaar af Nedenstaaende:

	Dødsfødte af 100 Fødte.	Dødsfødte og døde i 1ste Maaned af 100 Fødte.
Ægtefødte:		
Dreng.....	3,4	8,1
Piger.....	2,7	6,5
i Alt.....	3,1	7,3
Uægtefødte:		
Dreng.....	4,0	11,9
Piger.....	3,3	10,0
i Alt.....	3,7	10,9

	Dødsfødte af 100 Fødte.	Dødsfødte og døde i 1ste Maaned af 100 Fødte.
Samtlige Fødte:		
Drenge.....	3,4	8,5
Piger.....	2,8	6,8
i Alt.....	3,1	7,7

Som sædvanlig ere Drengene ugunstigere stillede end Pigerne, og de Uægtefødte afgjort ugunstigere stillede end de Ægtefødte.

Dobbeltfødslerne stode, i 1875—79, i følgende Forhold til Enkeltfødslerne: 312,899 fødende Mødre fødte tilsammen 317,037 Børn, idet der forefaldt 308,818 Enkeltfødsler, 4025 Tvillingfødsler, 55 Trillingfødsler og 1 Firlingfødsel, der altsaa frembragte henholdsvis 308,818, 8050, 165 og 4 Børn.

Med Hensyn til Aarstiderne har i Tiaaret 1870—79 Aarets første Maaneder, og navnlig da Marts, haft det største Tal af Fødsler. Paa Marts kommer som dagligt Tal af Fødsler lidt over 9 af 100. Lavest var Forholdstallet i Juli, November og December, nemlig mellem 7,70 og 7,90. I Aarets øvrige ni Maaneder var det over 8 men under 9.

Antallet af **Dødsfald** (og Dødsfødsler) var i 1875—79 tilsammen 196,828, hvilket er knap 7 pCt. mere end i det foregaaende Femaar, medens Fødslernes Antal i det sidste Femaar var 10 pCt. større end i det foregaaende. Det aarlige Gjennemsnitstal af Dødsfald var i 1875—79 altsaa 39,365.

Ifølge Dødsattesterne var Halvdelen af de afdøde Mænd i en Alder af under 29,7 Aar, den anden Halvdel over denne Aldersgrænse; af Kvinderne var den ene Halvdel under, den anden over 32,8 Aar. Men Oplysningerne ifølge Dødsattesterne ere af temmelig tilfældig

Natur og kunne ikke afgive nogen sikker Maalestok. Betragte vi derimod Dødsfaldene i deres Forhold til den levende Befolkning, viser det sig, at der i Tiaaret 1870—79, naar Dødsfødslerne holdes ude af Betragtningen, paa 100 Mennesker aarlig faldt knap 2 Dødsfald, eller 1 Dødsfald paa 52 Mennesker, medens Forholdet i det foregaaende Tiaar havde været 1 Dødsfald paa 50 Mennesker. Forholdet var i 1870—79 saaledes:

paa 100 Mennesker faldt Dødsfald

	i Kjøbenh.	Kjøbst.	Landdistr.	hele Landet
Mandkjøn	2,74	2,14	1,85	1,98
Kvinder	2,28	1,87	1,80	1,87
Tilsammen	2,49	2,01	1,82	1,92

Den af Bureauet for 1870—79 opstillede Dekrementtabel er saalydende:

Dekrementtabel:

af 10,000 samtidigt Levendefødte ville endnu være ilive

efter Forløbet af	Mandkj.	Kvindekj.
0 (o: levendefødte)	10,000	10,000
24 Timer	9,892	9,921
1 Maaned	9,472	9,587
2 Maaneder	9,290	9,429
3 —	9,161	9,318
6 —	8,875	9,075
9 —	8,671	8,899
1 Aar	8,525	8,761
2 —	8,219	8,455
3 —	8,063	8,301
4 —	7,945	8,180
5 —	7,851	8,080
10 —	7,543	7,754
15 —	7,372	7,533
20 —	7,182	7,304

efter Forløbet af	Mandkj.	Kvindekj.
25 Aar	6,925	7,064
30 —	6,706	6,797
35 —	6,471	6,500
40 —	6,194	6,184
45 —	5,867	5,880
50 —	5,468	5,568
55 —	4,952	5,174
60 —	4,364	4,707
65 —	3,670	4,118
70 —	2,854	3,341
75 —	1,892	2,342
80 —	1,086	1,416
85 —	443	628
90 —	127	205
95 —	18	40
100 —	2	3

Endvidere meddeles for samme Tidsrum en Tabel over den sandsynlige Livsalder (den Alder, ved hvilken Halvdelen af Jævnaldrende ville være døde) og over Middellevetiden (den Tid, Jævnaldrende i Gjennemsnit hver have tilbage at leve i).

Alder (der gaas ud fra)	Mandkjøn		Kvindekjøn		Kvindekjønnets Overvægt i Middellevetiden
	Sandsynlig Livsalder (at opnaa)	Middelleve- tid (tilbage at leve i)	Sandsynlig Livsalder (at opnaa)	Middelleve- tid (tilbage at leve i)	
0 (o: leven- fødte ...)	54,5	45,6	56,8	47,4	1,8
24 Timer ..	55,0	46,1	57,2	47,8	1,7
1 Maaned .	56,8	48,0	59,0	49,4	1,4
2 Maaneder	57,5	48,9	59,9	50,1	1,2
3 —	58,1	49,5	60,4	50,7	1,2
6 —	59,3	50,8	61,4	51,8	1,0
9 —	60,2	51,8	62,1	52,5	0,7

Alder (der gaas ud fra)	Mandkjøn		Kvindekjøn		Kvindekjønnet Overvægt i Middellevetiden
	Sandsynlig Livsalder (at opnaa)	Middelleve- tid (tilbage at leve i)	Sandsynlig Livsalder (at opnaa)	Middelleve- tid (tilbage at leve i)	
1 Aar	60,7	52,4	62,7	53,1	0,7
2 —	61,7	53,3	64,0	54,0	0,7
3 —	62,3	53,4	64,7	54,0	0,6
4 —	62,7	53,1	65,2	53,8	0,7
5 —	63,1	52,8	65,5	53,4	0,6
10 —	64,2	49,8	66,4	50,8	0,8
15 —	64,9	45,9	67,1	47,6	1,1
20 —	65,4	42,1	67,9	43,4	1,3
25 —	66,2	38,5	68,7	39,8	1,3
30 —	66,8	34,7	69,6	36,3	1,6
35 —	67,5	30,9	70,4	32,8	1,9
40 —	68,4	27,2	71,1	29,4	2,2
45 —	69,5	23,5	71,8	25,7	2,2
50 —	70,5	20,1	72,6	22,0	1,0
55 —	71,7	16,9	73,6	18,5	1,6
60 —	73,3	13,8	74,9	15,1	1,3
65 —	75,3	11,0	76,3	11,9	0,9
70 —	77,6	8,5	78,4	9,2	0,7
75 —	80,8	6,6	81,2	7,1	0,5
80 —	83,9	4,8	84,3	5,2	0,4
85 —	87,8	3,6	88,1	4,0	0,4
90 —	91,8	2,5	92,1	2,9	0,4

Med Hensyn til Aarstidernes Indflydelse er at bemærke, at Sommer- og Efteraarsmaanederne (Juli—November) have den mindste, Vinter- og Foraarsmaanederne (Januar—Maj) den største Dødelighed. Ved at tage det daglige Gjennemsnit af Dødsfald for hver af Aarets tolv Maaneder og fordele 100 Dødsfald paa disse tolv Dage efter deres indbyrdes Forhold faas for Tidsrummet 1875—79 Dødsfald i

Januar	8,86
Februar	9,49

Marts	9,87
April	9,99
Maj.....	9,32
Juni	8,22
Juli	7,39
Avgust.....	7,23
September.....	6,92
Oktober	6,97
November	7,59
December	8,15
	100,00

Tabelværket indeholder ogsaa nogle Tabeller over **Dødsarsagerne**, der ere udarbejdede efter Beretninger, som vedkommende Distriktslæger have afgivet. Disse Tabeller omfatte for de fire Aar 1876—79 ialt 46,157 Dødsfald (23,929 Mænd og 22,228 Kvinder). I samtlige Tilfælde er Døden konstateret og Dødsarsagerne angivne ved Lægeattest; men Beretningerne angaa kun Dødsfaldene i Kjøbenhavn (21,033), i Provinskjøbstæderne (22,382) og de sex Handelspladser (2742). Den Dødelighedsstatistik, der kan bygges paa Tabellerne, gjælder altsaa kun for Bybefolkningen. En fuldstændig Dødelighedsstatistik for hele Danmark maatte som Grundlag kræve Indberetninger om alle Dødsfald, altsaa ogsaa om dem, der forefalde i Landdistrikterne; men dette kan ikke tænkes gennemført, førend det i Lovgivningen bestemmes, at der ved ethvert Dødsfald skal udstedes Dødsattest af en Læge, Noget, som Loven af 2. Januar 1871 kun foreskriver for Byerne og de Landdistrikter, hvis Afstand til en Læges Bopæl ikke overskrider $\frac{1}{4}$ Mil. Foruden at gjøre opmærksom paa Tabellernes indskrænkede Omfang, henleder Bureauet Opmærksomheden paa, at de i Tabellerne opførte Tal for de enkelte Dødsarsager og de nævnte Aldersklasser ere rene

absolute Tal, der i og for sig ikke give noget sandt Billede af Tilstanden, naar de ikke paa rette Maade sammenstilles med hverandre eller med andre Dødeligheden vedkommende Talstørrelser; man maatte jo for Exempel til en virkelig Bedømmelse af de absolute Tal for Dødsfaldene medtage de forskjellige Tal for den levende Befolkning i de forskjellige Aldersklasser. En virkelig Bearbejdelse af Dødelighedstabellerne vilde ogsaa udkræve en lægevidenskabelig Sagkundskab, som Bureauet ikke raader over, og det indskrænker sig derfor væsenlig til at fremlægge Tabellerne som et statistisk Materiale for Fagmænd, idet det kun ledsager dem med nogle spredte Bemærkninger, der nærmest give en Antydning af Tabellernes vigtigste Talopgivelser.

Fordelingen af de ovennævnte 46,157 Dødsfald efter de Paagjældendes Alder viser, at der alene paa det 1ste Aar faldt 13,460. Allerede i det 2det Aar er Dødeligheden meget betydeligt aftagen, og der er for dette Aar kun indberettet 2762 Dødsfald. En yderligere meget betydelig Formindskelse finder Sted i de derefter følgende Aar, og først omtrent ved det 20de Aar begynder Dødeligheden atter at tage til. Men intet Aar viser dog blot tilnærmelsesvis saa stor en Dødelighed som det første.

Den i Danmark forholdsvis hyppigst forekommende Dødsårsag er Brystsygen (Lungesvindsot), der af de ovennævnte 46,157 Dødsfald har foranlediget de 5,518 (eller næsten 12 pCt.). Den optræder som Dødsårsag i alle Aldre, men bliver ej hyppig som saadan før henimod det femtende Aar, hvorefter den tiltager stærkt i de følgende Aar, og naar Højdemaalet af sine Ofres Antal i Alderen mellem det 25de og 35te Aar; dette Antal bliver vel

nu nominelt mindre, men dog først i betydelig Grad efter det 65de Aar, og kun i den høje Alderdom kan Brystsygdom siges at høre til de sjældnere Dødsarsager. — Medens Brystsygdom er noget hyppigere for Mandkjønnet, er den organiske Hjertesygdom 3,6 pCt. betydeligt almindeligere i Kvindekjønnet. Dette staar i Forbindelse med, at flere Kvinder end Mænd naa den høje Alder, og at Sygdommen fortrinsvis er udbredt i denne. Den viser sig nemlig som sjælden Dødsarsag i Barndommen, især i den tidlige, og som ikke hyppig i hele Ynglingealderen. Det er først efter det 25de Aar, at den faar større Betydning, for efter det 50de at optræde i sit største Antal. — Lignende Forhold med Hensyn til Alderen vise sig at være tilstede ved de to Brystlidelser den kroniske Bronkitis (1,18 pCt.) og Astma (0,38 pCt.), idet det langt overvejende Antal af Dødsfald af begge Aarsager falder mellem det 40de og 85de Aar. Den Sygdom i Brystet, der i hyppig Forekomst som Dødsarsag staar nærmest Brystsygen, er den egenlige Lungebetændelse (6 pCt.). Denne Sygdom, der ligesom Brystsygdom kræver flest Ofre blandt Mændene, er en af de væsentligste Dødsarsager i den høje Alder, men det store Tal for de ved den fremkaldte Dødsfald staar dog ogsaa i Forbindelse med dens overordenlige Hyppighed i den spæde Barndom. Ogsaa Lungehindebetændelse ($\frac{1}{2}$ pCt.) kræver flest Ofre blandt Mændene, hvorimod Brystkatarrh, akut Bronkitis, ($1\frac{1}{3}$ pCt.) er mere almindelig blandt Kvinderne. Den er navnlig i de første Leveaar en overvejende hyppig Dødsarsag. — Paa de, navnlig i Kvindekjønnet, hyppige Underlivs sygdomme perforerende Mavesaar, Bughinde-

betændelse og Tarmbetændelse samt Tarmslyngning og indeklemmt Brok falder mellem $\frac{1}{4}$ og 1 pCt. af alle Dødsfaldene. Paa Brights Sygdom og paa Sukkersygen falde som Dødsårsager resp. 1,78 og 0,23 pCt. Paa Urinblærebetændelse, der er meget sjælden i Barndommen og Ungdommen og overhovedet før det 50de Aar, og temmelig sjælden blandt Kvinder, falder 0,38 pCt. af Dødsfaldene. Paa kronisk Prostatasygdom og paa Æggestoksvulst falde henholdsvis 0,07 og 0,14 pCt. En især i den høje Alder hyppig Dødsårsag er derimod Kræft ($4\frac{1}{3}$ pCt.), der navnlig er hyppig paa Kvindesiden, fordi den saa hyppigt angriber Livmoderen og Kvindens Brystkirtel. Af Sygdomme, der navnlig fremtræde i den ældre Alder, kan endnu nævnes Apoplexi ($2\frac{1}{3}$ pCt.) og kroniske Hjernesygdomme ($1\frac{1}{2}$ pCt.). De kroniske Hjernesygdomme ere navnlig hyppige i Hovedstaden (den større Opfordring til aandelig Overanstrengelse, de større Fristelser til Udskejelser, den hyppigere Forekomst af de syfilitiske Sygdomme i den store By). — Af Sygdomme, der fortrinsvis omfatte den tidlige Barnealder og bidrage til den store Dødelighed i de første Aar, maa nævnes Tæring hos Smaa børn (især i Kjøbenhavn, maaske dels paa Grund af ugunstigere Livsforhold for Børnene, dels paa Grund af nedarvet Sygelighed fra Forældrene) og Krampe. Stor Dødelighed i de første Aar, og da især i Kjøbenhavn, medføre ogsaa kapill. Bronkitis og akut Diarrhoe. Af epidemiske Børnesygdomme mærke vi endvidere Mæslinger og Skarlagensfeber, fremdeles Difteritis (ondartet Halssyge) og Kighoste. Akut Hjernevandsot er ogsaa hyppigst i Barn-

dommen og især i Kjøbenhavn, hvad der vistnok staar i Forbindelse med, at Sygdommen ofte fremkaldes ved Tuberkler, der atter fortrinsvis udvikle sig hos Børn i de større Byer, hvor Mælken er mindre god og Luftforholdene ofte slette. Hjernebetændelse angriber ligeledes navnlig Barndommen, men findes dog gennem alle Aldersklasser. — Tyfoïd Feber, der navnlig er hyppig i Alderen mellem 20 og 40 Aar, har i de fire Aar, Undersøgelsen omfatter, været langt hyppigere i Kjøbstæderne end i Kjøbenhavn; hvis dette Forhold i de følgende Aar skulde holde sig, maa Tanken uvilkaarlig henledes paa Kjøbenhavns gode Drikkevand i Modsætning til mange Kjøbstæders mer eller mindre urene Vand. — De 311 Dødsfald, som Barsel-feberen i de fire Aar foraarsagede, fordeltes saaledes mellem Aldrene: 10 mellem 15 og 20 Aar — 68 mellem 20 og 25 Aar — 155 mellem 25 og 35 Aar — 72 mellem 35 og 45 Aar — 4 mellem 45 og 55 Aar — 1 over 55 Aar og 1 af ubekjendt Alder. — Akut Ledderheumatisme og Ansigts- og anden Vandrerosen optræde først mere efter det 20. Aar som Dødsarsag. Den sidstnævnte Sygdom er navnlig hyppig i Kjøbenhavn, hvilket kan være en Følge af umaadeholden Levevis i den store By. — Af de 242 Personer, der i det nævnte Tidsrum døde af Syfilis (især i Kjøbenhavn), havde de 171 arvet Sygdommen, de 71 erhvervet den. De 171, der døde af medfødt Syfilis, døde alle i det første Leveaar undtagen 4, hvoraf 2 døde i andet, 1 i tredje Aar og 1 senere hen i Livet. De 71 med erhvervet Syfilis døde i højst forskjellige Aldre fra den tidligste Barndom, da de sagtens vare smittede af Forældrene eller Ammerne, og til Tiden

over det 70de Aar. — Ligeoverfor 525 Mænd, der døde af Drik, staa kun 67 Kvinder. De fleste Dødsfald forefaldt mellem 40. og 70 Aar, intet før det 20. Aar. Af de 592 døde 315 af kronisk Alkoholisme, 229 af Drankergalskab, medens 48 afgik ved en pludselig Død af Drik. — Som Tilskadekomne anførtes i det omhandlede Tidsrum 737 Dødsfald, 604 Mænd og 133 Kvinder, som naturligt er, langt flere Mænd. Som Maader, hvorpaa Folk ere komne tilskade, nævnes hyppigst Drukning (270), Fald og Knusning (264), Forbrænding og Skoldning (62); sjældnere Forgiftning (22), fremdeles Forfrysning, Skudsaar, Ihjelliggen osv. — Selvmord, især Hængning og Drukning, anføres som Aarsag til 623 Dødsfald, 521 Mænd og 102 Kvinder, mest i Alderen 35—65 Aar, men forøvrigt i alle Aldre, fra under 10 til over 85 Aar. — Af Alderdom angives som døde 2023, nemlig 743 Mænd og 1280 Kvinder, især i Provinskjøbstæderne. — Uden Lægebehandling døde 1040, hvoraf kun 187 i Kjøbenhavn, de 710 derimod i Provinskjøbstæderne og de 143 i Handelspladserne.

Sammenstilles derefter de forskjellige Dødsårsager som Procenter af samtlige 46,157 Dødsfald, faas følgende Oversigt for samtlige Byer, Kjøbenhavn, Provinskjøbstæderne og de 6 Handelspladser, for de fire Aar 1876—79.

Dødsårsag	pCt.
Lungesvindstot	11,96
organ. Hjertesygdom	3,60
kronisk Bronkitis	1,18
Emphysem, Astma	0,38
Lungebetændelse	5,95
Lungehindebetændelse	0,49
Brystkatarrh, akut Bronkitis	1,34