


OM PERSONBETEGNELSE I SLÆGTSKABSTAVLER

AF

O. WEBERG

I „Personalhistorisk Tidsskrift“ 7' R., I, 1916, Side 225 ff, fremsatte Kontorchef, cand. polit. P. Grønvold og Meddeleeren et Forslag til Personbetegnelse i Slægtskabstavler. Det omhandlede System, der af Dr. phil. Alb. Fabritius er omtalt og anvendt i Værket „Hans Majestæt Kong Christian X og hans Slægtninge“ (København 1937) og udførligt behandlet i „Haandbog i Slægtsforskning“ (København 1943), Side 82 f, har i den i 1916 meddelte Form den Fejl, at Betegnelser for Probandens Descendenter ikke findes. Denne Mangel kan dog afhjælpes ved til Probandens Betegnelse $\frac{1}{1}$ (henholdsvis $\frac{1}{2}$, hvis Probanden er en Kvinde) at føje eet Tal for hver Generation ganske som i Hovedsystemet, idet der dog for Descendenternes Vedkommende *ikke* i Betegnelsen indføjes noget o (Nul) efter $\frac{1}{1}$. Probandens næstældste *Søns* ældste Datter vil herefter faa Betegnelsen $(\frac{1}{1})$ 32, medens $(\frac{1}{1})$ 032 betegner Probandens næstældste *Broders* ældste Datter.

Hvis man yderligere kunde ønske at have Betegnelser for Pro-



bantens Svogre og Svigerinder og disses Descendenter, kan Proban- tens Hustru betegnes $\frac{1}{2}^*$ og hendes Søskende $(\frac{1}{2}^*)_{01}$, $(\frac{1}{2}^*)_{02}$, $(\frac{1}{2}^*)_{03}$ o. s. v., samt disses Descendenter $(\frac{1}{2}^*)_{011}$ o. s. v., idet o (Nul) her indføjes ligesom ved Probantens Søskende og disses Ahner. Den tilføjede Stjerne * tjener til at antyde, at de med * kendetegnede Personer i Almindelighed ikke er blodsbeslægtede med Probant og dennes Ascendens, men kun med Probantens Descendens. Hvis Pro- banten er en Kvinde og saaledes har Betegnelsen $\frac{1}{2}$, faar hendes Ægtefælle Betegnelsen $\frac{1}{1}^*$.

Beregning af Slægtskabsgrad sker efter samme Regler som i det oprindelige System, hvorved maa erindres, at $1 = 2^0$; $(\frac{1}{1})_1$ og $(\frac{1}{2}^*)_{021}$ er saaledes beslægtet i $0 \div 0 + 1 + 3 = 4$. Grad, d. v. s. de er Fætre.

Skulde man undtagelsesvis ønske Betegnelser for Ahner eller Slægtninge til $\frac{1}{2}^*$, kan dette gøres ved at sætte en * efter Ahne- nummeret til Adskillelse fra Probantens Ahner; $\frac{2}{1}^*$ og $\frac{2}{2}^*$ kan saa- ledes benyttes som Betegnelse for Forældrene til $\frac{1}{2}^*$, d. v. s. Pro- bantens Svigerforældre.

Anvendes Reglerne paa et stærkt afkortet Udsnit af de i Dr. Fabritius's Bog indeholdte Oplysninger, vil Betegnelserne for de i Oversigten medtagne blive som nedenfor anført.

