

Mejeriberetning for Fyen

for Sommerhalvaaret 1876.

Den forløbne Sommer har ikke været heldig for Udbyttet af Mejeridriften paa Grund af den næsten stadig tilstedeværende Græsmangel. I Maj Maaned hæmmedes paa Grund af det tørre og kolde Vejr Græssets Væxt, hvortil endnu kom, at Mange, paa Grund af at Vinterfouragen slap op, maatte flaa Kvæget ud tidligere, end det ellers vilde have været rigtigt, naar der faaes hen til Græssets Knaphed. I de to følgende Maaneder, Juni og Juli, indfandt der sig vel Varme og nogen Regn, som lod den Smule Græs, der endnu var levedygtigt i Begyndelsen af Juni, voxe frem med en forbausende Kraft, især i Juni Maaned; men det forslog dog kun lidt, og man kan derfor sige, at Knapheden tildels vedblev at være almindelig igjennem disse to Maaneder, hvorimod der flere Steder avledes godt Hø paa Engene. Af den til Slæt bestemte Del af Agermarken blev derimod noget afgræsset. Uagtet ogsaa Juni og Juli Maaneder saaledes nærmest maa kaldes græsknappe, holdt Mælkølserne forbausende godt Mælken i disse Maaneder, og Udbyttet gik som Regel ikke meget under det Normale, ialtfald ikke naar undtages den sidste Halvdel af Juli Maaned. I Beretningen fra det nordøstlige Fyen siges dog, at der paa mange Steder egentlig ikke har været Græs fra Slutningen af Juni Maaned og til September. Med August Maaned indtraadte derimod Græsmangel saa godt som overalt, og Mælkemængden sank i denne Maaned betydelig under det Almindelige. — I Slutningen af August kom Regnen og i September og Oktober Maaneder fik vi frugtbart

Bejr, og, som Regel, tilstrækkeligt Græs; men Mælkemængden vilde ikke stige igjen, og Udbyttet af Mejerierne var, som Følge heraf, tarveligt i begge disse Maaneder.

Til nærmere Belysning meddeles den paa 11 Gaarde, beliggende paa forskjellige Egne af Fyen, havde Mælkemængde i de enkelte Maaneder:

Gaardens Nr.	Koboldets Størrelse. Stf.	i Maj.		i Juni.		i Juli.		i August.		i Septbr.		i Oktober.	
		Salt.	pr. Stf. daglig.	Salt.	pr. Stf. daglig.	Salt.	pr. Stf. daglig.	Salt.	pr. Stf. daglig.	Salt.	pr. Stf. daglig.	Salt.	pr. Stf. daglig.
1	60	36196	20.1	34037	19.0	28864	16.0	19061	10.6	9770	5.4	5202	2.9
2	107	64845	20.2	61421	19.1	57607	17.3	38582	12.0	22313	7.0	11226	3.5
3	100	56282	18.7	52524	17.5	46500	15.5	32523	10.8	19529	6.5	13634	4.5
4	84	37738	15.0	44534	17.7	39520	15.7	30738	12.2	14560	5.7	6395	2.5
5	47	28630	20.3	28499	20.2	21975	15.6	14521	10.3	7935	5.6	4052	2.9
6	16	8820	18.4	11957	24.9	9709	20.2	8493	17.7	5519	11.5	3207	6.7
7	35	18818	17.9	20540	19.5	15706	17.8	13138	12.5	6830	6.5	4368	4.1
8	61	26260	14.3	31140	17.0	23956	16.4	23404	12.8	16160	8.8	8016	4.4
9	33	22371	19.1	25020	21.4	22170	19.0	16412	14.0	8339	7.1	4471	3.9
10	108	68893	21.1	64794	20.0	56310	17.3	39382	12.2	22995	7.1	11565	3.5
11	14	7969	19.0	8036	19.1	6011	14.3	4292	10.2	2339	5.5	4678	11.1

Mælkemængden i St

Som Følge af den græsknappe Sommer var Besætningernes Foderstand ved Indbindingen gennemgaaende ringere end sædvanlig; men der var dog meget betydelig, og langt mere end almindelig, Forskjel paa de enkelte Besætninger. Paa de Steder, hvor Køerne i den magreste Tid i Sommer enten fik noget Kraftfoder eller staldfodredes, samt hvor man tillige ikke for langt hen paa Efteraaret ventede med at tage dem paa Stald, idetmindste om Natten, og da desuden gav dem noget Kraftfoder, kom Kvæget ind med godt Huld, og Køerne ville være gode at fodre paa i Vinter. Desværre har dette imidlertid kun været Tilfældet paa de færreste Steder, og hvor der, som navnlig hos mange Gaardmænd, slet intet er blevet gjort for Køerne, men hvor de endogsaa ere blevne holdte ude til de første Dage af November Maaned hele Dagen og uden at have faaet noget som helst Kraftfoder, der kom de ind i en meget daarlig Tilstand, hvad der selvfølgelig vil straffe sig haardt. I Beretningen fra Odenseegnen hedder det, at af 30 Gaarde, mest større, have kun de 20 bundet ind i rette Tid, medens de 10 af Frygt for Fodermangel i den kommende Vinter have ventet for længe dermed.

De almindeligst benyttede Kvægracer til Mejeribrug ere en Blanding af gammel fynst med Angler- eller nordflesvigst Race. Paa flere større Gaarde har man i de senere Aar i det sydøstligste Fyen begyndt at vrage Anglerne og gjør istedetfor Indkjøb af Nordflesvigere. Rene Anglerbesætninger ere sjældne, men det er temmelig almindeligt paa de større Gaarde at rekrutere Besætningerne ved Indkjøb af Anglere eller undertiden fra Durupgaard, eller ogsaa har man dannet sig en Stamme af Anglerkøer, hvorfra Besætningen fortrinsvis faaer sin Tilgang. Kun Tyren anskaffes saa andetsteds fra, men altid af ren Anglerrace. — I det sydøstlige Fyen findes temmelig udbredt en Blanding af holstenst, angelst og fynst Race, som i Reglen ere gode Molkere. Sydst Race er ikke meget udbredt, dog skal der være en stor Gaard paa Hindsholmen, hvor Besætningen udelukkende bestaaer af Syder (Sorthroget, vistnok

Holstebrorace). Ifølge Beretningen fra Odenseegnen ere enkelte Køer af ren Breitenburgerrace indførte, i Reglen af Gaardmænd, som have været godt fornøjede med dem; men da ingen af dem har ført Regnskab, kunne paalidelige Oplysninger om deres Ydeevne ikke faaes. Gjennemgaaende synes dog Breitenburgerracen ikke at passe for vort Land, da den kun er mælk-givende i et begrænset Tidsrum og hurtig taber Mælken, naar der ikke kan bydes den stærk Næring. Korthorn har været søgt indført, men er snarest i Aftagende. — Kreaturerne's Sundhedstilstand i Sommerhalvaaret har gjennemgaaende været tilfredsstillende, og Kastning har heldigvis endnu kun viist sig paa enkelte Steder og ikke epidemisk. Her paa Enkenskæde have rigtignok af 36 Køer de 7 kastet Kalven i Sommeren og Efteraaret. Kasterne vare næsten alle 3-aars Kvier med anden Kalv, og den eneste, som ikke kastede, var en Kvie, som fenedes den 1ste Juli paa Grund af, at den var temmelig svagt udviklet. Jeg har saaledes Grund til at tro, at Kastningen navnlig skyldes en for længe fortsat Malkning af de unge Køer, som næsten alle skulde føde i November og December Maaned d. A. — Med Efterbyrdens Bortgang har der derimod i dette Efteraar været nogen Banskfeligbed, navnlig hos Køerne, som ere komne nogle Dage for tidlig med Kalven, og i Reglen af Besætninger, der ere tagne sent ind og i daarligere Foderstand, end de pleje at være. Det samme Uheld er dog ogsaa indtruffet ved Besætninger i god Foderstand; saaledes meddeles fra en Gaard med vel fodrede Køer i det sydsøstlige Fyen, at af 7 Kælvekøer have 3 ikke villet kaste Efterbyrden. — Fra samme Egn omtales tillige, at der paa et Par Steder har viist sig hvide Saar, et Slags Ringorm, der brede sig ud paa forskjellige Steder af Dyrene, især omkring Djnene samt paa Ører og Hals. — Køernes Fodring om Sommeren har mest været den almindelige, nemlig Fodring paa Græs ved Tøjring eller løs Drift. Husmændene bruge næsten alle Staldfodring en Tid af Døgnet hele Sommeren igjennem, og ikke faa Gaardmænd i det sydsøstlige Fyen have i en Del

af den forløbne Sommer ogsaa anvendt Staldfodring. — I det nordøstlige Fyen bruges næsten udelukkende Tøjring saavel paa større som mindre Gaarde indtil Høst; men iaar er Tøjringen dog, paa Grund af Græsmangel, noget tidligere end sædvanlig bleven afløst af løs Drift. — I det vestlige Fyen har Reglen været, at de større Gaarde brugte løs Drift, de mindre Gaarde Tøjring. I det sydøstlige Fyen har derimod Tøjring ligesom i det nordøstlige været det Almindelige saavel paa større som mindre Gaarde. Tøjring har iaar havt sine store Bønskeligheder paa Grund af, at der skulde flyttes saa ofte. — Paa de større Gaarde er der meget sjældent anvendt Staldfodring i Sommer; men derimod er der paa enkelte af disse, og navnlig hvor Græsningen har været særlig knap, ofte givet endog temmelig betydelige Tilskud af Kraftfoder, mest bestaaende af Byggrut, Hvedeklid, Palmekager og undertiden Rapskager eller endog Kjørne i Straact, hvilket sidste er blevet opfodret saavel inde som ude. Den Mængde, hvori dette Kraftfoder er givet, har i Reglen været $1\frac{1}{2}$ à 2 Pd. daglig pr. Ko; men der haves ogsaa Exempler paa, at det har været givet i langt større Kvanta, og i Beretningen fra Odensegnen omtales, at mange Mejerier i den græsknappe Tid ved at opfodre Kraftfoder have maattet betale Mælken med indtil 25 Ore pr. Kd. Uagtet denne stærke Fodring, kunde Mælkeudbyttet dog kun tildels vedligeholdes, og det er efter Indbindingen ved gammel-malkende Køer sunket ned til saa godt som intet. — Hvor det Kraftfoder, som gaves i Sommer, bestod af Grut og Hvedeklid, som opfodredes paa Marken, blev det i Reglen hældt i Vandtruget, som Køerne saa aade det af, eller det gaves i Spande; undertiden er det ogsaa blevet givet om Matten, hvor man havde løs Drift og tog Køerne ind. — Med Rapskagerne fodredes undertiden ligefrem af Haanden. — Hos en enkelt større Gaardejer midt i Landet benyttedes Muleposer, som Køerne vel i Begyndelsen ikke ret syntes om, men dog hurtig vænnede sig til. — Smørrets Kvalitet har intet lidt ved denne Fodring. En Gaardejer i det sydlige Fyen, Mads

Hansen, har paa 30 Tdr. Agerjord i Sommer holdt 14 Malkesøer, som han ved løs Drift har græsset paa 3 Skpr. Td. pr. Ko, idet han tog Køerne ind tvende Gange i Døgnet og fødrede dem med 5 Pd. Hvedeklid daglig pr. Ko hele Sommeren foruden en meget ringe Mængde Halm. Mads Hansen tjærner sødt Smør og har i Gjennemsnit af hele Aaret fra 1ste Novbr. 1875 til 1ste Novbr. 1876 faaet 132 $\frac{1}{2}$ Dre pr. Pd. solgt Smør efter Kjøbmandens Bøgt. Han har ved sin Mejeridrift i det nævnte Aar naaet at faa ca. 120 Kr. Netto pr. Td. Td. med Græs. Mads Hansens Agerbrug findes nærmere omtalt i Ugeskrift for Landmænd 1876. II. Pag. 99, og et Resumé af hans Mejeriregnskab vil findes senere i denne Beretning (Gaarden Nr. 11). — Dersom man efter det Foranstaaende vilde tro, at Kraftfoder og Staldfodring paa Græs i Sommer fortrinsvis ere blevne anvendte paa de Gaarde, som havde knappest med Græs, vilde man rigtignok være i en slem Bildfarelse. Sjældent har det viist sig saa flaaende som iaar, hvor gavnligt det er for Græsset, at Jorden har været udlagt i Kraft og navnlig, at der er gjødet godt til sidste Halm; men de Landmænd, som endnu ikke have lært at indse dette, nænne heller ikke at ofre videre paa deres Køer; men foretrække at lade dem sulte. Ved Siden af denne Grund til Græssets ulige Mængde paa forskjellige Gaarde, er der ogsaa Arten og Mængden af det isaaede Græs- og Kløverfrø. Ogsaa i denne Henseende begaaes der endnu store Forseelser, og navnlig have de Græsmarker været tarvelige, hvor Udsæden, hvad ofte er Tilfældet hos Gaardmændene, væsentligt har bestaaet i sildig Kløver, hvoraf endda er faaet lidt nok. Endvidere have de Græsmarker været flettest, som straaene mod Nord og Nordøst, idetmindste som Regel. Endelig har selvfølgelig Regnens ulige Fordeling havt en væsentlig Andel i Græssets større eller mindre Godhed.

Af Mejerisystemerne er det holstenste endnu det almindeligst benyttede her paa Fyen, og kun nogle ganske Enkelte ere gaaede over til Band- og Ismejerier. Blandt disse sidste

ere Brahesholm og Erholm, hvor der dog kun er hjærnet smør. Ogsaa paa enkelte Egne, saaledes omkring Vejstrup mellem Nyborg og Svendborg, haves Vandmejerier paa mindre Gaarde, dog ikke almindelig med Benyttelse af Is. Boringer efter Vand ere foretagne mange Steder, baade paa større og mindre Gaarde, men som oftest kun med daarligt Resultat. — Godt og rigeligt Vand er iaar dog erholdt ved Boring paa enkelte Steder f. Ex. paa Amagergaard. Interessen for at benytte Is er dog kjendelig i Tiltagende overalt; men endnu bruges denne mest til at regulere Flødetøndens Varme om Sommeren, og kun ganske enkelte Steder bruges den til at afkøle Mælken med inden Opjiningen, idet Isen anbringes i en luffet Blispsand, som sættes ned i Mælkejungerne. Fra en Gaard opgives, at Mælkens Varme derved reduceredes til 18 á 19° R. ved Opjiningen, hvilket hjalp saa meget, at Forbruget af Mælk til 1 Pd. Smør gik ned fra 36 til 32 Pd. i den varme Tid i Juni Maaned.

Udbyttet af Smør og Ost i Forhold til Mælken er et meget vanskeligt Punkt at besvare blot nogenlunde rigtig gennemsnitlig for en hel Landsdel. I Beretningen fra Odenseegnen hedder det, at der efter Optegnelser paa 30 mest større Gaarde i de 6 Maanedes har været brugt 30,5 Pd. Mælk til 1 Pd. Smør, saaledes som det er indvejet, og 14,3 Pd. stummet Mælk og hjærnet Mælk til 1 Pd. Ost fra Pressen. — Deles samtlige Mejerier paa Fyen i tre Klasser, indenfor hvilke der dog igjen findes stort Spillerum, nemlig 1) Større Gaarde, hvor der holdes en almindelig dygtig Mejerste eller Mejerist; 2) Bøndergaarde, hvor Kone eller Datter have lært Mejeri eller ialtsald saa godt som muligt lagt sig efter sammes Udvikling og 3) de almindelige gammeldags Bøndergaarde uden næsten Spor af Fremstridt, — og denne er desværre den største Klasse, mindst 70 % af hele Bøndestanden, — henvises for første Klasses Bedkommende til nedenstaaende Fortegnelse over Forbruget saavel Sommer som Vinter i 11 á 12 Mejerier, og for 2den Klasses Bedkommende antages Forbruget at kunne sættes

til 36 Pd. Mælk pr. Pd. Smør. Mælkemængden er maaste snarest noget større her, paa Grund af at der malkes tre Gange. Med Hensyn til tredie Klasse maa der allerførst gjøres opmærksom paa, at her aldrig findes noget som helst Regnskab. I det Højeste vides omtrent, hvormeget der sælges. Mælkforbruget til 1 Pd. Smør vil vist her naa op til 10 à 12 Rd. eller 40 à 48 Pd. — Ost til Salg laves aldrig i disse Mejerier, kun sees nogle smaa, tørre, skarptandede Oste hængende paa en Fjæl oppe under Tagtjæget, til stor Fristelse for Spurve, der dog kun de første Dage kunne binde an med dem. — Den Pris, hvortil 1 Pd. Mælk udbringes i saadanne Mejerier ved Smør- og Ostelavningen, Værdien af Valle og kjærnet Mælk ikke medregnet, vil, naar et Pd. Smør ansættes til 90 Ore og 1 Pd. Ost til 20 Ore, kun omtrent blive 3 Ore eller 12 Ore pr. Rd. — Som Exempel paa hvad en ihærdig og driftig Gaardmand med en dygtig Kone kan bringe ud af Mælken, anføres her et kort Resumé af Gaardmand Hans J. Kromanns Mejeribedrift i Østeraaby i det sydløstlige Fyen. — Han har 10 Køer, hvis Mælk dels anvendes til Produktion af Smør, men dels ogsaa fornemlig til Ostelavning, hvoraf han fabrikerer Ejdammerost, som sælges til en Pris af 80 Ore pr. Pd. 3 Maaneder gl., Myseost, som udbringes i 66 Ore pr. Pd. efter 2 Maaneders Lagring, Stummetmælksost og hollandsk Stoltserost. For Smørret, som kjærnes af syrnet Fløde, har han i Gjennemsnit af Maanederne Juni til Oktober, begge inklus., opnaaet en Pris af 128 Ore pr. Pd.

58 Pd. Mælk udbringer han i:

18 Pd. til Stumn. give $3\frac{1}{2}$ Pd. Fløde, hvoraf $\frac{1}{2}$ Pd. Smør	64 Ø.
$14\frac{1}{2}$ Pd. stummet Mælk og 40 Pd. nymalket Mælk	
give $4\frac{1}{2}$ Pd. moden Ejdammerost	360 —
4 Pd. moden Myseost	264 —
	Salt . . 688 Ø.

1 Pd. Mælk er udbragt i 11,⁶⁶ Ore eller 47,⁴⁴ Ore pr. Rande Mælk.

Forbruget af Mælk til 1 Pd. Smør har i nedestaaende Mejerier været i de forstjellige Maaneder af Aaret fra 1ste Novbr. 1875 til 1ste Novbr. 1876.

Gaardens Nr.	Mejeriifhemmet.	Novbr. 1875.	Decbr 1875.	Jan. 1876.	Febr. 1876.	Marts 1876.	April 1876.	Maj 1876.	Juni 1876.	Juli 1876.	Aug. 1876.	Septb. 1876.	Oktbr. 1876.
1	Thynnet Smør.	28,38	29,34	30,82	32,84	35,28	36,29	31,73	30,79	27,76	27,07	26,46	25,89
2	33 og Gaard Østret. Sept. 1/2 Søtte 1/2 Sø. Marts og Okt. 1/2 Sø. Søtte	23,85	27,45	28,02	28,74	28,91	28,46	28,10	29,61	27,94	26,75	24,25	23,28
3	Østret og Thynnet Smør . . .	27,08	28,00	27,25	27,50	26,50	27,75	29,83	30,50	30,50	28,66	26,00	27,00
4	bo. bo. bo.	30,10	31,00	30,4	29,8	30,0	31,7	32,7	33,4	31,0	29,6	23,0	25,4
5	Do. om Vinteren, Gaard- mejeri om Sommeren.	29,0	28,81	30,85	31,32	30,89	32,30	33,0	34,72	29,73	28,98	26,74	25,33
6	Thynnet Fløde												
7	Østret og Thynnet Fløde . . .	29,0	32,7	34,6	34,6	37,4	36,2	31,3	33,9	33,3	35,9	30,7	26,7
8	bo. bo. bo.	25,6	27,4	27,4	28,2	28,2	27,8	26,2	31,0	28,6	27,4	24,6	22,0
9	Sernfælde	29	28	31	33	32	32	32	33	34	33	28	24
10	bo. bo. bo.	31,1	26,6	29,2	31,5	31,6	33,8	33,3	36,2	35,9	32,8	27,6	24,0
11	(Se og Gaard, født Smør i Febr. 1. Sept. Mælk af Ma- ret Østret og Thynnet Smør Gaardn. 7 ^o Gaard, født Smør	26,6	26,6	27,9	31,5	29,2	30,4	30,8	31,4	29,6	28,9	28,4	25,0
12	Se og Gaard, født Smør . . .	33,8	34,2	32,5	31,0	31,12	33	32,5	36	33,3	34,4	30	32,5
		*	*	*	*	*	*	*	33,7	31,1	28,8	32,3	32,5

Samtlige Tal i denne Tabel ere beregnede efter indvejet Smør, ikke efter Salgsvægten.

Af Foranstaltninger til Mejerivæsenets Fremme er der ikke væsentlige eller mange, som have Nghedens Interesse, ligesom det vel nok maa siges, at den her paa Fyen almindelige Salgsmaade af Smørret til fast Pris for 1 Aar fra November til November, hvilken Salgsmaade ogsaa begynder at blive almindelig blandt Gaardmændene, egentlig ikke er til Gavn for Fremskridt i Mejerierne. Enkelte Mejeriassistenter, dels offentlige, dels private, give Undervisning i Mejerivæsenet til dem, der søgte deres Assistance, ligesom det ogsaa, idetmindste i det sydlige og sydøstlige Fyen, bliver mere og mere almindeligt, at Gaardmændsøstre og Koner reise ud for at lære Mejeri. — I det østlige Fyen er der ogsaa adskillige gifte Koner, som i de sidste 2 à 3 Aar have været nogle Uger hos Madam Nielsen paa Havarthigaard, hvilket næsten altid virker meget gavnlig.

Til Skade for Fremskridt i Mejerivæsenet er ogsaa den Omstændighed, at Regnskabsføringen endnu staaer en Del tilbage. Der er endnu en Mængde endogsaa bedre Mejerier, hvor der intet ordentligt Regnskab føres. Dette bidrager igjen væsentlig til, at vore Læremejerskers Uddannelse lader meget tilbage at søgte, fordi de ikke lære tilstrækkelig at skønne paa den nundværlige Nytte af Maal og Vægt, og de medbringe da heller ikke et ordentlig ført Regnskab, der ellers kunde være dem til stor Nytte, naar de senere selv skulle styre en Mejeribedrift. — Som Foranstaltninger til Mejeridriftens Fremme kunne ogsaa, idetmindste for de fleste mindre Mejeriers Bedkommende, nævnes Fællesmejerierne, hvoraf der nu er en Del her paa Fyen; saaledes i Marslev, i Sanderum, i Besterhøjsinge, i Ørsted, i Ravslunde, i og ved Assens, i Odense, i Bogenfse, i Ellinge, i Frørup osv. — Alle disse Fællesmejerier arbejde imidlertid sikkert med en meget ringe Avance, fordi Mælken som Regel maa kjøbes for dyrt, hvilket igjen har sin Grund i, at de fleste Gaardmænd ikke vide, hvad

de selv kunne udbringe Mælken i, ligesom det er saa nemt for Konen at løbe ned i Mælkestuen for at hente Fløde eller nymalket Mælk efter Behag til Brug i Huset, naar hun ikke sælger Mælken. — Alle de ovenfor nævnte Fællesmejerier drives som Vandmejerier, tildels med Benyttelse af Is, saasom Sanderum Mejeri, hvor der ogsaa en Del af Aaret kjærnes sødt Smør. En Del af de andre Mejerier har ligeledes kjærnet sødt Smør; men de ere vendte tilbage til det syrnede.

Som foran omtalt, er den almindeligste Salgsmaade af Smørret her paa Fyen til fast Pris for et helt Aar saavel for større Gaarde, der kjærne syrneth Smør, som for de bedre Mærker af Bøndersmørret. Undertiden sælges ogsaa til Dagens Pris efter højeste Notering i Berlingske Tidende for syrneth Smør. Den sidste Handelsmaade har i Aaret indtil 1ste November d. A. været den fordelagtigste for Producenterne, idet Smørret ved denne Salgsmaade fra næsten alle større Gaarde har været udbragt i en Gjennemsnitspris af over 123 Kr. pr. 100 Pd. (naturligvis retter Prisen sig ved denne Salgsmaade meget efter den Tid af Aaret, paa hvilken den største Produktion falder), medens de, som have solgt til fast Pris, kun have faaet mellem 115 og 122 Kr. pr. 100 Pd. — De mindste Producenter, Husmænd og de Gaardmænd, hvis Mejerier staa langt tilbage, sælge enten til Landhøkeren eller til den Kjøbmand, som faaer deres Korn. — Folk, som bo i Nærheden af de større Byer Odense, Nyborg eller Svendborg, eller som ved Jernbanen staa i bekvem Forbindelse med disse, opnaa som oftest højere Priser ved Salg paa Torvet i disse Byer. Saaledes stal Aalhykkegaarden i dette Efteraar have naaet indtil 2 Kr. pr. Pd. Smør paa Torvet i Odense, hvorved dog maa bemærkes, at der selvfølgelig gjennemsnitlig gaaer noget mere Smør til 1 Pd. ved Salg pundevis end ved Salg i større Partier, ligesom Omkostningerne ved at holde en Vogn og et Par Menneſter til hver Torvedag at tilbringe Formiddagen paa Byens Torv ogsaa maa tages i Betragtning.

Paa Grund af, at den producerede Mælkemængde iaar har været ringe, er der ogsaa fabrikeret betydelig mindre Ost end sædvanlig, hvorfor Priserne paa denne i dette Efteraar have været høje. Almindelig god Skummetmælksoft har saaledes, 2 Maaneder gammel, kostet indtil 33 Ore pr. Pd. — For Exportost er der betalt fra 35 til 40 Ore pr. Pd. i Partier; men denne Exportost er ikke udført, men solgt igjen til Forbrug her paa Pladsen.

Mejeripiger har det fremdeles været vanskeligt at faa for de store Gaarde endog saa til høj Løn. Flere Steder manglede man den 1ste Maj ikke faa Mælkpiger og maatte leje Koner, indtil der hen i Tiden kunde faaes nogle svenske Piger. Selv mod Vinteren har det ikke været let at faa de nødvendige Piger; men de fleste Mejerier have dog nu fuldt Folkehald. Den halvaarlige Løn er for Mælkpiger fra 60 til 70 Kr., det sidste dog kun i enkelte trange Tilfælde.

Bed velvillig Smødekommen fra forskjellige Landmænd, seer jeg mig i Stand til at meddele det paa omstaaende Side opførte Uddrag af Mejeriregnskaberne for Aaret fra 1ste Novbr. 1875 til 31te Oktober 1876. — Ved disse Uddrag bemærkes endnu følgende:

Gaarden Nr. 1. Besætningen vedligeholdes ved et aarligt Indstud af 7 à 8 Stk. af eget Tillæg og ved Indkjøb af 2 à 3 Stk. Fodringen bestod i November og December af 6 Pd. Kraftfoder og $\frac{1}{4}$ Skp. Koer; i Januar og Februar 7 Pd. Kraftfoder, $\frac{1}{4}$ Skp. Koer; i Marts og April 7 Pd. Kraftfoder, $\frac{1}{4}$ Skp. Koer og en Givt Hø; i Maj 7 Pd. Kraftfoder, 1 Givt Hø; fra 16de Maj Tøjring, Juni og Juli $1\frac{1}{3}$ Td. Td. Græs pr. Ko foruden 18 Tdr. til Høslæt; August, September og Oktober løs Drift, ind om Natten og faaet Vikkehavre.

Gaarden Nr. 2. Der indstødes aarlig c. 15 Stk. $2\frac{1}{2}$ à 3 Aars Kvier af eget Tillæg. Tyrene kjøbes dels paa Tjen og dels paa Falster paa Gaarde, hvor Besætningen er af Anglerace. — Vinterfodringen var følgende: Saasnart

af nedenstaaende Gaardes
fra 1ste Novbr. 1875

Gaardens Nr.	Køholdets Størrelse					Kælvet. kælbede i					Racen.	Mejerifystemet.	Indvejet Mælk talt	
	Kælvetør paa 4 Kar eller derover.	Kælvetør under 4 Kar.	Kastere.	Oversløbere.	Salt.	November 1875.	December 1875.	Januar 1876.	Februar 1876.	Marts 1876.				Efter April 1876.
1	41	13	2	4	60	24	10	8	3	5	4	Fyensf og nordfless.	Syrnet Smør i Bøtter i 11. og 12. Mbd. 1875, 1. og 2. Mbd. 1876. $\frac{1}{2}$ Bøtter. $\frac{1}{2}$ Vand i Marts og Oktbr. Resten af Maret Is og Vand	309050
2	62	34	5	6	107	30	16	22	10	9	9	Angl. Ke- sten g. fyensf Fyensf.	Bøttemejeri, syrn. Fløde. Mælken aftøles med Is om Sommeren. Bøtter og syrn. Smør.	501513
3	77	16	2	5	100	15	11	6	11	30	20	Blandet Anglerrac.	do. do.	413822
4	56	17	2	9	84	21	28	7	5	9	3	Fyensf og flessvigf.	Bøtter om Vinteren, Vandmejeri tildele med Isafføling om Som- meren, syrn. Smør.	19807
5	28	18	1	.	47	11	9	4	11	11	.	Bl. Angler og Airshire.	Bøtter og syrn. Smør.	7764
6	12	4	.	.	16	3	.	1	3	1	8	Bl. Angler jydsk, holst	do. do.	15600
7	20	13	1	1	35	12	6	3	7	3	2	Bl. Angler jydsk, holst	Is t. Flødetønden om Sommeren. Jernsade, syrn. Smør.	20742
8	44	14	1	2	61	4	2	13	14	17	8	Bl. fyensf og angelsf.	do. do.	17640
9	26	10	1	2	39	5	3	4	3	11	9	Bl. fyensf holst., ang.	Is t. Flødetønden om Sommeren. Novbr., Dec., Jan., Oktb. Bøtter, syrn. Smør og alm. Ost, Resten af Maret Is og Vand, sødt Smør og Exportost.	49145
10	91	12	5	.	108	10	39	16	19	14	5	Bl. fyensf og angelsf.	Vandmejeri 7 ^o Vand R. Sødt Fløde og Exportost.	7601
11	13	1	.	.	14	8	1	.	.	.	5	Jydsk, fust og angelsf.	Judtit 19. Aug Ismejeri, efter den Tid Rilde med c. 300 Ld. 7 $\frac{1}{2}$ ^o Vand i Døgn. — Sødt Smør af 12 Timers Mælk med Is, 24 Tim. med Vand. Exportost.	**6791
12	32	4	.	6	42	Fyensf.		

**) Ere kun for de 5 Maanedes Juni, Juli, August, September og Oktober 1876.

Anm. Hvor den til Ostelavning anvendte Mængde Mælk ikke har været opgivet
hvor Ostens Svind ikke har kunnet sees af Optegnelserne, er dette anset til 16 %

traft

Mejeriregnskaber i Hæret

til 31te Oktober 1876.

Smørudbyttet.				Østeudbyttet									
Anvendt Mælk til Kjøring.	Salt Pd. Smør udvejet.	Gjennemsnitspris pr. Pd. Smør.	Gjennemsnitlig brugt Pd. Mælk til 1 Pd. udb. Smør.	Stummet Mælk til Øsning.	Kjøret Mælk til Øsning.	Salt til Øsning.	Pd Presjen.	Pd. Moden Øst.	Gjennemsnitspris pr Pd. moden Øst.	Brugt Pd. Mælk til 1 Pd. moden Øst.	1 Pd. Mælk er ved Smør- og Østelaavn. udbragt til.	Pd. Mælk pr. Ko.	Wækten er uden Indtægten af Etværene udbragt til pr. Ko.
Æ		Ø		Æ	Æ	Æ			Ø	Ø	Ø		Æ
293033	9143	119,16 Fast Pris.	32,00	6638	21,7	15,0	4,94	5151	254
496054	17592	122 Fast Pris.	28,19	227443	7995 3,5 %	235438	17690	*16272	22,25	14,46	5,55	1687	261
.	13043	120 Fast Pris.	31,34	155783	2317	158100	12131	10354	25	15,20	5,3	4138	219
308315	9748	123,21 Høist. Not.	31,6	.	.	.	7901	6990	21	15,0	5,1	4128	211
187529	5986	120 Fast Pris.	31,3	77960	4638	82589	6260	5785	22,74	14,30	5,27	4214	222
70517	2128	113 Fast Pris.	33,1	25	17,7	4,60	4852	223
150900	5469	115 Fast Pris.	27,6	55434	1108	56542	.	3839	23	14,7	5,4	4454	240
200364	6086	123,37 Højeste Not.	32,92	.	.	.	7130	.	25	15,0	5,16	3400	175
172513	5343	118 Fast Pris.	32,18	3336	23	15,0	4,95	4523	224
474575	15710	126,91 Dagspris.	30,02	314253	49937 16 %	364190	27766	23766	34	15,3	6,38	4550	290
74567	2270	132,80 Dagspris.	32,9	19916	3818 19 %	23724	1776	1504	28	15,7	5,74	5068	291
66322	2068	128,78	32,3	27843	2635 9 %	30478	2269	1891	26	16,1	5,5	.	.

*) Kun 8 % Svind paa Grund af, at Østen er solgt meget friskt til Landhandlere.
er anfat et Forbrug af 15 Pd. Mælk pr. Pd. moden Øst.

Besætningen tages paa Stald om Natten, hvilket i Reglen skeer fra først i Oktober, gives 2 Pd. Blandkornsgrut blandet med Avner daglig pr. Ko. Fra Indbindingsdagen til midt i November gives daglig pr. Ko 4 Pd. Byggrut og 1 à 2 Pd. Hørfrokager samt 6 à 8 Pd. Engshø. Fra Midten af Novbr., paa hvilken Tid Kælvingen begynder, gives daglig: I. Kælvekøerne 1 Pd. Hvedeklid, 1 Pd. Havregrut (eller 2 Pd. Havregrut), 2 Pd. af Smiths Palmenødmel, 2 Pd. Rapskager og 7 Pd. Engshø. II. Goldkøerne: 4 Pd. Byg- eller Blandkornsgrut, 1 Pd. Hørfrokager. III. Overløbere og Kastere: 2 Pd. Hvedeklid eller Havregrut og 2 Pd. Rapskager. IV. Gammelmalkerne: 3 Pd. Byg eller Blandkornsgrut og 1 Pd. Raps- eller Hørfrokager. V. Ungkvæget: 2 Pd. Byggrut og 1 Pd. Hørfrokager samt 4 Pd. Engshø. — Fra Midten af Januar faa Kælvekøerne et dagligt Tilskud pr. Ko af 2 Pd. Havregrut, og Tyrene, der hidtil have været fodrede som Goldkøerne, et dagligt Tilskud af en Givt Skaftehavre. — Fra Marts Maanedes Begyndelse faa Kælvekøerne atter et Tilskud daglig pr. Ko af 1 Pd. Havregrut, $\frac{1}{2}$ à 1 Pd. Palmenødmel samt i Reglen 6 à 8 Pd. Kløverhø istedetfor Engshø; Overløbere og Kastere 6 à 8 Pd. Kløver- eller Engshø. Kvægbesætningen fodres til følgende Tider: Morgen Kl. 5 Halm. — Kl. 7 Vand, Halvdelen af Kraftfoderet og umiddelbart derefter Avner eller Vaarsædshalm. — Middag Kl. 12 Hø til Kælvekøer og Ungkvæget, Hvedehalm til Resten. — Kl. 2 Vand, Halvdelen af Kraftfoderet og umiddelbart derefter Avner eller Vaarsædshalm. — Aften Kl. 6 Rug- eller Hvedehalm.

Sommerfodringen var: I de første 8 à 14 Dage, efter at Køerne ere komne paa Stald om Natten, faa de i Reglen i nogle Dage Halvdelen af det sidst givne Vinterkraftfoder. Saasnart 2det Aars Græsmark er let afgræsset, tøjres hele Besætningen i første Aars Kløver, indtil 2det Aars Græsmark atter kan afgive frisk og godt Tøjregræs. Først naar Græsningen er utilstrækkelig til Tøjring, løslades Besætningen,

hvilket i Reglen steer sidst i Juli eller først i August. Der haves 130 Tdr. Ld. med Græs, hvoraf i Reglen 30 Tdr. Ld. slaes til Hø foruden de Græsbløkke, som Køerne affætte under Tøjringen. Engene ere beregnede til 40 Tdr. Ld. almindelig god Eng, der alle slaes til Hø og derefter afgræsses. — Til Afgræsning før Slæt haves altsaa pr. Hoved 0,9 Td. Ld. og efter Slæt 1,36 Td. Ld. Af Kraftfoder er Intet anvendt paa Græs.

Gaarden Nr. 3. Til Befætningens Vedligeholdelse medgaaer et Indskud af 16 Stk., hvoraf 8 af eget Tillæg. — Fodringen er om Vinteren før Kælvingen 2 Pd. indkjøbte Foderstoffer og 2 Pd. Korn samt 8 Pd. Hø. — Efter Kælvingen 2 à 3 Pd. indkjøbte Foderstoffer, 4 à 8 Pd. Korn og 8 Pd. Hø. — Om Sommeren haves løs Drift, og der bruges 1 Td. Ld. Græs pr. Ko.

Gaarden Nr. 4. Befætningen rekruteres ved eget Tillæg. Det aarlige Indskud er c. 12 Stk. — Vinterfoderet bestod før Kælvingen af 3 Pd. Kraftfoder og 5 Pd. til treaarige Kvier med 2den Kalv, efter Kælvingen 7 à 8 Pd.; men ingen Koer eller Hø. I Sommer er der tøjret indtil 21de August, derefter løs Drift, og den 20de Oktober kom Befætningen paa Stald. — Der haves 90 Tdr. Græs til Græsning og Slæt.

Gaarden Nr. 5. Befætningen rekruteres med 4 à 8 Stkr. aarlig, som dels faaes paa Durupgaard, dels tillægges paa Gaarden. Køerne toges paa Stald den 11te Oktbr. 1875 og fik før Kælvingen: 1 Pd. Rapskager, 1 Pd. Klid, 1 Pd. Havre, 4 Pd. Hø, 10 Pd. Koer. — Kalvene fik det samme med Undtagelse af Klidene. — Efter Kælvingen gaves $1\frac{3}{4}$ Pd. Rapskager, 1 Pd. Havre, 1 Pd. Palmemel, 1 Pd. Klid, 10 Pd. Koer, 8 Pd. Hø. — Den 8de Januar tillagdes $\frac{1}{2}$ Pd. Klid, $\frac{1}{4}$ Pd. Palmemel. — Den 24de Januar byttedes $\frac{1}{4}$ Pd. Palmemel med $\frac{1}{4}$ Pd. Havregrut, da Smørret blev for blødt. — Den 15de Februar forøgedes Foderet til 2 Pd. Rapskager, $1\frac{1}{2}$ Pd. Palmemel, $1\frac{1}{2}$ Pd. Klid, $1\frac{1}{4}$ Pd.

Havregrut, 10 Pbd. Koer, 8 Pbd. Hø. — 15de Marts lagdes endnu $\frac{1}{4}$ Pbd. Palmemel, $\frac{1}{4}$ Pbd. Klid, $\frac{1}{4}$ Havre paa. — Efter 24de Marts gaves to Gange Hø. — Fra 6te April gaves 20 Pbd. Koer. — Fra den 17de April bestod Foderet af 2 Pbd. Rapskager, $2\frac{1}{2}$ Pbd. Palmemel, $1\frac{3}{4}$ Pbd. Klid, $1\frac{1}{2}$ Pbd. Havre samt Koer og Hø. — Den 2den Maj blev der lagt 1 Pbd. Havre paa. — Den 10de Maj kom Køerne paa Græs om Dagen, men kom ind om Natten og fik Hø og Kraftfoder. Fra 24de Maj vare de ogsaa ude om Natten. Der brugtes løs Drift paa c. 50 Tdr. Ld. Agergræs. — Efter Slatten græs- sedes desuden 17 Tdr. Ld. Eng. — Foruden Køerne have 2 Tyre og 9 Kvier græsset paa Marken hele Sommeren. Hefstene en kortere Tid. — Fra 15de Juli gaves 50 Pbd. Rapskager daglig til Besætningen. — Fra 18de August gaves 75 Pbd. — Den 20de Oktober toges Køerne paa Stald og fik daglig pr. Ko $1\frac{1}{2}$ Pbd. Rapskager, $1\frac{1}{2}$ Pbd. Klid, 1 Pbd. Palmemel, 1 Gidt Koer og Hø.

Gaarden Nr. 6. Der indfattes aarlig 2 à 3 Stkr. Kvier af eget Tillæg. Foderet bestod af: Før Kælvingen 3 Pbd. Blandkornsgrut, 1 Gang Hø. — Efter Kælvingen 2 Pbd. Grut, 1 Pbd. Rapskager, 2 Pbd. Hvedekliid, $\frac{1}{2}$ Stk. Koer, og da Køerne vare opfodrede, 1 Pbd. Grut mere.

Gaarden Nr. 7. Der indfattes aarlig 5 à 6 Kvier af eget Tillæg. — En Tyrkalv anskaffes hvert andet Aar af en ægte Anglerbesætning. — Fodringen bestod i Novbr., Decbr. og Januar af $1\frac{1}{4}$ Pbd. Rapskager, $1\frac{1}{4}$ Pbd. Hvedekliid, $\frac{1}{2}$ Pbd. Palmemel og $1\frac{1}{4}$ Pbd. Blandkornsgrut samt 8 Pbd. Enghø og 11 Pbd. Halm. — I Februar $1\frac{1}{2}$ Pbd. Rapskager, $1\frac{1}{4}$ Pbd. Hvedekliid, $\frac{1}{2}$ Pbd. Palmekjærnel, $2\frac{1}{2}$ Pbd. Blandkornsgrut, 8 Pbd. Enghø, 11 Pbd. Halm. I Marts og April indtil 5te Maj $1\frac{1}{2}$ Pbd. Rapskager, $2\frac{1}{2}$ Pbd. Hvedekliid, $\frac{1}{2}$ Pbd. Palmekjærnel, $2\frac{1}{2}$ Pbd. Blandkornsgrut, $7\frac{1}{2}$ Pbd. Kløverhø, 11 Pbd. Halm, alt pr. Dag og Hoved. Kvierne fik 2 Pbd. Blandkornsgrut, 2 Pbd. Avner og 14 Pbd. Eng- eller Kløverhø. — Besætningen kom ud om Dagen den 5te Maj og om Natten den

17de Maj. — Der bruges løs Drift og hverken Staldfodring eller Kraftfoder om Sommeren. — Køerne kom ind om Natten den 6te Oktober og fik 2 Pd. Palmemødmel samt Halm daglig pr. Ko; de indbandtes den 3die Novbr.; men de sidste Dage gik de kun ude nogle faa Timer.

Græsningsarealet har i Sommer været 45 $\frac{1}{2}$ Tdr. Ld. Agergræs, 26 Tdr. Ld. Eng og 4 $\frac{1}{2}$ Tdr. Ld. Mose, hvorpaa er avlet 8 Læs Kløverhø og 57 $\frac{1}{2}$ Læs Enghø samt græsset 36 Malkekoer, 2 Tyre, 12 Stkr. Ungkvæg, 8 Heste i 52 Dage, samt 14 Faar med Lam. — Værdien af det af hver Ko for-tærede Kraftfoder er 73 Kr. pr. Ko, og Høets Værdi er 50 Kr. pr. Ko.

Gaarden Nr. 8. Besætningen vedligeholdes væsentlig ved eget Tillæg, der indskydes aarlig 6 à 8 Stkr. — Fodringen er: før Kælningen 2 Pd. Blandkornsgrut, efter denne 3 Pd. do., 1 Pd. Hvedeklid, 1 Pd. Palmemel og 1 Pd. Rapskager, c. $\frac{1}{2}$ Læs Hø pr. Ko til hele Vinteren. — Om Sommeren er der brugt pr. Ko 1 Td. Ld. med Græs og $\frac{1}{4}$ Td. Ld. med Billehavre, men intet Kraftfoder og ingen Fodring paa Stald. Der er brugt løs Drift For- og Efteraar, ellers Løjring.

Gaarden Nr. 9. Der indskydes 5 à 6 Stkr. Kvier aarlig af eget Tillæg. — Vinterfoder. Før Kælningen: 1 Pd. Hvedeklid, 1 $\frac{1}{2}$ Pd. Blandkornsgrut og $\frac{1}{2}$ Pd. Palmekager. Efter Kælningen: 1 $\frac{1}{2}$ Pd. Blandkornsgrut, 1 $\frac{1}{2}$ Pd. Hvedeklid, 2 Pd. Rapskager, 2 Pd. Palmekager, 1 Givt Hø om Dagen samt ialt 350 Tdr. Koer. — Sommerfoder. Før Slæt 0,9 Td. Ld., efter Slæt 1,2 Td. Ld. pr. Hoved. — Fra 20de Juli er der givet pr. Malkeko 2 Pd. Hvedeklid daglig paa Græs. Løjring. 3 Septbr. løs Drift og fodret inde om Natten med 2 Pd. Kraftfoder.

Gaarden Nr. 10. 22 % af Besætningen fornyes aarlig dels ved Indkjøb i Angel, dels ved eget Tillæg. 5 mal-kende Overløbere ere fedede. — Vinterfoder. Før Kælningen 3 Pd. Kraftfoder, efter Kælningen 10 Pd. af Grut, Rapskager, Palmemel, Maltspirer og Klid i passende Forhold, 1

à 2 Gange daglig Hø, $\frac{1}{4}$ à $\frac{3}{4}$ Skp. Køer fra Februar af. — Sommerfoder. $\frac{3}{4}$ Td. Rd. Græs pr. Ko, i Juli og August 3 Pd. Kraftfoder, Tøjring indtil Midten af August, derefter løs Drift.

Gaarden Nr. 11. Gaarden er paa 30 Tdr. Rd. Agerjord. Der tillægges aarlig 1 à 2 Kalve; nogle Kvier kjøbes. — Vinterfoder. Kælveføerne fik 5 Pd. Hvedeklid, 2 Pd. Blandfornsgrut, $1\frac{1}{2}$ Pd. Rapskager, $1\frac{1}{2}$ Pd. Balmekager, 1 lille Givt Hø og indtil i Februar 12 Pd. Køer daglig. De øvrige Køer fik 4 Pd. Klid og 2 Pd. Grut daglig. — Sommerfoder. 3 Skp. Rd. Græs pr. Ko., løs Drift; men Køerne kom paa Stald to Gange daglig og fik 5 Pd. Hvedeklid daglig pr. Ko. — To Overløbere vare udsatte og fedede. — Kraftfoderets Værdi er c. 170 Kr. aarlig pr. Ko.

Gaarden Nr. 12. De modtagne Meddelelser omfatte kun Maanederne Juni til Oktober d. A., begge inklusive. — 10 à 15 % af Besætningen udskydes aarlig og erstattes ved Indkjøb af Tillægskalve fra anerkjendte Besætninger. — Fodringsen var i de 5 Maaneder følgende: Fra 12te Juni til 7de Juli staldfodredes med grøn Kløver og 2 Pd. Risklid daglig pr. Stk. — Resten af Sommeren tøjredes, indtil der midt i September sloges løs. Først i Oktober sloges ind om Natten. 1ste November toges paa Stald. — Smørret kom i de forskjellige Maaneder i følgende Klasser, anført procentvis:

Maanederne, hvori Smørret er produceret.	1. Klasse. %.	2. Klasse. %.	3. Klasse. %.	Kasseret. %.
Juni: 38. 12 Tim. Skummet.	25	75	.	.
Juli: Rigejaa	41,7	41,7	8,3	8,3
Aug.: Før 19de som forhen, efter 19. Aug. $7\frac{1}{4}$ ° Vand 24 Timers Skumning . .	.	80	20	.
Sept.: Som efter 19. Aug.	.	100	.	.
Oktbr.: Rigejaa	100	.	.
Jalt . .	19	71	7	3

Fra denne Gaard gjøres opmærksom paa, hvilket isvrigt ogsaa fremgaaer af Meddelelserne fra Gaarden Nr. 10, at det søde Smør altid paa Vejen til eller i Kjøbenhavn svinder c. 2,8 %, hvorved Gjennemsnitsprisen for denne Gaards Leve-
rance af sødt Smør vel bliver 128,78 Kr. pr. 100 Pbd. beregnet efter Kjøbmandens Vægt; men kun 125,17 Kr. pr. 100 Pbd. beregnet efter Mejeriets Salgsvægt. Da en saadan mindre Vægt hos Kjøbmanden aldrig finder Sted ved det syrnede Smør, er dette selvfølgelig en Faktor, som nødvendigvis maa komme i Be-
tragtning, naar man vil gjøre sig Fordelagtigheden klar ved at producere sødt eller syrnede Smør. — Dog maa her bemærkes, at ved Udregningen i foranstaaende Tabel af Forbruget af Mælk til 1 Pbd. Smør er der alle Steder benyttet Kjøbmandens Smørvægt, saaledes som denne er opgivet.

Da der paa Gaarden Nr. 10 er brugt dels Bøtter, dels Is og Vand, anføres nedenfor et udførligere Uddrag af de modtagne Meddelelser for denne Gaards Vedkommende:

Maanederne.	Mejeristhemet.	Anvendt Mælk til Sjerning	Indvejet Smør.	Brugt Pbd. Mælk pr. Pbd. Smør.
November 1875 . . .	Bøtter og syrnede Smør . .	6187	232	26,6
December — . . .	do. do.	18005	678	26,6
Januar 1876 . . .	do. do.	30479	1093	27,9
Februar — . . .	Første Halvdel Bøtter, sidste Halvdel Is og Vand, sødt Smør	42650	1355	31,5
Marts — . . .	Is og Vand, sødt Smør . .	53602	1832	29,2
April — . . .	do. do.	65343	2151	30,4
Maj — . . .	do. do.	68143	2213	30,8
Juni — . . .	do. do.	63467	2030	31,4
Juli — . . .	do. do.	54916	1856	29,6
August — . . .	do. do.	38727	1342	28,9
September — . . .	do. do.	22380	778	28,4
Oktober — . . .	Bøtter, syrnede Smør	10674	427	25,0
	Salt . .	474573	15996	29,6
	Udvejet Smør er . .		15710	30,02

Ved den paa foransførte Extrakt beregnede Værdi af Mælken er brugt følgende Fremgangsmaade, idet der er gaaet ud fra, at der ved det surnede Smør er opstiet til Skumning gjennemsnitlig 93 % af Mælken til Kjærning og 7 % ustummet Mælk er stiet lige i Flødetønden:

Exempel I ved surnet Smør.

Gaarden Nr. 2's Mælks Værdi er beregnet saaledes:

28,19 Pbd. ustummet Mælk giver:		
3 Flødetønden 2 Pbd. ustummet Mælk	} 1 Pbd. Smør 122 Ø.	
3 do. 4,36 Pbd. Fløde		
Til Ostning 21,83 Pbd. stummet Mælk		
do. 0,66 Pbd. kjærnet do. 3 %		
Salt . 22,49 Pbd. Mælk, som gav		
1,55 Pbd. Ost à 22,25 Øre		34,49 —
28,19 Pbd. ustummet Mælk		
er udbragt til		156,49 Ø.
5,55 Øre pr. Pbd. Mælk.		

Exempel II ved sødt Smør.

Mælkens Værdi ved Gaarden Nr. 11 er beregnet saaledes:

32,9 Pbd. ustummet Mælk giver:	
ved Skumning 5,48 Pbd. Fløde, hvoraf	
1 Pbd. Smør	132,80 Ø.
27,42 Pbd. stummet Mælk	
4,48 — kjærnet do.	
31,90 Pbd. Mælk give 2,03 Pbd. Ost	
i moden Tilstand à 28 Øre	56,84 —
32,9 Pbd. Mælk er udbragt til .	189,64 Ø.
5,76 Øre pr. Pbd. Mælk.	

Ved disse Beretninger er der ikke taget Hensyn til Værdien af Ballen og den kjærne Mælk, undtagen forsaavidt den sidste anvendes ved Ostlavningen.

Ansættes Værdien af 1 Pd. Valles til $\frac{1}{2}$ Ore og af 1 Pd. kjærnet Mælk til 1,25 Ore, naar begge anvendes til Svinesøde, hvilke Værdier vistnok ikke kunne være langt fra de rette, idetmindste ere Valles og Kjærnemælken her paa Gaarden nu i flere Aar udbragte til omtrent disse Priser, er 1 Pd. uskummet Mælk paa Gaarden Nr. 2 udbragt til 6,13 Ore og paa Gaarden Nr. 11 til 6,22 Ore. — Heraf er for Smørret paa Nr. 2 = 4,32 Ore og paa Nr. 11 = 4,03 Ore.

Rykkenssøde, den 5te December 1876.

H. Schroll.