

Mindre Meddelelser.

Fjerkræavl i Indien. England udfolder stadig store Bestræbelser for at fremme Fjerkræavl i dets Kolonier med den Tanke, at disse med Aarene kan naa hen til at levere en Del af Moderlandets store Æg- og Fjerkræforbrug, der aarlig beløber sig til store Værdier. Saaledes er der alt udrettet et godt Arbejde i Kanada, Australien o. s. v. og fornylig foreligger der en Beretning om Arbejdet samt Forholdene Fjerkræavl drives under i det østlige Bengal og Assam, hvor der opdrættes en Del Fjerkæ navnlig af den fattige Klasse blandt Befolkningen. Det er særlig i det saakaldte Chittagon Distrikt, at der produceres mest, navnlig Ænder og Andeæg, hvoraf der i 1908 eksporteredes for 27,500 £. Da store Strækninger i Regntiden staar under Vand, er det naturligt, at Andeavl særlig har fanget Opmærksomheden*).

Hønsene, der holdes, ligne noget indiske Kamphøns og er nærmest af lokal Landrace, gennemgaaende store af Krop og lægge gennemsnitlig ikke over 30 Æg om Aaret, dersom de faar Lov til at ruge, hvilket de er yderst tilbøjelige til; i modsat Fald kan de naa til at lægge indtil 80 Æg, brune af Farve. Hanekyllingerne bliver karpunerede i 4 til 5 Maaneders Alderen og fedede, og opnaar da en Pris af 1 sh. 6 d. pr. Stk. Gennemgaaende faar Hønsene Lov til at skytte sig selv. Hønsehusene er opførte af Bambusstænger, og paa Gulvet lægges Aske hver

*) Ænderne, der har meget vildt Blod i Aarerne, lægger op mod 100 Æg om Aaret, og de udruget af Høns. Af 10 Ænder beregnes en Indtægt af 36 sh. om Aaret. Ialt bliver der eksporteret 211.000 Ænder og Høns aarlig.

Dag. Kun hver 4. Familie holder en Hane, der da regerer over de 8 à 10 Høns som disse tilsammen holder. Kolera forekommer ofte og gør jævnlig en rig Høst. Æggene fremkommer i flere Egne med daarlig Skaal som Følge af Jordens Kalkfattighed. Præserving i Kalkvand benyttes en Del. For at forbedre Racerne foreslaas en Spredning i saa stor Stil som mulig af den for Klimaet passende, ogsaa hos os kendte Langshansrace, for navnlig gennem Krydsning at forøge Æglægningen. Der tænkes oprettet, ved Hjælp af Understøttelse fra Ministeriet, en større Spredningsstation for Rugeæg og Avlsdyr af nævnte Race. Endelig vil der blive dannet en speciel Forsøgsstation for Fjerkræavl i Lighed med, hvad Tilfældet er i de øvrige engelske Kolonier.

I Moderlandet England venter man sig som nævnt en Del af Kolonierne med Hensyn til Leverancen af Fjerkræprodukter, en Forventning, der i Virkeligheden maaske næppe vil gaa helt i Opfyldelse, da flere af de store Byer indenfor Kolonierne, særlig i Kanada, selv er i stærk Vækst med Hensyn til Befolkningens Antal og som Følge deraf Forbrug. Samtidig med, at man har søgt at udvikle Produktionen, har man haft Opmærksomheden henledt paa at faa indført de bedst mulige Konserveringsmaader, hvorved Vanskelighederne ved Forsendelsen fra en fjern Verdensdel til en anden om ikke ophæves, saa dog indskrænkes betydelig.

W. A. Kock.

Skovbruget i Danmark. Paa Grundlag af Arealopgørelsen i 1907 har Statens statistiske Bureau udarbejdet en interessant Oversigt over Danmarks Skovbrug.*) Det fremgaar af denne Oversigt, at der i 1907 fandtes 253,361 Tdr. Ld. med Løvtræer, 243,302 Tdr. Ld. med Naaetræer og 3,161 Tdr. Ld. med Krat af Hassel og andre Buske. Det bevoksede Areal var ialt 499,824 Tdr. Ld. Det ikke tilplantede Skovareal beregnedes til 87,972 Tdr. Ld. Det samlede Skovareal udgjorde altsaa 587,796 Tdr. Ld., og Danmarks »almindelige Skovprocent«, d. v. s. Forholdet mellem Skovarealet og det samlede Areal, var 8.3.

*) Statistiske Meddelelser. 4. Række. 22. Bind. 3. Hæfte.

»Skovprocenten« har været i betydelig Stigning fra Arealopgørelse til Arealopgørelse, men ikke desto mindre hører Danmark endnu til de skovfattigste Lande i Evropa, og kun 3 europæiske Lande synes at have en Skovprocent, der er lavere end Danmarks, nemlig Storbritannien og Irland (3.7), Portugal (7.1) og Holland (7.9). Den højeste Skovprocent har Sverige (51.6) og Finland (51.2). I Norge er den opgivet til 22.1. — For de enkelte Amter i Danmark svinger Forholdet mellem deres Skovareal og deres samlede Areal inden for ret vide Grænser, nemlig mellem 16.1 pCt. for Bornholm og 15.2 pCt. for Frederiksborg Amt paa den ene Side og Hjørring og Thisted Amter paa den anden Side med henholdsvis 5.4 og 5.9 pCt. af Arealet som Skov.

Endnu i 1907 udgjorde Løvtræerne en større Andel af Landets Skove end Naaletræerne, nemlig henholdsvis ca. 253,000 Tdr. Ld. og ca. 243,000 Tdr. Ld. Af Naaleskovene fandtes ikke mindre end 192,000 Tdr. Ld. i Jylland, der derimod kun havde ca. 90,000 Tdr. Ld. med Løvtræer.

Af det samlede Skovareal faldt ca. 348,500 Tdr. Ld. paa Halvøen og ca. 239,300 Tdr. Ld. paa Øerne. I Modsætning til, hvad Tilfældet var tidligere, er altsaa nu Jyllands Skovareal (saavel det samlede som det skovbevoksede) større end Øernes.

Det samlede Skovareal paa 588,000 Tdr. Ld. fordeler sig saaledes mellem offentlig og privat Eje:

Skove i offentlig Eje	{ Staten og Sorø Akademi 144,500 Tdr. Ld. Kommuneskove 12,400 —
Skove i privat Eje	

Udryddelse af Tidsler. Landbrugskamret for Brandenburg har »i Betragtning af, at den enkelte er magtesløs hvad Bekæmpelse af Tidslerne angaar«, anmodet den preussiske Regering om at udarbejde et Lovforslag vedrørende Tidslens Udryddelse.