

Agerdyrkningsberetning

fra Begyndelsen af April.

Den Bedømmelse, der strax efter Høst fældedes om Aarudbyttet, nemlig meget lidt til Fyld, bedre i Skjæppen, men en slet Kjærne, er i det Væsentlige bleven stadfæstet ved den nu tilendebragte Tærskning, og den er i hvert Fald ikke bleven forringet med Hensyn til Foldudbyttet, idet dette nu viser sig fuldt saa godt som ventet. I omstaaende Tabel vil man finde meddelt Kornets Fold og Vægt for hver af de enkelte Landsdele, men som et Udtryk for hele Landets Gjennemsnitsudbytte have vi sammenregnet alle de modtagne Beretninger og deraf uddraget de nedenfor angivne Fold af de 5 Hovedkornsorter for 1881, sammenlignet med de foregaaende 10 Aar.

Aaret	Hvede.	Rug.	2rd. Byg.	6rd. Byg.	Havre.
1871 . . .	13,5 Tdr.	12,5 Tdr.	12,0 Tdr.	12,7 Tdr.	14,1 Tdr.
1872 . . .	11,6 —	10,7 —	10,6 —	10,7 —	13,0 —
1873 . . .	11,5 —	9,6 —	10,7 —	10,4 —	13,1 —
1874 . . .	12,5 —	10,6 —	11,7 —	11,3 —	13,3 —
1875 . . .	12,7 —	11,5 —	11,5 —	11,5 —	12,9 —
1876 . . .	10,3 —	10,0 —	9,8 —	9,7 —	11,5 —
1877 . . .	12,0 —	11,7 —	10,0 —	10,8 —	11,7 —
1878 . . .	14,0 —	12,1 —	12,5 —	12,3 —	15,6 —
1879 . . .	12,7 —	9,7 —	9,9 —	10,0 —	12,8 —
1880 . . .	14,0 —	12,5 —	13,0 —	12,7 —	14,4 —
I Gjenn.	12,5 Tdr.	11,1 Tdr.	11,2 Tdr.	11,2 Tdr.	13,1 Tdr.
1881 . . .	9,4 —	11,6 —	10,9 —	11,7 —	12,7 —

Det fremgaaer da af denne Sammenligning, at Udbyttet af Høsten 1881 var en Del mindre end Gjennemsnittet af de foregaaende 10 Aar, thi dette er for alle 5 Hovedkornsorter 11,₈₂ Fold, medens Gjennemsnittet af disse i Aaret 1881 kun er 11,₂₆ Fold, og $\frac{1}{2}$ Fold eller omtrent 10 % er selvfølgelig et føleligt Mindreudbytte; men blandt de anførte 10 Aar findes dog 4, der i Middeltal af alle 5 Kornsorter have givet mindre Udbytte end 1881, nemlig:

1873	med	11, ₀₆	Fold,
1876	—	10, ₂₆	—
1877	—	11, ₂₄	—
1879	—	11, ₀₂	—

saa at 1876 endog gav et helt Fold mindre end 1881, hvorimod Kvaliteten i dette, som strax nærmere skal omtales, var langt ringere.

Til yderligere Belysning af Foldudbyttet maa endvidere gøres opmærksom paa, at dels var Hvedearealet, formedelst *Square head* Hvedens omfattende Bortfrysning, meget stærkt reduceret ved Ompløjning, og dels gav det tiloversblevne Areal endog 3 Fold mindre end almindelig af denne vigtige Kornart, ligesom ogsaa Tabet var saa meget større, som Foldudbyttet netop var daarligst i Landets vigtigste hvededyrkende Egne. Derimod har Rugen givet lidt over et Middeludbytte i Skjæppen og ligesaa det 6rd. Byg, hvilket sidste maaske for en Del skyldes, at det ofte saedes i de ompløjede Hvedemarker. Det 2rd. Byg og Havren have givet lidt under Middeludbytte i Fold.

Vægten pr. Td. har derimod for alle Kornsorternes Vedkommende været meget slet og for Hvedens især slettere end noget andet Aar siden 1870. For de andre Kornsorters Vedkommende finde vi, at 1873, 1879 og især 1877 have givet en lige saa ringe Vægt. Vægten var nemlig:

	1873	1877	1879	1881
af Hvede . . .	124,7 Pd.	123,0 Pd.	122,8 Pd.	120,4 Pd.
— Rug	118,4 —	117,3 —	117,2 —	118,7 —
— 2rd. Byg .	108,5 —	107,6 —	108,9 —	109,3 —
— 6rd. Byg .	102,4 —	100,3 —	101,5 —	101,3 —
— Havre . . .	79,5 —	74,5 —	77,4 —	77,9 —

Men Vægten er ikke det ene afgjørende for Kvaliteten, og i intet af de her omhandlede Aar har Sæden indeholdt saa mange spirede Korn og er der kommet saa meget muggent Korn med slet Farve i Markedet som efter sidste Aars Høst.

Med Hensyn til de enkelte Landsdele har Jylland havt den bedste Høst i Tøndetal, men derimod viser Tabellen, hvad ogsaa de enkelte Beretninger stærkt udtale, at Vægten og Kvaliteten særlig har været meget simpel i Jylland.

I de i Slutningen af denne Beretning meddelte Oplysninger om de enkelte Egnes Høstudbytte vil der ogsaa findes Opgivelse om de andre Kornarter, Handelsplanter og Rodfrugter, og deraf fremgaaer, at Bælgrugterne gave et tarveligt Udbytte, idet de vedbleve at gro, vare vanskelige at bjerge, en stor Masse Kjærne tabtes, og Kvaliteten blev meget simpel — 6 à 8 Fold synes at være det almindelige Gjennemsnitsudbytte. Boghveden har enkelte Steder paa Fyen givet ret godt, 8 à 12 Fold, men derimod i Jyllands Hedeegne i Regelen kun givet et højst tarveligt Udbytte. Rapsen, der synes at vinde Udbredelse i enkelte Egne, f. Ex. paa Mors, gav en ret god Høst. Kartoflerne gave et godt Udbytte, hvoraf dog mange ødelagdes i Kulerne i Efteraaret; men senere paa Vinteren have de staaet sig ret godt; Prisen har været meget lav. Rodfrugterne gave en Del under Middelhøst; de fleste Beretninger melde om 200 à 250 Tdr., enkelte naa vel over, men mange naa ikke saa højt; de have imidlertid staaet sig ret godt i Vinter og have i høj Grad bidraget til at støtte Fodringen.

Om vore Besætningers Foderstand nu ved Foraa-

Gjennemsnit af Foldene (Tdr. pr. Td. Land) og af Kornets Vægt (hollandsk)

for Aaret 1881 sammenlignet med 1863—80.

	Hrede.		Rug.		2rd. Byg.		6rd. Byg.		Havre.												
	1881.	1863—80.	1881.	1863—80.	1881.	1863—80.	1881.	1863—80.	1881.	1863—80.											
Stælland ¹⁾	9 ₄	121 ₈	12 ₁	127 ₃	11 ₈	120 ₈	12 ₃	121 ₄	11 ₈	111 ₅	11 ₉	112 ₀	13 ₃	108 ₂	12 ₆	108 ₂	13 ₀	80 ₈	14 ₂	82 ₀	
Falster	7 ₀	121 ₈	13 ₂	127 ₁	13 ₃	121 ₅	11 ₅	121 ₄	11 ₈	110 ₃	12 ₁	112 ₁	—	—	—	—	13 ₅	81 ₀	15 ₆	81 ₂	
Lolland	7 ₅	120 ₀	12 ₄	128 ₁	12 ₀	123 ₀	11 ₅	121 ₀	10 ₅	114 ₀	10 ₉	112 ₄	—	—	—	—	13 ₀	—	12 ₈	79 ₄	
Langeland	9 ₃₆	122 ₀	12 ₆	127 ₃	10 ₀	120 ₀	12 ₇	121 ₇	14 ₀	112 ₀	12 ₈	111 ₈	15 ₀	112 ₀	13 ₇	107 ₆	15 ₀	—	14 ₈	79 ₂	
Fyen	9 ₂	121 ₆	12 ₅	126 ₆	14 ₈	121 ₀	11 ₂	121 ₈	10 ₇	110 ₆	12 ₂	112 ₂	12 ₀	—	11 ₂	106 ₈	13 ₀	79 ₀	15 ₄	—	
Jylland:																					
a. gode Jorder ²⁾	11 ₃₆	119 ₂	11 ₇	125 ₁	13 ₈	115 ₇	10 ₉	118 ₄	12 ₂	107 ₂	11 ₄	111 ₆	11 ₇	93 ₅	11 ₅	103 ₀	14 ₀	79 ₃	14 ₆	78 ₇	
b. middelfg. do. ³⁾	7 ₈	116 ₅	10 ₂	124 ₀	9 ₉	115 ₉	8 ₉	120 ₂	9 ₆	105 ₄	9 ₅	109 ₃	9 ₆	96 ₈	8 ₉	100 ₈	11 ₀	74 ₅	10 ₄	77 ₁₆	
c. simple do. ⁴⁾	—	—	—	—	6 ₄	112 ₉	7 ₁	118 ₇	6 ₂	103 ₀	7 ₅	108 ₄	7 ₃	96 ₁	7 ₃	100 ₁	9 ₄	72 ₈	8 ₃	74 ₂	
I Gjennemsnit	8 ₇₇	120 ₄	12 ₁	126 ₅	11 ₅	118 ₇	10 ₈	120 ₆	10 ₈	109 ₃	11 ₁₀	111 ₂	11 ₅	101 ₈	10 ₈	104 ₄	12 ₁₀	77 ₂	13 ₃	79 ₀	

1) Med Samsø og Bornholm.

2) Østkysten af Halvøen (undtagen den lille jydsk Halvø og Høbroegnen) samt Thy og Mors.

3) Den lille jydsk Halvø og Vihøregnen.

4) Silkeborgnen, Hammerum Herred og Vestkysten.

rets Komme end ikke kan kaldes god, har dog Vinterfodringen gaaet langt bedre og lettere, end selv de mest sangvinske Forhaabninger i Efteraaret turde vente. Tilstanden var den Gang meget mislig og truende; Kvæget kom paa Stald i simpelt Huld, dels fordi Sommerernæringen havde været trang, dels fordi den rigeligere Eftergræsning var vandet og slap, og dels fordi man ofte trods det raa-kolde Vejr holdt Besætningerne længe ude. Paa Høstængen var der en meget ringe, ofte slet ingen Høbeholdning og i Laden sad kun $\frac{2}{3}$ til Halmfyld af hvad der plejer, og det tilmed af simpelt, udvasket og ofte muggent Foder; hertil kommer, at man paa Grund af de ringe Kreaturpriser stærkt krympede sig ved at reducere sin Besætning. Naar det under disse Forhold nu kan siges at være lykkedes Alle at overfodre deres Besætninger, saa at man med Ro kan se Græstiden imøde, da skyldes det først og fremmest den overordentlig milde Vinter, hvorved der kun er tæret saa lidt paa Foderet, og hvorved man i de magre Egne har kunnet lade Ungkvæget og Faarene jævnlige pille i Heden; dernæst og maaske i ikke mindre Grad, at man strax fra Efteraaret af var sig den kritiske Stilling bevidst og derfor fra først af planlagde og senere gennemførte Fodringen paa en saa økonomisk og omhyggelig Maade som maaske aldrig før; man besluttede sig strax til at bruge et betydeligt Kvantum Kraftfoder, saa meget mere, som meget af Kornet var saa slet, at det ikke egnede sig til Handelsvare; man formindskede eller slettede endog enhver Halmstrøelse og skrabede sammen af Tang, Tørvejord, Blade o. s. v. til at drikke Møgsaften eller førte endog, naar intet andet havdes, Sand ind i Grebningen. Som en 3die Grund til, at Foderet syntes drøjt, maa vel tillige nævnes, at det langtfra var saa behageligt og tiltalende for Kvæget som almindeligt, og at dette derfor ikke tærede det med Lyst. At Næringsevnen var ringe saavel i den Kjerne som i det Halmfoder, der bødes Kvæget, og at dette følelig savnede det gode Høfoder, saaes tydelig paa Kvægets Huld, thi er det end lykkedes at overfodre

Besætningerne, er det derimod ingenlunde lykkedes at forbedre det fra Sommeren og Efteraaret svækkede Huld, skjøndt der vel i Vinter er brugt mere Kraftfoder end tidligere; det er kun ganske enkeltvis, at en Beretning taler om velholdte Besætninger med glat og glinsende Haarlag, ellers meldes gjennemgaaende om en slet Foderstand, der er saa meget mere iøjnefaldende, som Kvæget iaar kun har saa lidt Mave. Hestene have fordret noget mere Kjærne til Maal end sædvanlig, da Havren blev høstet udvandet.

Ogsaa Besætningernes Sundhedstilstand har holdt sig bedre, end man i Efteraaret turde ventet, hvor man indsaa Nødvendigheden af at bruge saa meget slet bjerget Foder, men paa flere Punkter har der dog været følelige Misligheder. Særlig synes Hestene at have været mere end almindelig udsatte for Fordøjelselidelser, ofte temmelig langvarige, ligesom de tillige jævnlige have lidt af Forkølelsesygdomme, og Sogneforsikringsforeningerne have havt større Udgifter end almindelig. En Tilgift af blot 5—10 Pd. Gulerødder daglig pr. Hest har i mange Tilfælde viist en særdeles heldig Virkning. Men ogsaa blandt Kvæget har der været en Del Mavelidelser, og i Efteraaret var Kastning hyppig, ligesom det ogsaa ofte var vanskeligt at faa Køerne rene. Efter Nytaar blev Kastningen mindre, men dog er der ikke faa Gaarde, hvor næsten hele Besætningen har kastet; Grunden hertil ligger maaske snarere i Sommerens og Efteraarets ugunstige Forhold end i det nærrende Vinterfoder; et ret interessant Tilfælde meddeles fra en Gaard paa Bornholm, hvor $\frac{3}{4}$ af de Køer, der om Sommeren havde været paa Gaarden, have kastet i Vinterens Løb, medens ikke en eneste af 20 tilkøbte drægtige Køer har kastet, skjøndt de alle stode i samme Stald og fodredes ens. Med Læmningen udtales der i Almindelighed Tilfredshed, om der end er enkelte Gaarde, hvor 20—30 pCt. af Lammene ere døde. Svinene ere maaske den Del af Besætningen, der har lidt mest ved den store Sparsommelighed med Strøelse, da de som Følge deraf ofte

have maattet ligge paa vaade, kolde og glatte Gulve; blandt andet har dette medført, at en Del ere blevne halte og Krøblinger, hvilket har nødvendiggjort Slagtning.

Da Huldet var simpelt, og Foderet lidet nærende, blev Mælkeudbyttet i Forhold til det anvendte Kvantum Krafftoder kun lille, og tillige er der ofte brugt temmelig megen Mælk til et Pd. Smør. De høje Smør- og Svinepriser have imidlertid væsentlig bødet herpaa, og man er derfor i Almindelighed jævnt godt tilfreds med Vinterens Mejeriudbytte. Derimod lyder der jævnlig Klager over ikke at have faaet bjerget Is; hvor man har Ishuse og passede nøje paa at benytte de faa Dage, der bragte Is eller Sne, har man dog faaet bjerget noget; men større Vanskeligheder frembød sig, hvor man vilde stable Isen i Batteri, hvortil den var vel tynd. Denne Omstændighed har selvfølgelig yderligere bidraget til at skaffe Centrifugen en stærkt forøget Udbredelse.

For Fedningen har det været et særdeles heldigt Aar. Priserne paa det magre Kvæg vare i Efteraaret meget smaa, og Sendingerne til England hjembringe i dette Foraar usædvanlig gode Priser. Ved at Adgangen til Marsken atter er aabnet i dette Foraar, ere Priserne paa Staldstude og paa magert Kvæg til Fedning stegne saa stærkt, at ogsaa dette vil have betalt sig. Ligesaa byde de høje Priser paa Kælvekøer i dette Foraar vedkommende Holdere en god Fortjeneste; kun Skade, at de fleste af de Kælvekøer, der, særlig paa Fyen, udskydes til Salg, vise en saa ussel Fodring, at det nødvendigvis maa være en Hindring for en kraftig Udvikling. — Ogsaa Hestepriiserne ere høje, og Hestesalget har i Vinter bragt Landet mange Penge.

I Efteraaret næredes ogsaa en Del Bekymring for, at Vinteren skulde bringe Arbejdsløshed; Tærskningen vilde kun tage lidt Arbejde, og det mindre gode Aar tilskyndede ikke Folk at iværksætte nye Arbejder. Ogsaa i saa Henseende har Vinteren været særdeles gunstig og ligefrem opfordret Folk til at benytte de gunstige Vilkaar,

som en frostfri Jord frembød. Dette kom især til Gode med Plejningen, hvormed man i Efteraaret var langt tilbage, men som har ladet sig fortsætte den største Del af Vinteren. Selv Kjørselsarbejde, som ellers bedst fremmes paa Frost, har man kunnet udføre i stort Omfang; dette har iaar været til Held for Gjødningen, som i den tynde, halmfattige Tilstand, hvori den i Regelen fandtes, havde bedre af at blive udført paa holdbare Jorder end at ligge i de ofte saa slet indrettede Møddingsteder; den er da tillige ofte bleven nedpløjet. Ogsaa andre Kjørselsarbejder: fra Skovene, med Jord, Indsamling af Kompostmateriale, Mærgel o. lg. ere udførte uden Besvær. Ligesaa har Vinteren været særlig gunstig for andre Jordarbejder: Stenopbrydning, Dræning, Engvandingens anlæg, Hedeopdyrkning, Gravning af Plantehuller i den Mængde Smaaplantninger, som i stedse stærkt stigende Tal anlægges i Jyllands lettere Egne. Det eneste Arbejde, der er blevet besværliggjort ved Savnet af Frost, turde muligvis være Rørskær paa Aa- og Søbredderne, skjøndt ogsaa denne, hvor man nøje har iagttaget de faa islagte Tider, har kunnet lade sig udføre, uden at man behøvede at ty til Baadskæring; paa den anden Side har Rørskæret ikke som ellers saa ofte taget Skade af Snelæg.

Alle disse Arbejder have givet enhver, der har villet arbejde, tilstrækkeligt Erhverv, og Kommunerne have ikke, som man ventede, været nødsagede til at iværksætte Extraarbejder. En mild Vinter støtter desuden ogsaa paa andre Maader stærkt Arbejdsmanden, der spises mindre, og der spares Brændsel, hvilket særlig var heldigt iaar, da det ifjor var vanskeligt at faa Tørvene bjergede. Det er derfor ikke Arbejdsløshed eller Tryk af denne Art, der i dette Foraar foranlediger en stærkere Udvandring end nogensinde tidligere, men Lysten til at søge Lykken i Amerika er vakt med en Styrke, som i høj Grad fortjener Opmærksomhed, og som vist næppe hurtig vil standse igjen. Det turde særlig være den direkte Dampskibsfart til Amerika, som har bevirket dette; efterat denne er bleven iværksat,

og man kun behøver at tage til Kjøbenhavn for paa danske Skibe at føres direkte dertil, synes for Almuebefolkningen Rejsens Besværligheder i den Grad at være blevne formindskede, at Afstanden til Amerika paa en Maade er bleven forkortet til det Halve, og Amerika omtales ikke længere iblandt dem som et fjerntliggende Land, der er vanskeligt at naa til. Det er af alle Aldere og alle Stænder, om end fortrinsvis af Smaafolksklassen, der vandre ud; de realisere ofte med stort Tab deres herværende Ejendele; i sine Egne hengaaer ofte ikke en Uge, uden at der holdes en eller flere Auktioner over Udvandrendes Løsøre, som da ofte sælges for Spotpris.

Vintersæden, der i Efteraaret blev lagt under mindre gunstige Vilkaar, har ogsaa i høj Grad nydt Godt af den milde Vinter, og den staaer nu i det Hele taget ret lovende, om der end hist og her sees svage Marker. Blandt Rugmarkerne er det nærmest de tidlig saaede, der kunne siges at staa rigtig godt; de senere saaede have ikke udviklet sig saa meget, som man ifølge Vejret skulde ventet, hvad enten dette nu skyldes mindre god Saasæd, eller at den, hvor den saaedes i Stubbjod, kom i meget lidet bekvem Jord. Den stærke Dagmilding og temmelig følelige Nattefrost i Slutningen af Marts og Begyndelsen af April gulnede paa Rugen, men den vil let gjenvinde sin Friskhed ved godt Vejr. Paa lave, fugtige Jorder staaer den simpelt.

Der er iaar saet mere Rug end almindeligt, nemlig foruden i de sædvanlige Marker tillige ofte i de ifjor ompløjede Hvedemarker, der i Sommer bar Byg, ligesom der ogsaa af og til er saet Rug istedetfor Hvede, fordi man har havt vanskeligt ved at skaffe sig god Saasæd af denne.

Af Hvedemarkerne staa de tidligsaade særdeles godt, medens de sent saaede ere spidse og svage. Den Mislighed, der ifjor viste sig med Hensyn til *Square-head* Hvedens Haardførhed, synes ikke i nogen væsentlig Grad at have skræmmet Folk fra denne, og hvor man har havt god Saasæd, og den er saet i bekvem Jord, staaer den

saa kraftig og smuk som nogensinde. Men hvor disse Vilkaar ikke have været tilstede, er den noget svag.

Ogsaa for Kløver-Græsmarkerne har Vinteren været særlig heldig, men desuagtet sees ikke sjældent temmelig tarvelige Marker, særlig hvor der kun er isaaet faa Græsarter, og Hovedbestanden er Kløver. Sidste Sommer var jo ugunstig for Kløveren's Spiring og Væxt; desuden synes upaalideligt Frø jævnlige at bære Skylden, og endelig er Kløveren i de korte Rotationer (5—6 Aar) ofte bleven stærkt udtyndet af Kløveraalen og, ifølge en Beretning fra Odsherred tillige af Kløversvampen, »der af Form som Meldrøjer findes fremvoxede paa Rodhalsen«. Andet Aars Græsmarkerne staa ofte forholdsvis bedre, og da de kun gave et ringe Udbytte ifjor, vil der ventelig være Kraft i Jorden, til at de under gunstige Vejrforhold kunne skyde godt iaar. Overalt ere Markerne tidlig udviklede, og alt tegner til meget tidlig Græsning, saafremt Vejret vil blive saa mildt, at man tør vove Udslag.

Den milde Vinter har altsaa paa alle Maader støttet Landmanden i hans Virksomhed og medført, at han nu med langt frejdigere Blik kan tage fat paa det nye Arbejdsaar; maatte da de lysere Forhaabninger fyldestgøres og bøde paa de trykkende Vilkaar, som forrige Aar medførte mange Steder.

De os meddelte Foldangivelser (Tdr. pr. Td. Ld.) ere følgende:

Eggen Nord for Esrom: Hvede 12 Tdr. til 121 Pd., Rug 10 à 11 Tdr. til 123 Pd., 2radet Byg 13 à 14 Tdr. til 112—114 Pd., 6radet Byg 14 à 15 Tdr. til 108 Pd., Havre 15 Tdr. til 82—84 Pd., Kartofler 40 à 50 Tdr. og Runkelroer 200 Tdr. pr. Td. Land.

Eggen Nord for Hillerød: Rug 11 à 15 Tdr. til

119—121 Pd., Byg 13 à 16 Tdr. til 110—112 Pd. og Havre 12 à 16 Tdr. til 78—85 Pd.

Amager: Hveden frossen bort over alt, Rug 8 à 12 Tdr. til 118—122 Pd., 2radet Byg 14 à 15 Tdr. til 114—116 Pd., 6radet Byg 14 à 18 Tdr. til 108—112 Pd., Havre 16 à 22 Tdr., Kartofler 60 à 80 Tdr. og Runkelroer 300 à 400 Tdr. pr. Td. Land.

Egnen mellem Kjøbenhavn—Kjøge—Roskilde: Hvede 8 Tdr. til 122 Pd., Rug 14 Tdr. til 118 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 110 Pd., 6radet Byg 13 Tdr. til 106 Pd., Havre 14 Tdr. til 80 Pd., Runkelroer 200 Tdr. pr. Td. Ld.

Egnen Vest for Roeskilde: Hvede 10 Tdr. til 124 Pd., Rug 12 Tdr. til 120 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 112 Pd., 6radet Byg 12 Tdr. til 108 Pd., Havre 12 Tdr. til 80 Pd., Ærter 3 Tdr., Kartofler 70 Tdr., Runkelroer 160 Tdr., Rutabaga 250 Tdr., Turnips 200 Tdr. og Gulerodder 140 Tdr. pr. Td. Land.

Ringstedegnen: Hvede 8 Tdr. til 110 Pd., Rug 10 Tdr. til 122 Pd., 2radet Byg 10 Tdr. til 108 Pd., Havre 9 Tdr., Ærter 9½ Tdr. og Kartofler 23 Tdr. pr. Td. Land.

Egnen Nord for Skarritsø: Hvede 11 Tdr. til 120 Pd., Rug 15 Tdr. til 120 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 108 Pd., 6radet Byg 12 Tdr. til 105 Pd., Havre 14 Tdr., Bønner 11 Tdr., Ærter 10 Tdr., Kartofler 50 Tdr., Runkelroer 250 Tdr. og Rutabaga 250 Tdr. pr. Td. Land.

Odsherred: Rug 10 à 12 Tdr. til 118—120 Pd., 2radet Byg 11 à 12 Tdr. til 110—114 Pd., 6radet Byg 14 à 15 Tdr. til 104—108 Pd., Havre 10 à 13 Tdr. til 80 Pd., Bønner 5 à 6 Tdr. til 128 Pd., Ærter mislykkede, Kartofler 50 à 112 Tdr. og Runkelroer 200 à 250 Tdr. pr. Td. Land.

Samsø: Hvede 8 Tdr. til 120—125 Pd., Rug 10 à 11 Tdr. til 118—120 Pd., 2radet Byg 8 à 10 Tdr. til 109—111 Pd., Havre 8 Tdr. til 75—80 Pd. og Ærter 7 Tdr. pr. Td. Land.

Egnen mellem Kallundborg og Slagelse: Hvede 10 Tdr. til 120 Pd., Rug 15 Tdr. til 119 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 108 Pd., 6radet Byg 12 Tdr. til 112 Pd., Havre 13 Tdr. til 80 Pd., Ærter 6 Tdr., Kartoffler 60 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Rutabaga 300 Tdr. og Turnips 250 pr. Td. Land.

Egnen mellem Slagelse og Skjelskør: Hvede 10 à 11 Tdr. til 120—125 Pd., Rug 11 à 12 Tdr. til 122 Pd., 2radet Byg 12 à 14 Tdr. til 108—112 Pd., 6radet Byg 12 à 13 Tdr. til 110 Pd., Havre 12 à 14 Tdr. til 77—78 Pd., Ærter 8 à 10 Tdr., Kartoffler 50 Tdr. og Runkelroer 200 à 300 Tdr. pr. Td. Land.

Faxeegnen: Hvede 6 à 8 Tdr. til 123 Pd., Rug 10 à 12 Tdr. til 122 Pd., 2radet Byg 10 à 12 Tdr. til 113 Pd., 6radet Byg 12 à 14 Tdr. til 110 Pd. og Havre 12 à 16 Tdr. til 82 Pd. pr. Td. Land.

Vordingborgegnen: Hvede 8 à 10 Tdr. til 124—130 Pd., Rug 10 à 12 Tdr. til 120—122 Pd., 2radet Byg 10 à 12 Tdr. til 110—112 Pd., 6radet Byg 12 à 16 Tdr. til 104—108 Pd., Havre 10 à 11 Tdr. til 84—86 Pd., Bønner 8 à 9 Tdr., Ærter 6 à 8 Tdr., Kartoffler 80 Tdr., Runkelroer 250 Tdr. og Turnips 250 Tdr. pr. Td. Land.

Det nordlige Falster: Hvede 5 à 9 Tdr. til 120—122 Pd., Rug 12 à 15 Tdr. til 120—124 Pd., 2radet Byg 10 à 15 Tdr. til 109—112 Pd., Havre 11 à 18 Tdr., Ærter 7 à 10 Tdr., Kartoffler 60 Tdr., Runkelroer 300 Tdr. og Rutabaga 320 Tdr. pr. Td. Land.

Det nordøstlige Falster: Hvede 6 à 8 Tdr. til 120—125 Pd., Rug 12 à 14 Tdr. til 120—122 Pd., 2radet Byg 8 à 12 Tdr. til 108—112 Pd., Havre 12 à 13 Tdr. til 80—82 Pd., Bønner 8 à 9 Tdr., Ærter 7 à 8 Tdr., Kartoffler 90 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Rutabaga 256 Tdr. og Turnips 430 Tdr. pr. Td. Land.

Det østlige Lolland: Hvede 5 à 6 Tdr. til 118—122 Pd., Rug 12 Tdr. til 122—124 Pd., 2radet Byg 9 à 12

Tdr. til 110—118 Pd., Havre 9 à 11 Tdr. og Ærter 6 à 8 Tdr. pr. Td. Land.

Det vestlige Lolland: Hvede 5 à 14 Tdr. til 123—130 Pd., Rug 11 Tdr. til 124 Pd., 2radet Byg 8 à 14 Tdr. til 110—118 Pd., Havre 16 Tdr., Ærter 8 Tdr. og Runkelroer 230 Tdr.

Langeland: Hvede 8 à 10 Tdr. til 120—124 Pd., Rug 12 à 14 Tdr. til 120 Pd., 2radet Byg 12 à 16 Tdr. til 110—114 Pd., 6radet Byg 12 à 16 Tdr. til 110—114 Pd., Havre 14 à 16 Tdr., Ærter 10 à 16 Tdr., Kartoffler 70 Tdr. og Runkelroer 200—250 Tdr. pr. Td. Land.

Det nordøstlige Fyen: Hvede 10 Tdr. til 124 Pd., Rug 12 à 13 Tdr. til 122 Pd., 2radet Byg 9 à 10 Tdr. til 110 Pd. og Havre 11 à 12 Tdr. til 80 Pd. pr. Td. Land.

Egnen mellem Ringe og Faaborg: Hvede $7\frac{1}{2}$ Tdr. til 121 Pd., Rug 11 Tdr. til 121 Pd., 2radet Byg 11 Tdr. til 112 Pd., Havre $12\frac{1}{2}$ Tdr. til 77 Pd., Ærter 7 Tdr., Boghvede $6\frac{1}{2}$ Tdr., Kartoffler 60 Tdr., Runkelroer og Gulerodder 225 Tdr. pr. Td. Land.

Assenseggen: Hvede 10 Tdr. til 120 Pd., Rug 20 Tdr. til 120 Pd., 2radet Byg $11\frac{1}{2}$ Tdr. til 110 Pd., 6radet Byg 12 Tdr. til 100 Pd., Havre 15 Tdr. til 80 Pd., Ærter 8 Tdr., Boghvede 12 Tdr., Kartoffler 36 Tdr., Runkelroer 300 Tdr. og Turnips 200 Tdr. pr. Td. Land.

Frederits-Vejleegnen: Hvede 8 à 15 Tdr. til 111—124 Pd., Rug 12 à 16 Tdr. til 120 Pd., 2radet Byg 11 à 15 Tdr. til 105—110 Pd., 6radet Byg 14 Tdr. til 100 Pd., Havre 13 à 18 Tdr. til 75—81 Pd., Bønner 12 Tdr., Ærter 12 Tdr., Boghvede 9 Tdr. og Runkelroer 200—250 Tdr.

Egnen Syd for Horsens: Hvede 13 à 15 Tdr. til 116—120 Pd., Rug 14 Tdr. til 115—118 Pd., 2radet Byg 11 Tdr. til 105—108 Pd., Havre 15 à 16 Tdr. til 80 Pd., Kartoffler 40 à 50 Tdr., Runkelroer 200 Tdr. og Rutabaga og Turnips 300 Tdr. pr. Td. Land.

Hads Herred: Hvede ca. 17 Tdr. til 120 Pd., Rug

16 Tdr. til 119 Pd., 2radet Byg 10 Tdr. til 108 Pd., Havre 15 Tdr. til 78 Pd., Runkelroer 200 Tdr. og Turnips 300 Tdr. pr. Td. Land.

Aarhuseggen: Hvede 10 à 14 Tdr. til 110—120 Pd., Rug 12 à 18 Tdr. til 110—115 Pd., 2radet Byg 12 à 18 Tdr. til 100—110 Pd., Havre 15 à 18 Tdr. til 70—80 Pd., Rutabaga 200 à 250 Tdr. og Turnips 200 à 250 Tdr. pr. Td. Land.

Æbeltofteggen: Hvede 8 à 9 Tdr. til 112—118 Pd., Rug 9 à 10 Tdr. til 116—121 Pd., 2radet Byg 7 à 10 Tdr. til 100—106 Pd., 6radet Byg 8 à 9 Tdr. til 95—100 Pd., Havre 9 à 12 Tdr. til 79—84 Pd., Bønner 6 à 8 Tdr., Ærter 7 à 8 Tdr., Boghvede 6 à 8 Tdr., Kartoffler 70 à 90 Tdr., Runkelroer 100 à 150 Tdr., Rutabaga 200 à 300 Tdr. og Turnips 250 à 300 Tdr. pr. Td. Land.

Grenaa Vestereggen: Rug 7 à 11 Tdr. til 110—122 Pd., 2radet Byg 8 à 12 Tdr. til 90—110 Pd., Havre 8 à 10 Tdr. til 65—80 Pd., Boghvede 4 à 6 Tdr., Kartoffler 60 à 70 Tdr., Rutabaga 180 à 200 Tdr. og Turnips 200 à 250 Tdr. pr. Td. Land.

Hobroeggen: Rug 9 Tdr. til 114 Pd., 2radet Byg 9 Tdr. til 106 Pd., 6radet Byg 9 à 10 Tdr. til 97 Pd., Havre 11 à 12 Tdr. til 75 à 78 Pd., Bønner 6 Tdr., Kartoffler 60 à 70 Tdr., Rutabaga 180 Tdr. og Turnips 220 Tdr. pr. Td. Land.

Eggen Sydøst for Aalborg: Hvede 10 Tdr. til 124 Pd., Rug 14 Tdr. til 118 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 106 Pd., 6radet Byg 10 Tdr. til 92 Pd., Havre 15 Tdr. til 80 Pd., Kartoffler 90 à 100 Tdr. Runkelroer 200 Tdr., Rutabaga 220 Tdr. og Turnips 250 Tdr. pr. Td. Land.

Vendsyssel: Hvede 10 Tdr. til 120 Pd., Rug 12 Tdr. til 114 Pd., 2radet Byg 10 Tdr. til 106 Pd., 6radet Byg 11 Tdr. til 95 Pd., Havre 10 Tdr. til 70 Pd., Bønner 10 Tdr., Ærter 10 Tdr., Kartoffler 50 Tdr., Rutabaga 250 Tdr. og Turnips 280 Tdr. pr. Td. Land.

Morsø: Hvede 5 à 11 Tdr. til 116—120 Pd., Rug 9 à 14 Tdr. til 108—120 Pd., 2radet Byg 12 à 18 Tdr. til 100—110 Pd., 6radet Byg 10 à 18 Tdr. til 90—96 Pd., Havre 15 à 20 Tdr., Ærter 5 à 10 Tdr., Kartofler 35 à 65 Tdr., Runkelroer 100 à 150 Tdr., Rutabaga 150 à 200 Tdr., Turnips 250 à 300 Tdr. og Gulerodder 200 à 300 Tdr., Raps 15 à 20 Tdr. til 110—125 Pd. pr. Td. Land.

Lysgaard Herred: Hvede 5 à 9 Tdr. til 115—120 Pd., Rug 10 à 14 Tdr. til 110—120 Pd., 2radet Byg 10 à 12 Tdr. til 100—106 Pd., 6radet Byg 10 à 12 Tdr. til 90—102 Pd., Havre 12 à 14 Tdr. til 65—70 Pd., Kartofler 70 à 80 Tdr. og Turnips 300 à 400 Tdr. pr. Td. Land.

Eggen Vest for Silkeborg: Rug 6 Tdr. til 110 Pd., 2radet Byg 6 Tdr. til 100 Pd., 6radet Byg 7 Tdr. til 96 Pd., Havre 11 à 12 Tdr. til 80 Pd., Boghvede 6 à 8 Tdr., Kartofler 15 Tdr. og Runkelroer 150 à 200 Tdr. pr. Td. Land.

Hammerum Herred: Rug 7 à 8 Tdr. til 110 Pd., 6radet Byg 8 à 9 Tdr. til 90—100 Pd., Havre 8 à 10 Tdr. til 65—70 Pd., Boghvede 4 à 6 Tdr. til 90—100 Pd. og Kartofler 40 à 50 Tdr. pr. Td. Land.

Eggen mellem Herning og Holstebro: Rug 4 à 8 Tdr. til 110—116 Pd., 2radet Byg 5 à 8 Tdr. til 104—108 Pd., 6radet Byg 5 à 8 Tdr. til 90—100 Pd., Havre 6 à 12 Tdr., Kartofler 30 Tdr., Runkelroer 160 Tdr., Rutabaga 120 Tdr. og Turnips 200 Tdr. pr. Td. Land.

Eggen mellem Ringkjøbing og Varde: Rug 5 à 7 Tdr. til 112—118 Pd., 6radet Byg 6 à 8 Tdr. til 96—101 Pd., Havre 7 à 9 Tdr. til 68—72 Pd. og Boghvede 3 à 5 Tdr. til 92—96 Pd. pr. Td. Land.

Eggen mellem Varde og Esbjerg: Rug 5 à 7 Tdr. til 108—114 Pd., 2radet Byg, 5 à 7 Tdr. til 105—109 Pd., 6radet Byg 5 à 7 Tdr. til 95—100 Pd., Havre 7 à 9 Tdr. til 68—75 Pd., Boghvede 3 à 6 Tdr. til 94—98 Pd., Kar-

tofler 20 à 35 Tdr., Rutabaga 150 à 230 Tdr. og Turnips 200 à 300 Tdr.

Det nordvestlige Bornholm: Hvede 7 Tdr. til 118 Pd., Rug 9 Tdr. til 122 Pd., 2radet Byg 12 Tdr. til 115 Pd., 6radet Byg 12 Tdr. til 108 Pd., Havre 14 Tdr. til 78 Pd. og Ærter 10 Tdr. pr. Td. Land.

Det sydøstlige Bornholm: Hvede 12 Tdr. til 127—129 Pd., Rug 12 Tdr. til 123—125 Pd., 2radet Byg 10 à 14 Tdr. til 113—118 Pd., 6radet Byg 12 à 15 Tdr. til 108—110 Pd., Havre 15 Tdr. til 84 Pd., Ærter 6 à 10 Tdr., Kartoffler 50 à 55 Tdr. og Runkelroer 100 à 150 Tdr. pr. Td. Land.
