

Hvor meget tørret Hø giver en vis Bægtmængde af Enggræs?

(Befvaret af Dr. Gleitsmann paa Wilbenhain.)

I den praktiske Landhuusholdning findes endnu mange videnskabelige Spørgsmaal uafgjorte, og deres Befvarelse forudsætter nøie anstillede Forsøg. Uden disse er vor Erfaring ei alene usikker, men som oftest endog skuffende. Et Exempel herpaa er Høproduktionen. Mangen tænkende Landmand maa have fundet det paafaldende, naar han hørte, at 100 Pd. Græs eller Klover skulde til Opfodring kunne sættes lige med 20 Pd. Hø. Det er vistnok ikke mig bekjendt, at Nogen har antaget dette som Grundregel for Fodringen. Og dog kalder man denne Erfaring en praktisk Jagttagelse.

Man har opstillet Sætningen saaledes, at 100 Pd. Enggræs give, naar det er tørret, 20 Pd. Hø. Derimod antog man om Kloveren, at 100 Pund afmeiet Klover give 22 Pd. Kloverhø.

Jorgjæves har jeg seet mig om efter specielle Forsøg i trykte Skrifter, og ingen af mine praktiske Herrer Colleger kunde give mig Anviisning paa saadanne, end sige, at de selv skulde have indladt sig paa denne, til et grundigt Resultat ledende, Undersøgelse. De Forsøg, som min mangeaarige Ven, Hr. Professor Pohl har anstillet, ere udførte efter en altfor indskrænket Maalestof, til at denne kunde anvendes ved en større Mængde af Enggræs.

Dette var Grund nok for mig til at bestemme mig til selv at gjøre et Forsøg. Jeg tog dertil nylig

Opfodring, velvilligen meddeelte indholdsricke Beretning, som iøvrigt først kom ham tilhænde medio Novbr. 1834. —
Dnskeligt, om flere Sag- og Stebkyndige rundt om i
Landet vilde bære Lidskriftet med lignende Meddelelser.