

Agerdyrkningsberetning.

Oktober 1898.

Vejrliget i Væxtperioden*) i Aar var i flere Henseender betydelig afvigende fra de normale Forhold. Medens April forløb temmelig normalt saavel med Hensyn til Temperatur som Nedbør, udmærkede Maj og Juni sig ved ualmindelig store Nedbørsmængder og ved temmelig lav Middelvarme. Juli blev endog ualmindelig kold, men dog temmelig tør, medens den egentlige Sommervarme først indfandt sig i August, om den end var af kort Værlighed. September fik en Del milde, smukke Dage, og paa nogle Dage først i Oktober var Vejret helt sommerligt. I det Hele taget blæste Vinden med stor Kulingsgrad, og adskillige Gange steg den til Storm, snart fra vestlige, snart fra østlige Retninger.

April 1898 blev — som omstaaende Tabel viser — $1/2^{\circ}$ for kold i Jylland, men næsten 1° for kold paa Øerne. Det første Tidøgn blev med blæsende, vestlige Vinde temmelig mildt, ligesom den sidste Uge indeholdt flere milde Dage; men forøvrigt bragte østlige til nordlige Vinde køligt Vejr, navnlig d. 18—20, og endnu Natten til d. 24. frøs det omkring 3° paa de koldeste Stationer; forøvrigt var Nattefrost sjelden i April. Nedbøren afveg ikke meget fra Normalen (se Tabellen) undtagen paa Sjælland, der fik 50 Procent mere end normalt. Den faldt næsten udelukkende d. 4.—10., d. 16.—18. og d. 29.; især d. 10. fik hele Landet rigelig Nedbør, 10—15 Millimeter.

*) Meddelt af Hr. cand. math. V. Willaume-Jantzen. Underbestyrer ved Meteorologisk Institut.

1898		April	Maj	Juni	Juli	August	Septbr.
Middelvarens Afvigelse fra Normalen. C°.	Jylland.....	- 0.4	- 0.7	- 0.6	- 2.2	0.0	+ 0.2
	Øerne	- 0.9	- 0.6	- 0.8	- 2.5	+ 0.2	+ 0.3
Nedbørens Afvigelse i Procent fra Normalen	Nord-Jylland.....	+ 23	+ 118	+ 87	- 51	+ 60	- 41
	Vest-Jylland	- 16	+ 103	+ 81	- 7	+ 22	- 51
	Øst-Jylland.....	+ 20	+ 115	+ 113	- 36	+ 13	- 40
	Fyen	0	+ 97	+ 110	- 45	+ 4	- 47
	Sjælland.....	+ 50	+ 141	+ 112	- 25	- 5	- 24
	Lolland-Falster	- 13	+ 114	+ 129	- 45	- 25	- 53
	Bornholm	+ 20	+ 14	- 45	- 3	- 41	- 1
	Danmark.....	+ 14	+ 115	+ 111	- 33	+ 9	- 40

Maj 1898 blev $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ ° for kold; Maanedens deler sig med Hensyn til Temperaturen i 4 Perioder: d. 1.—8. blev gjennemsnitlig $2\frac{1}{2}$ ° varmere end normalt, d. 9.—18. $1\frac{1}{2}$ ° for kold, d. 19.—23. ca. 2° for varm og d. 24.—31. $2\frac{1}{2}$ ° for kold; Afvigelserne paa de enkelte Dage vare kun undtagelsesvis særlig store, idet kun d. 2.—4. fortjene Karakteren: meget varme (3—5° varmere end normalt), medens kun d. 30. blev særlig kold (4° under Normalen). Nattefrost indtraf slet ikke paa Øerne, hvor den sidste Frost i dette Foraar allerede faldt i den sidste Uge af April; dette fandt ligeledes Sted for store Strækninger af Jylland, medens de koldeste Steder i denne Landsdel af og til fik svag Nattefrost (÷ 2—3°) i Maj, sidste Gang d. 18. At Maj, trods de nævnte, ikke store Temperatur-Afvigelser fra de normale Forhold, gjorde Indtryk af at være meget kold, maa tilskrives den Omstændighed, at Solen kun sjældent formaaede at trænge igjennem det store Skydække, der var karakteristisk for Maanedens. I Forbindelse hermed kan nævnes, at medens den gjennemsnitlige Maximums-Temperatur i Kjøbenhavn i Maj er $15\frac{1}{2}$ °, var den i Aar 2° lavere, det vil med andre Ord sige: Dagvarmen manglede. Barometret holdt sig ualmindelig lavt med hyppig skiftende, blæsende Vinde; d. 11.—12. blæste der en stærk Storm over Landet fra Sydvest og Vest, idet et kraftigt Barometer-Minimum passerede tæt Vest for Jylland. Nedbøren var meget stor undtagen paa Bornholm, der kun fik 14 Procent for meget; mest fik Hjørring, Aalborg og Vejle Amter, Samsø samt Sjælland, undtagen Præstø Amt, nemlig ca. 130—150 Procent for meget, medens den øvrige Del af Landet fik ca. 90—120 Procent for meget. Tages hele Landet, Bornholm undtagen, under Et, fik Maj 84 Millimeter eller 115 Procent for meget. Siden 1861 har ingen Maj Maaned naaet dette Tal; de nærmeste vare 74 Mill. i 1873 og 73 Mill. i 1897, medens 1869, 1872 og 1878 havde 60—65 Mill. Nedbør i Maj. Nedbøren faldt samtidigt paa et meget stort Antal Dage i Maj i Aar, nemlig (som Gjennemsnit af

22 Stationer) paa 19 Dage, medens 11 er det normale Antal. Under saadanne Omstændigheder bliver det lettest at nævne de tørre Dage; de faldt mest enkeltvis, medens kun d. 17.—20. udgjorde en omtrent helt tør Periode. Regnbyggerne vare dog kun store paa enkelte Dage, især d. 5.—6. og d. 25.—26. Navnlig d. 3.—4. og d. 20.—21. gik stærke Tordenvejr hen over store Strækninger af Landet.

Juni 1898 begyndte, som Maj endte, med køligt og regnfuldt Vejr. Allerede d. 5. kom der dog Omslag i Vejret, og d. 6.—11. udgjorde en varm og tør Periode, medens den paafølgende Uge kun fik normal Temperatur og af og til lidt Regn. Derimod var hele den øvrige Del af Maaneden kølig ($1\frac{1}{2}$ — 2^0 under Normalen) og regnfuld; paa flere Dage faldt der Nedbørsmængder paa 20—40 Mill. under stærkt udbredte Tordenvejr. Hele Maaneden blev med flest vestlige Vinde $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ 0 for kold. Det samlede Nedslag var, ligesom i Maj, meget stort: Jylland undtagen Randers Amt, Odense, Frederiksborg og Præstø Amter fik ca. 70—100, den øvrige Del af Landet ca. 110—170 Procent mere end normalt; kun Bornholm fik for lidt Nedbør, nemlig godt Halvdelen af Normalen.

Den samlede Nedbør i Maj og Juni udgjorde, naar hele Landet tages under Et, Bornholm dog undtagen, 183 Millimeter, hvilket netop er lige saa meget, som der normalt falder i Danmark i alle de 3 egentlige Sommermaaneder, Juni—August. Siden 1861 er der ikke i noget Aar falden saa stor en Nedbør i Maj og Juni tilsammen; de største Tal ere 140 Mill. i 1879 og 139 i 1892.

Den kølige Periode, der var begyndt kort efter Midten af Juni, holdt Stand gennem hele Juli og gennem den første Trediedel af August. De største Afvigelser fra Normal-Temperaturen forekom dog i Juli, der indeholdt ikke færre end 14 særlig kolde Dage (3 — 5^0 under Normalen eller samme Temperatur som Slutningen af Maj eller Slutningen af September under normale Forhold), og hvis Middeltemperatur blev ca. $2\frac{1}{2}$ 0 for lav, saa at man

— idet Sammenligning i dette Tilfælde kun kan foretages for Kjøbenhavns Vedkommende — maa gaa over et halvt Aarhundrede tilbage for at træffe paa en i væsentlig Grad koldere Juli. Det var ualmindelig vedholdende Vinde fra Vest og Nordvest, der frembragte da lave Temperaturer i Juli i Aar; og da Vinden tilmed blæste med stor Kulingsgrad, flere Gange som Storm, og Skymængden stadig var stor, var det ingenlunde sommerligt Vejr. Nedbøren var dog ikke stor; tvertimod faldt der gjennemsnitlig for hele Landet kun 2 Tredjedele af Normalen; den faldt — i Reglen som mindre Byger — især d. 2.—9., d. 16.—18. og d. 23.—24.

I en stor Del af den første, kolde Del af August faldt der atter stærke Regnbyger, især d. 5.—9., tildels under Tordenvejr. Endelig d. 11. August blev Vejret tørt, Temperaturen steg langsomt, og d. 14.—23. August indeholdt en Del virkelige Sommerdage med høj Temperaturen (3—6° over Normalen), aldeles overvejende tørt Vejr og flest sydøstlige Vinde, der kun blæste med svag eller frisk Kuling; d. 16.—17. gav dog under heftige Tordenvejr en Del Regn i Jylland, hvorimod Øerne saa godt som Intet fik. Atter d. 22. August rasede der i Vestjylland et heftigt Tordenvejr med stærke Regnskyl, og Dagen efter gik et andet Uvejr, ledsaget af temmelig stærk Regn, hen over en stor Del af Øerne. Vejret blev samtidigt køligt, og dette holdt sig i den sidste Uge af August, tildels ledsaget af hyppige Regnbyger. August fik kun normal Middeltemperatur. Nedbøren var temmelig stor i Jylland, men 25—40 Procent for lille paa Lolland-Falster og Bornholm. Ligesom det gennemgaaende havde været ualmindelig blæsende Vejr gennem det meste af Sommeren, saaledes endte denne med en voldsom Storm d. 31. August, der begyndte fra Sydvest og drejede gennem Vest helt om til Nord.

September 1898 fik omtrent normal Middeltemperatur, men indeholdt dog en varm Periode, d. 4.—18. med næsten helt tørt og ret klart Vejr; forøvrigt var det

temmelig køligt Vejr med Regnbyger af og til; d. 29. gav stærk Regn (15—30 Mill.) over det største Del af Landet. Nattefrost indtraf første Gang i Nætterne mellem den 24. og 26. i det indre Jylland samt paa et enkelt Sted paa Sjælland (Søndersted ved Holbæk). Det samlede Nedslag for September blev gennemsnitlig 40 Procent under Normalen; kun Bornholm og Kjøbenhavns Amt naaede omtrent Normalen, Frederiksborg Amt fik endog 14 Procent for meget.

Om Oktober 1898 maa vi, da Materialet endnu ikke foreligger for hele Maaneden, indskrænke os til at nævne, at Maximums-Thermometret i Kjøbenhavn d. 3. steg til $18\frac{1}{2}^{\circ}$ C., den 4. til 19° , en Stand der dog er overgaaet flere Gange med indtil 1° i den sidste Menneskealder; en Gang, nemlig i 1878, endog saa sent som den 9. Oktober

Høbjærgningen fra Agrene gav et ualmindelig stort Udbytte, hvad Fyld angaar og med Hensyn til Beskaffenheden kan siges, at hvor Slaaningen blev opsat saa længe som muligt, er Kvaliteten af det indbjærgede Hø tilfredsstillende. Gjennemgaaende tør man næppe sætte Kvaliteten til over Middell, hvorimod Mængden maa an gives betydelig over.

Høbjærgningen fra Engene har i Aar givet et overordentlig forskjelligt Udbytte under Indflydelse af den for Engene efter deres Beskaffenhed forskjellige Slaanings-tid samt Vandafledningsforholdene. Fra Hadsund, Aalborg-egnen, anføres, at de dyrkede Enge vare ganske gode og at kun kolde, sure Kjærstrækninger lede af det sene, kolde Foraar; hvor Engene sloges tidlig gav de ringe Udbytte, men hvor Høstningen opsattes til hen imod Kornhøsten var Udbyttet rigtig godt. Det samme gjælder for andre Dele af Landet. Udbyttet af Engene tør dog for hele Landet — efter de indkomne Beretninger — sættes til et godt Middelaar.

Kornhøstens Udbytte er i den forløbne Somme imødeset med en vis Spænding Landet over, idet man befrygtede, at Modningen paa Grund at den ofte sene Saaning og den kolde og vaade Sommer, skulde trække saa længe ud, at Høstudbyttet derved skulde blive forringet i betydeligt Omfang.

Rugen har gennemgaaende fyldt godt, er bleven bjærget i fortrinlig Tilstand, men Foldudbyttet er kun i enkelte Tilfælde godt; de fleste Steder er et usædvanlig ringe Kjørneudbytte af denne Kornsort Reglen. Stormene i Juni og Juli skadede Rugen meget, særlig i Jylland.

Hveden har ligeledes givet et mindre tilfredsstillende Kjørneudbytte, fra Midt-Lolland og Nord-Øst-Fyen mældes endog 4—5 Fold under det normale. Fra det nord-østlige Fyen mældes om af Regnen stærkt nedpiskede Hvedemarker og dermed følgende store Udgifter til Mejningen.

Bygget har Landet over givet en god Middelhøst, om dog enkelte Egne mælde om mindre tilfredsstillende Tærskningsresultater. Kvaliteten af Maltbygget er næppe fuldt tilfredsstillende, hvorimod Kvalitetsvægten er god. For den store Del af Landet, som dyrker Byg til Foderbrug, maa denne Kornsort siges at have givet et endog særdeles tilfredsstillende Resultat.

Havrehøsten synes overalt at være god, mange Steder endog usædvanlig rig; Stormene have dog i adskillige Egne forringet Udbyttet noget.

Fra alle Egne mældes om fortrinligt Høstvejr og en langt tidligere Modning end man turde vente. Arbejdskraften har nogenlunde kunnet strække til. Mejemaskiner vinde en stedse stærkt stigende Udbredelse, men fra flere Steder lyde Klager over, at Mejningen med Haanden gaar langsommere, hvor Maskiner indføres.

Kartoflerne give gennemgaaende et tarveligt Udbytte og ville ikke kunne dække Forbruget, hvilket fremgaar af de stærkt stigende Priser; særlig er Udbyttet ringe paa lidt sværere Jorder.

Runkelroerne ere — som man kunde vente —

langt fra saa gode som normalt, hvilket skyldes den kolde og vaade Sommer; det samme gjælder Turnips og Kaalrabi, hvorimod Gulerødder synes at give omkring et Middeludbytte.

Det samme, som gjælder om Runkelroer, gjælder for Sukkerroer. Fra Assens-Egnen angives Udbyttet til 260 à 270 Centner pr. Td. Land og fra Midt-Lolland til 33 % under det normale; lægges dette sidste Tal til Grund for en Beregning omfattende samtlige Rodfrugter, vil man kunne anslaa Mindreudbyttet af Rodfrugtavlen til 10 Mill. Kroner.

I denne Forbindelse maa erindres, at Værdien af Korn og Hø høsten er (i Gjennemsnit af 1894—96) c. 250 Mill. Kroner, saaledes at Mindreudbyttet af Rodfrugtavlen opvejes ved en forholdsvis lille Forøgelse af Udbyttet af Korn og Hø; og da man kan fastslaa en rigelig Høst og en vist særlig rigelig Vaarsædshøst, er det formentlig forsvarligt at gaa ud fra, at Danmarks samlede Høst i 1898 har givet et tilfredsstillende Udbytte. Ovenstaaende Betragtninger ere imidlertid byggede paa saa spredte Oplysninger og i saa ringe Omfang paa Tærskningsresultater, at det ingenlunde er udelukket, at disse kunne afvige noget fra den endelige Opgjørelse; da de hidrøre fra erfarne, praktiske Landmænd vilde det dog være forunderligt, om de skulde være misvisende i nogen særlig Grad.

Brakbehandlingen har ikke fremkaldt særlige Bemærkninger. Beretningerne give det Indtryk, at det vaade Vejrlig har lagt Vanskeligheder i Vejen for Udryddelsen af Rodkrudt, hvorimod det har lettet Uskadeliggjørelsen af Frøkrudt.

Plantesygdomme synes ikke at være optraadt i særlig Grad, hvorimod Ukrudtet har haft de bedste Betingelser for en frodig Udvikling og har i ikke faa Tilfælde bredt sig i en saadan Grad, at Høstudbyttet, navnlig af Rodfrugter, derved er forringet.

Sommergræsningen skulde man efter Vejrliget have antaget for ualmindelig rigelig og Beretningerne be-

kræfte da ogsaa i de fleste Tilfælde denne Formodning, dog for flere Egnes Vedkommende med den Bemærkning, at det kolde, raa Vejr har — hvor Staldfodring ikke er anvendt — fremkaldt Vanskeligheder for Kreaturholdet. Mælkeudbyttet har gjennemgaaende været rigeligt, hvori- mod der fra enkelte Steder klages over tynd Mælk.

Produktpriserne. Medens der synes at være almindelig Tilfredshed med Priserne paa Heste og Svin, lyde Beretningerne fra Jylland, særlig fra de opdrættende Egne, paa stor Upaalidelighed i Kreaturpriserne.

Angaaende Priserne paa andre af Landbrugets Salgsvarer i indeværende Aar er det for tidligt at udtale nogen Mening. Den stærke Stigning i Kornpriserne er vist kun i meget ringe Omfang kommet Landbruget til Gode — om Smørpriserne véd man, at de have været lavere end i 1897, hvorimod Heste- og Svinepriser, som anført, enstemmig synes at omtales som tilfredsstillende. — Det vilde være interessant at erfare, hvilken Pris levende Kreaturer og fersk Kjød er udbragt til i Sommer sammenlignet med 1897 — en foreløbig Undersøgelse heraf viser, at Priserne ikke have været lavere til Export — i hvert Fald ikke i Perioden fra midt i Juli til midt i Oktober, ligesom der siden 1ste April er indarbejdet et Marked af dansk Kjød i Tyskland, som vist for Tiden maa siges at være lige saa lønnende som den levende Udførsel, der stedse er udsat for pludselige Forbud, og dermed følgende stærke Prisfald.

Af de modtagne Beretninger hidsættes følgende:

Fra Horns Herred. Paa Sommertidens Arbeidskraft har det i Aar skortet noget, og man har derfor søgt Erstatning i Maskiner; jeg har ikke tidligere her paa Egnen set saa mange Slaa- og Høstmaskiner i Brug som i Aar. — Med

Hensyn til Arbejdskraftens Aftagen, da er denne mig en noget gaadefuld Kjendsgjerning, thi Befolkningen tager ikke af, tvertimod, og der er ikke nogen særlig mærkbar Afgang til den store By Kjøbenhavn, undtagen netop for Pigers Vedkommende. — Arbejdskraften her paa Egnen bestaar hovedsagelig af gifte Folk, baade paa de større og mindre Gaarde, og uagtet disse altsaa er fast bosatte her, og, som anført, ikke i Aftagende, kan Mangel paa Arbejdskraft dog nu i travle Tider mærkes. — Det maa vel saa ligge i, at Villighed til Arbejde ikke er saa stor nu som før.

Om Produktpriserne kan der for Tiden ikke siges meget; det er ikke mig bekjendt at der er sket noget større Salg af Korn endnu. — Byggens Salgstid er jo nu, og den ligger vist ogsaa de fleste Steder parat, kun ventende paa en stabil Pris. — Nogen Rug er solgt til Dagspriser efter Bladenes Notering. —

Flæskepriserne have holdt sig overordentlig godt, fra Juli Maaned til nu, gjennemsnitlig over 40 Øre pr. Pd.

Maa Markens Afrøder i Aar kunne siges at have været gode, i Fyld endog overordentlig rigelige, saa er det modsatte Tilfældet med Frugt og Havesager; disse ere i Aar baade kvantativt og kvalitativt saa ualmindelig ringe paa alle Omraader, som det ikke har været i mange Aar. —

Fra Vordingborg Egnen. Kvantiteten af Agerhø var gennemgaaende meget stor, Kvaliteten var for en stor Del afhængig af det Tidspunkt, paa hvilket man slog Høet. Det først slaaede havde man Lejlighed til at faa godt stakket, det fik saa Masser af Regn paa Stakkene, men hvor disse vare satte godt, klarede det sig dog nogenluude; anderledes med det Hø der blev slaaet lidt senere, det blev stærkt udvasket, medens det laa paa Skaar og meget af det blev næsten værdiløst; bedst stillede vare de, der slog deres Agerhø sidst, de havde Lejlighed til at stakke og hjemkjøre Høet i fortrinlig Stand. Der var lave Enge, som stode under Vand hele Sommeren og hvor al Høbjærgning var umulig, men

bortset herfra, have Engene givet en smuk Afgrøde, som blev bjærget i god Stand.

Da Kornhøsten var forbi, anslog man den i Reglen til ikke lidt over en Middelhøst, men efterhaanden som Tærskningen skrider frem, kommer man til at slaa lidt af paa Resultatet, dog mener jeg, at Høsten for denne Egn Vedkommende maa betegnes som »en god Middelhøst«.

Rugen fyldte godt, men mange klage over »Spring« saaledes at Foldudbyttet ikke svarer til Travernes Antal. Rugen blev bjærget under ualmindelig gunstige Vejrforhold, saa Kvaliteten er udmærket god. Hveden fyldte forholdsvis stærkere end Rugen, Kjærnen er lille men Kvalitetsvægten ualmindelig høj, Kjærneudbyttet er ikke over Middel. Vejret under Hvedehøsten var særdeles gunstigt.

Byggen gav veludviklede Kjærner med høj Kvalitetsvægt, men Foldudbyttet lader en Del tilbage at ønske og maa vistnok sættes til lidt under Middel, særlig for de mere kælne Bygvarieteteters Vedkommende. Havre og Blandsæd ere absolut Favoriterne i Aar og give saavel i Straa som i Kjærne en ualmindelig smuk Afgrøde; en Del Havre blæste af under Stormen i de sidste Dage af August, men dog næppe i en Udstrækning, der kan faa Indflydelse paa hele Egnens Udbytte. Bælgsæd dyrkes kun i ringe Udstrækning paa denne Egn og i Aar blev den ikke rigtig moden ret mange Steder.

Det er meget sjældent at se en rigtig smuk Roemark i Aar, og Roerne vise sig da ogsaa nu ved Optagningen at være smaa; dette skyldes formentlig saavel den ualmindelig sene Saatid, som ogsaa den meget vaade og kolde Forsommer. Udbyttet af Rodfrøer, herunder ogsaa regnet Kartoffler og Gulerødder, er ikke lidt under Middel.

Plantesygdomme have ikke vist sig i nogen iøjnefaldende Grad; Insektangreb forekom særlig langs Skovene, dog ikke i nogen høj Grad. Ukrudtet derimod florerede stærkt. Forholdene herfor have jo ogsaa været særlig gunstige, Jordens Foraarsbehandling var paa Grund af den megen Væde mangelfuld og saa den stærke Nedbør i hele Forsommeren, der bevirkede, at Sæden paa de kolde Jorder kom daarligt frem;

dette sammenlagt frembragte, særlig paa lave og kolde Jorder, rigelig Tidsel, Følfoed og Kvikafgrøder, der i Sandhed vare pragtfulde og som vare vel egnede til at give os alle Stof til Eftertanke. Sikkert er det, at vi her staa ved en af det danske Landbrugs værste Sygdomme for Øieblikket.

Her paa Egnen har Arbejdskraften været tilstede i tilstrækkelig Mængde. Arbejdslønnen er stigende. Arbejderne slutte sig sammen i Fagforeninger, men Striker er ikke forekommet og Forholdet mellem Arbejder og Arbejdsgiver er i det Hele taget godt.

Produktpriserne ere nogenlunde tilfredsstillende, naar Hensyn tages til det gjennem mange Aar sig stadig sænkende Prisniveau, der synes jo endogsaa paa forskellige Punkter at være en lille Bedring at spore. Fouragebeholdningerne ere gode. Landbrugets Udsigt for den nærmeste Fremtid maa derfor betegnes som forholdsvis ret lovende.

Fra Nord-Falster. Høudbyttet har været usædvanlig stort baade af Ager og Eng. Alle have mere end sædvanlig, men mange har faaet navnlig Kløverhøet daarlig bjerget, særlig hvor man har brugt den gammeldags Høberedningsmaade med kun at stakke det een Gang.

Høstarbeidet har været aldeles usædvanlig let, stærkt tørrende Vejr næsten hele Tiden, og den Regn der kom, faldt saare let.

Meiemaskinerne bruges mere og mere. Vintersæden er tarvelig, i særlig Grad vel nok Rugen, men ogsaa Hveden kommer adskilligt under Middel. Vaarsæden er rettidig saaet, god, Bælgsæden fortrinlig.

Rodfrugterne tarveligere end i 1888, og det siger meget. Vor stive Jord kan ikke taale en Saaning som med Hensyn til Jordens Beskaffenhed, staaer lige paa Grændsen af at være forsvarlig, lige saa lidt som Sommerens Væde og Kulde. Og det bedre Vejr i August og September, gjorde kun ringe Gavn paa Roerne, da Jorden var saa sammenklappet og død, at der ingen videre Udvikling kom.

Ukrudt har paa Grund af ovennævnte Forhold været saa

slem som ikke i mange Aar, og der er sikkert lagt en slem Udsæd.

Det eneste Lyspunkt med Priserne er Svinene — hvilke jo holder sig godt. Smør, og særlig Ost, har været lavere end sædvanlig og Kornpriserne, der var lidt stivere strax efter Høst, holder jo ikke nu. Man venter dog vel snarest, at de, blive bedre senere. Der har været naaet 6 Øre for enkelte Partier Hvede og $5\frac{1}{2}$ Øre for Byg, men kun for smaa Partier.

Fra Midtjylland. I denne Egn er Høavlen i alt væsentligt indskrænket til Ageren, idet Egnens Engarealer kun er af ringe Udstrækning. Mængden af det i Aar avlede Agerhø overstiger saa godt som overalt her i Egnen det sædvanlige. Høets Beskaffenhed tør derimod ikke roses. Ganske vist er Høet for den alt overvejende Del bjærget i god tør Tilstand — takket være nogle fejende Stormdage med klar Himmel. Men i den usædvanlig regnfulde Bjærgningsperiode kunde det umulig undgaas, at en Del af Høet ved Udvadskning tabte betydelig i Næringsværdi. Bedst bjærgedes Høet paa de Arealer, hvor man lod Græs og Kløver staa længst. Thi som bekjendt blev Vejret mod Høbjergningens Slutning mere medgjørligt end tilforn.

Et ved Høbjergningens Slutning foretaget Tilbageblik over Vejrforholdene i det sidst forløbne Landbrugsaar maa uvilkaarlig lede til den Betragtning, at disse have været saa modgaaende, som vel tænkeligt — i hvert Fald i Forhold til Udførelsen af de praktiske Landbrugsarbejder. Først en Høstecampagne 1897, saa vanskelig, som man i mange Aar ikke har oplevet. Saa en frostfri Vinter, der saa at sige umuliggjorde Landbrugets ordinaire Vinterkjørsler, og som efterlod Jorden i sejt og død Tilstand. Deretter en Saaperiode, saa vedholdende fugtig, at man paa vor Egns svære Jorder syntes lige godt — eller daarligt — hjulpen, hvad enten man søgte at liste sig gennem Saaningen ved udelukkende Brug af lette Harver, eller man ved Benyttelse af de sværere Harver skabte sig fast Arbejde med Forsøg paa at tærse de

herved fremkomne sejge Knolde i Stykker ved skiftevis Benyttelse af svære Tromler og Harver. Naar saa hertil kom, at Højbjergningen — i hvert Fald dennes første og vigtigste Afsnit — foregik under Syndflodens Himmeltegn, tør det nok paastaas, at det praktiske Landbrug hertilands ikke i mange Aar har havt saa helt igjennem vanskelige Vejrforhold at virke under.

Glædeligt er det saa at kunne notere, at Høstvejret i Aar gav Landmændene Erstatning for de til da ustandne Lidelser. Det blev jo saa godt som næsten tænkeligt og tilintetgjorde enhver Bekymring for, at den sene Høsttid skulde betinge betydelige Bjærgningsvanskeligheder. Ved Høstens Begyndelse var Jorden allerede bleven fast og tør — en første Forudsætning for Mejemaskinernes gode Arbejdspræstation. Og alle Høstarbejder, lige fra Mejning til Hjemkjørsel, gik da ogsaa rask og glat fra Haanden, hvortil kommer, at det usædvanlig tørre Efteraar har budt extraordinairt gode Betingelser for Tærskning fra Stak.

Hvad Høstudbyttet angaar, klages der overalt over et ringe Kjerneudbytte af Vintersæden, særlig af Hveden. 12 à 14 Fold Hvede er det almindelige, hvor man plejer at avle 16 à 20 Fold. At manglende Varme er Aarsagen til dette ringe Kjerneudbytte, er Alle enige om. Thi der var Planter og Ax nok — ikke saa lidt mere end almindeligt. Derimod ere Anskuelserne delte m. H. t. den Maade, hvorpaa den manglende Varme har betinget dette Deficit i det ordinaire Hvedeudbytte. Nogle mene, at det skyldes, at Frugtknuden i mange Hvedeblomster slet ikke er bleven bestøvet. Andre nære den Opfattelse, at der i og for sig ikke har været — og iflg. Hvedens særlige Bestøvningsforhold vanskelig har kunnet være — Noget iverjen med Hvedens Blomstring og Bestøvning, men at det utilfredsstillende Kornudbytte skyldes, at Masser af de bestøvede Frugtknuder paa Grund af Kulden ikke ere komne til ordentlig Udvikling. Nedskriveren heraf har ved Tærskning af egen Hvedeafgrøde jugeret, at hvis Afgrødens Smaahvede — for en væsentlig Del repræsenteret af ganske smaa indskrumpede og uudviklede Kjærner — var

kommen til fuld Udvikling, vilde Foldudbyttet ikke som nu have andraget ca. 14, men ca. 25 Tdr. pr. Td. Ld. Jeg tror derfor ikke, at mangelfuld Bestøvning, men at mangelfuld Udvikling af de bestøvede Frugtknuder bærer Skylden for Hvedens ringe Kornudbytte. Interessant vilde det imidlertid være at erfare vore Plantefysiologers Mening om dette Forhold! Enhver Landmand ved, at Blomstringsperioden er af indgribende Betydning for Rugens Kjørneudbytte. Derfor er dennes Karakter med fuld Ret Gjenstand for interesseret Drøftelse blandt Rugdyrkerne. Derimod hører man blandt Landmændene aldrig Tale om Blomstringsvilkaarene for Byg og Havre. Man slaar sig — og vel med Rette — til Ro med, at hos disse selvbestøvende Kornarter gaar Bestøvningen sin jævne Gang, uafhængig af Vejret. Men Hvedens Bestøvning foregaar jo paa en hermed analog Maade! Er der derfor virkelig nogensomhelst Anledning for Hvedeproducenterne til — som det i de senere Aar mere og mere bliver Skik hertilands — med bekymret Mine at drøfte Vejrforholdenes Indflydelse paa Hvedens Blomstring. Det arbejdende Landbrug har saamænd iforvejen Bekymringer nok — det behøver ikke overflødigt at forøge Ballasten af saadanne! Og hvis derfor Sagkundskaben kunde berolige vore Hvedeproducenter med en Udtalelse om, at Hvedens Blomstring her tillands lige saa lidt behøver at være Gjenstand for bekymrede Vejrbetragtninger, som Byggets og Havrens Blomstring, kan jeg ikke se rettere, end at en saadan Udtalelse vilde være højest betimelig. —

Udbyttet af Vaarsæden — særlig af Havren — synes snarest at overstige Forventningerne og tør betegnes som en god Middelhøst. Bygkvaliteten, som for denne Egns Vedkommende spiller en ikke uvæsentlig Rolle, er imidlertid ikke fuldt tilfredsstillende, til Trods for at Byggets Kvalitetsvægt gjennemgaaende er god. Thi vel fandt Byggets Bjærgning Sted under særdeles gunstige Vejrforhold, men dets Saaning havde gjennemgaaende fundet Sted for sent, til at der kunde paaregnes Avl af virkelig fin Vare.

At Sukkerroeafgrøderne i Aar give et ualmindelig

ringe Udbytte er et naturligt og ingenlunde uventet Resultat af Foraarets og Sommerens uforholdsmæssig store Regnmængde og Mangel paa Varme. Det paaregnes almindelig, at Udbyttet vil blive rigelig 33 pCt. mindre end normalt. Hvis denne Forventning slaar til, er det ensbetydende med, at f. Ex. Maribo Sukkerfabrik i Aar kommer til at betale sine Roedyrkere noget som $\frac{1}{4}$ Mill. Kroner mindre end i Aaringer med normal Afgrøde. Foderroedyrkningen spiller kun ringe Rolle her i Egnen, idet Sukkerroerne væsentligt have remplaceret Foderroerne. De Arealer, man ser med disse sidste, synes iøvrigt ogsaa ret tarvelige.

Af forskjelligartede Angreb paa Aarets Afgrøder har særlig Opmærksomheden fæstet sig ved det hidtil ikke iagttagne Fænomen, at en stor Del Hvedeplanter, som Følge af Overgnavning i Jordskorpen, henimod Høst afblegedes og gave nærmest svange eller ufuldkomment udviklede Korn. Den af Dr. Rostrup opstillede Formodning, at det er Agersneglen, som er Skyld i Ødelæggelsen, synes jo at harmonere godt med de Iagttagelser, der i saa Henseende ere gjorte fra anden Side.

Fra Assens Egnen Høbjærgningen faldt særlig i Begyndelsen for Agerhøets Vedkommende under meget ugunstige Vejrforhold, hvorfor ogsaa en stor Del blev indbjærget i mindre god Tilstand, senere bedrede Vejret sig og hvem der havde opsat Slaaningen noget, fik det indavlet i rigtig god Stand. Overalt var der meget til Fyld, saa Udbyttet vil kunne anslaaes til ca. 4 à 6 Læs pr. Td. Land.

Enghøet hvor Slætten gennemgaaende falder noget senere, særlig hvor der kun slaas en Gang, blev langt overvejende godt bjærget, og gav ca. 4 à 5 Læs pr. Td. Land.

Høstarbejdet blev overalt paabegyndt og afsluttet under enestaaende gunstige Vejrforhold, og Sæden fyldte stærkt paa Markerne; men særlig Vintersæden folder næsten overalt for lidt, idet det varme Vejr indtraf for sent for en god Kornudvikling. Foldene kunne omtrent ansættes saaledes:

Hvede	fra 12 til 18	Fold 15 i Gjennemsnit
Rug	- 12 - 16	do. 14 —
Byg 2rd.	- 14 - 18	do. 16 —
Byg 6rd.	- - 14	do. 14 —
Havre	- 18 - 22	do. 20 —
Blandkorn	- 18 - 24	do. 21 —

Ærter og Bønner dyrkes saa godt som ikke her paa Egnen.

Rodfrugterne, hvoraf dog kun væsentligt Sukkerroen dyrkes her paa Egnen, lede fra Forsommeren af for megen Kulde uden Sol og for megen Fugtighed, hvorpaa det senere indtraadte varmere og bedre Vejr ikke kunde bøde, saa de ville komme til at give et tarveligt Udbytte kvantitativt set, hvorimod Kvaliteten er ret tilfredsstillende; Udbyttet kan vist kun sættes til imellem 250 à 270 Ctr. pr. Td. Ld.

Runkelroerne ere ogsaa meget tarvelige.

Arbejdskraften har overalt været rigelig. Brugen af Slaa- og Høstmaskiner tager stærkt til, endog paa Smaagaarde, saa der derved kan spares paa Arbejdskraft.

Fra det nord-østlige Fyen. Høavlen har i Almindelighed her paa Egnen været over Middelhøst, det meste Hø blev bjærget i god Tilstand. Høudbyttet kan ansættes til 4 à 5000 Pd. pr. Td. Land. Høsten af Enghø spiller kun en ringe Rolle paa denne Egn. Udbyttet har været som en Middelhøst.

Høsten faldt sent i Aar, den begyndte for Rugens Vedkommende i Dagene 12. til 15. August, Hveden kom, da man havde faaet Rugen i Hus, den 23. August.

Vaarsæden fulgte saa efter. — Vejret var ualmindeligt godt. Høsten i Aar paa denne Egn blev kun afbrudt i 5 Dage fra Høstens Begyndelse til Høstens Ende, her faldt i den Periode 40 mm. Regn fordelt paa 10 Gange.

Hveden var i Aar den vanskeligste Sædart at faa høstet, da det var sjældent at se et staaende Stykke Hvede paa denne Egn, saa man anvendte ikke Slaa- og Høstmaskiner. Man

maatte give 11 à 12 Kroner pr. Td. Land Hvede for at faa den høstet. — Rug, Byg og Havre var at høste som i almindelige Aar. Høsten har gennemgaaende fyldt godt i Aar, man vil gennemgaaende kunne regne 5 à 6 Læs Rug, 6 à 7 Læs Hvede, 4 Læs Byg, 4 à 5 Læs Havre og Blandsæd, 6 à 8 Læs Ærter (gode Læs). Kvaliteten af Rug, Byg og Havre er god, man kan regne for Byg en Kvalitetsvægt 114 à 115. Hvedens Kvalitet er mindre god, der er mange smaa Kjærner som Følge af Leiesæden og den paa Grund af den kolde Sommer slet udviklede Kjærne. Hveden vil her paa Egnen give fra 12 til 15 Fold mod 16 til 20 andre Aar. Rugen 10 à 12 Fold. Byg vistnok 12 à 14 Fold. Havre 16 à 20 Fold. Alt er bjærget fuldstændigt tørt og godt.

Rodfrugterne har haft meget at kjæmpe med fra det tidlige Foraar. Paa Grund af den vaade Mai fik de Fleste først saaet Roer sidst i Mai, ja endog indtil 10. Juni; de havde vanskeligt ved at komme op og komme i Groning paa Grund af Kulden, men have gennemgaaende været velpassede her paa Egnen.

Udbyttet vil blive 200 à 225 Tønder pr. Td. Land.

Flere Steder have Kløvermarkerne lidt en Del, og paa en stor Gaard forsvandt Kløverplanterne saa at sige fuldstændigt i Løbet af Sommeren, skjøndt de stode ualmindeligt frodige i Efteraaret 1897 og overvintrede godt. Oldenborrelarver har man ikke mærket meget til. Agerkaal og andet Ukrudt har floreret stærkt i Aar.

Vintersæden er saaet meget sent i Aar og Vintersædsmarkerne se ualmindelig lidt lovende ud for Tiden. Vintersæden er saaet fra den 24. September til 8. Oktober.

Priserne paa Smør og Ost have i Sommer været elendige, derimod har der været god Efterspørgsel efter Udsættene og Fedekreaturer, Udsætterkøer fra 6 til 12 Aar betaales med 18 à 12 Øre. Kvier paa ca. 700 Pd. uden Kalv med 20 Øre pr. Pd. og der bydes indtil 25 Øre pr. Pd., naar de ero fede.

Der er blandt de mindre Jordbrugere i denne Sommer

kommet en Del Høstmaskiner i Gang og disse ere Skyld i, at Arbejdskraften har været nogenlunde tilstrækkelig.

Fra Egnen Ringe-Faaborg. De danske Øers frugtbare Klima har fuldtud staaet sin Prøve i den nu forløbne Del af indeværende Aar, trods de noget mørke Udsigter som de to første Sommermaaneder bragte. Efter en mild og forholdsviis vædefattig Vinter, fik vi ligeledes koldt og fugtigt Vejr i Foraaret og Maanederne Juni og Juli. Vaarsæd og Roer bleve derfor sildigt saaede. Runkelroerne ofte først omkring Midten af Mai. Hertil kom, for Roernes Vedkommende, at Fugtigheden og den lave Temperatur i høj Grad begünstigede Ukrudtets Væxt paa Roernes Bekostning. Paa fast Jord og ved rettidig Udynding og Hakning, gik det dog ganske godt; men paa høj Jord, navnlig moseagtig Jord, vilde Ukrudtet ikke visne, men vedblev at gro, hvorfor Rensningen blev meget besværlig.

Saa vel for Roerne som for Sæden var det kolde Vejr ogsaa uheldigt derved, at de første ikke vilde voxe af Mangel paa Varme, medens Sæden vel trivedes godt i Begyndelsen indtil Skridningen; men saa var Temperaturen heller ikke tilstrækkelig høj for denne Afgrøde til en normal Udvikling af Kjærnen. Udsigterne for Avlen af Roer og Sæd vare derfor ved Juli Maanedes Udgang alt andet end lyse. Rugen var ved at modne; men Vejret var ustadigt og koldt, Axene vare daarligt fyldte og Kjærnen var lille. Al den øvrige Sæd var grøn og Kjærneens Udvikling tegnede til at blive slet medens Roerne stode i Stampe. — Vi kunde derfor nærmest vente en lille Roearv, og en stor Kornarv i Fyld, men et lille Udbytte med daarlig Kjærne, hvortil endnu kom Sandsynligheden af en meget sildig og vanskelig Høst, hvilket nu, med den større Roearv, er langt værre for Landmanden end tidligere.

Saa forandrede imidlertid Vejret Karakter. Vi fik Varme og mere tørt Vejr. Roerne toge til i Væxt og Vægt, Rugen kom fortræffeligt ind i Midten af August og de øvrige Sædarter modnede saaledes, at Høsten kunde begynde med fuld

Kraft omkring den 20. August og i Regelen var endt omkring Midten af September i et glimrende Høstvejr.

De forskjellige Afgrøders Mængde og Beskaffenhed kan

omtrent betegnes saaledes:

Agerhø: Mængde	mg.	Beskaffenhed	mg.
Enghø do.	mg.	do.	mg.
Græsning do.	ug.	do.	ug.

Rug: Fyld	mg.	Kjærnsens Bsk.	mg.	Kjærnsens Mngd.	tg.
Hvede do.	mg.	do.	mg.	do.	g.
Byg do.	mg.	do.	formt. g.	do.	formt. g.
					maaske mg.
Havre do.	mg.	do.	mg.	do.	mg.

Kartofler: Bsk. g. Mængde g? nogen Sygdom. Magnum bonum har holdt sig bedst.

Runkelroer: Mængde mg.; men Avlens Størrelse er temmelig forskjellig, maaske foranlediget ved Saatid, Pasning og Antal af Stokløbere, hvoraf der er mange i Aar.

Turnips: heraf dyrkes mange; men Avlen er oftest mg.

Sukkerroer: Mængde tg.

Hvad Produktpriserne angaar kan bemærkes, at der i Aar ikke er den samme Chance for opnaalig Fordel ved at købe Melassefoder og Mais og sælge Havre som der var i Fjor, da Avancen herved var meget betydelig. Mælkeproduktionen er snart bleven en meget daarlig Forretning, baade paa Grund af den høje Pris, som maa betales for Pasning og Melkning m. m. og paa Grund af de lave Smørpriser.

Fra Samsø. Høhøsten har været en af de lyse Sider ved Sommeren 1898, den gav en stor Afgrøde og blev godt

bjergtet, hvor den da ikke blev begyndt alt for tidlig. Derimod har det været tarveligt med Eftergræsningen, Juli var for kold og Aug. og Septbr. for tørre, saa trods det gode Efteraarsvejr har Mælkeudbyttet været for lille.

Kornhøsten fyldte godt og blev mærkværdig godt bjærgtet trods den sene Aarstid. Rugen giver ikke meget, der er mange Spring i Axet og mange smaa Kjærner, dog har Bretagnerug her givet 2766 Pd. pr. Td. Ld. paa let Jord, ved Siden af en Skov fuld af Vildt. Hvede efter Helbrak giver meget ordentlig, godt 4000 Pd. pr. Td. Ld., hvorimod den efter benyttet Brak ikke kan naa 3000 Pd., med en betydelig mindre Kvalitetsvægt. Bygget saa godt ud saalænge det stod paa Marken, og der er Halm nok, men Kjærnen vil ikke naa et Middelaar, hverken i Kvantitet eller Kvalitet. Havre og Blandsæd giver gode vægtige Afgrøder.

Med Runkelroerne er det daarligt, Forsommeren var for vaad og kold og August for tør. Paa høje stive Jorder give de kun godt 200 Tdr. pr. Td. Ld., selv med en udmærket tæt Plantebestand, derimod give de en Del mere paa lettere og lavere Jorder. Turnips og tildels Gulerødder giver gode Afgrøder.

Fra Bornholm. Udbyttet af Agerhø har været særdeles godt, der var rigelig Fyld, det blev høstet under ret gunstige Forhold, hvor man da ikke holdt sig til den gammel-dags Methode, først at sætte det i Stakke, naar det er helt tørt, thi derved blev endel udvadsket, men det er nu de færreste Steder der høstes paa den Maade. Kornhøsten foregik iaar 2 à 3 Uger sildigere end sædvanlig, dog var man begunstiget af særlig stadigt og tørt Vejr. Rugen fyldte stærkt men giver faa Fold, de øvrige Kornarter gav ikke mere end Middel i Fyld men folder over Forventning godt. — Vi har her i Modsætning til andre Steder havt en tør Sommer og stadig manglet Regn, derfor har Rodfrugterne havt ugunstige Forhold, først hæmmedes de af Kulde og siden af Tørke, som havde end mere Indflydelse, fordi Jorden fra Vinteren var tung og død, saa den ikke kunde skøernes tilstrækkelig til at holde

paa Fugtigheden; dertil har her fuldstændig manglet Arbejdere til at passe Roerne i rette Tid, dette saameget mere som Roerne udvikledes saa sildig, at Lugearbejdet faldt samtidig med Høhøsten, det har derfor været rent undtagelsesvis iaar at see en velholdt Roemark, saa Rodfrugter ville give langt under Middelhøst, kun Kartofflerne staa overalt godt og give rigeligt Udbytte fri for Sygdom, især paa lettere Jorder.

Den rette Tid for Vintersædens Lægning faldt sammen med Høsten, dertil benyttedes almindelig Tiden strax efter at Vintersæden var høstet medens man ventede paa at Foraarsæden skulde modnes; da det derefter blev en tør Tid, kom den daarligt op, men de fleste Kjærner bevarede dog Spireevnen og kom op senere da der faldt Regn; trods det gode Efteraarsvejr er den ikke voxet meget, selv meget tidlig saaat Vintersæd behøver gunstigt Vejr for at kunne dække Jorden inden Vinteren.

Kreatureernes Sommernæring var rigelig indtil Høhøsten, siden den Tid har der ligefrem været Græsmangel mange Steder, endogsaa da der først i August faldt endel Regn var Planterne saa svage, at der vedvarende var knapt med Græs; Mælkeudbyttet har derfor ikke været stort.

Arbejdskraften i Sommertiden var meget knap, havde man ikke havt Slaamaskiner vilde det været umulig at faa den usædvanlige store Høhøst besørget i rette Tid, men selv paa smaa Gaarde er det almindelig at have en Slaamaskine som lejes ud til Naboer, saa det var den mindste Part af Agerhø, som blev slaaet med Le. — I Kornhøsten var derimod Arbejdskraften temmelig normal, takket være de meget forbedrede Høstmaskiner, som bøder meget paa den knappe Arbejdskraft.

Fra Egnen Hadsund-Aalborg. Høsten begyndte sent, og Rugen led meget af Stormen i Juni og Juli Maaneder — blev forslidt og meget Korn blæste af i grøn Tilstand — Til Rugen var det næsten overalt umuligt at bruge Meiemaskiner — men imidlertid anvendtes med Held Slaamaskiner og man bandt da op efter dem som efter Haandmeining. —

Vaarkornet var jo sent paa Færde — saa der var lidt Slip mellem Rug og Byg. Der var derfor god Tid at behandle Brakken — og paa de større Gaarde damptærskedes en Del Rug. —

Vaarhøsten var iaar let — udmærket Vejr hele Tiden og Kornet stod op, saa Maskiner anvendtes overalt. Der er snart ikke en Gaardmand uden at han har sin egen Meiemaskine. — Der var meget at kjøre hjem. Der er stort Fyld og overalt seer man mange Stakke. —

Rodfrugterne ere som alt Andet seent ved det — og hvad Runkelroerne angaar, ere disse vist overalt smaa og mange Stokløbere — Turnips jævn gode — men Kartoflerne give overalt et meget lille Udbytte; — der er faa Knolde — men de enkelte Knolde ere jevnt store og ikke syge — Magnum bonum giver især et usselt Udbytte.

Der har været rigelig Græs og Meieriudbyttet har derfor været godt — fra alle Meierier hører man, at der har været megen Mælk — i vort Meieri har været leveret den meste Mælk endnu i de sidst forløbne ni Aar. —

Der har egentlig ikke været Mangel paa Arbejdskraft, og Daglønnen har været som i de senere Aar — fra 1,00—1,50 pr. Dag + Kosten. —

Frugtavlen er aldeles mislykket — saavel Bær som al anden Frugt. —

Bierne have givet meget lidt Honning — vist begrundet i megen Blæst. —

Æggeproduktionen derimod maa vist siges, at have været rigelig — men saavidt jeg skjønner, var der meget lidet Held baade for Smaafolk og i større Hønsogaarde med Udklækningen af Kyllinger. —

Efteraarsgræsningen var meget rigelig og Vejret straalende, tørt og ret mildt, indtil Søndag d. 16. Oktbr. pludselig mødte med Storm og Kulde tæt ved Frysepunktet — d. 17 om Morgenen var Jorden helt frossen og d. 18—19 gav fuldstændig orkanagtig Storm, saa man pludselig uden Varsel var nødsaget til at tage Alt paa Stald.

Der har været gode Priser paa Heste, Plage, og særlig gode Føl vare stærkt efterspurgte. —

Kornpriserne ere ikke høje, men dog ganske antagelige mod tidligere Aar. —

Fra Eggen omkring Hjørring. En lang Tid af Sommeren saa det ud til mere eller mindre Misvæxt. Sent blev største Parten af Vaarsæden saaet, Kulde, Blæst og voldsomme Regnskyl afløste hinanden til Juli Maanedes Udgang, men i Midten af August indtraadte varmt, stille og fugtigt Vejr med Dug den meste Formiddag, og med kun korte Afbrydelser har dette Vejr holdt sig indtil nu.

Den voldsomme og idelige Regn foraarsagede megen Lejesæd, saa Høstarbejdet har været besværligt, langvarigt og kostbart, men den varme Eftersommer har til Gjengjæld højnet Foldudbyttet og Kvaliteten betydeligt.

Hvede har givet over	Mh. i Kvt.	Mh. i Kvalitet.
Rug —	Mh. i Kvt.	Under Mh. Klt.
2r. Byg —	Mh. i Kvt.	Mh. i Klt.
6r. Byg —	over Mh. i Kvt.	Mh. i Klt.
Blandsæd —	over Mh. i Kvt.	Over Mh. i Klt.
Havre —	over Mh. i Kvt.	Over Mh. i Klt.

Dog er en Del Havre, Blandsæd og tildels Lejesæd af 6r. Byg høstet umodent.

Sæden laa ofte saa stærkt og i saa forskellige Retninger, at Mejemaskinen ikke kunde anvendes. Paa enkelte saadanne Steder er med Held anvendt Slaamaskine med et simpelt og billigt Apparat — jeg tror 75 Kr. for det Hele — der har gjort meget god Nytte og har kunnet meje Hvede, der laa fuldstændig klappet ned.

Rodfrugterne led af alle Afgrøder mest af Kulden, Blæsten og Regnen, daarlig kom de op, gjorde ingen Fremgang før i den varme Tid i Aug., senere ere de voxede endog me-

get stærk, men ved Optagning vil Hullerne fra Spiringen nok vise sig igjen og Roden er som Regel for lille.

Kartofler	giver under Mh. i Kvt.	Mh. i Kvalitet.
Turnips	— under Mh. i Kvt.	Mh. i Klt.
Kaalrabi	— Mh. i Kvt.	Mh. i Klt.
Gulerødder	— Mh. i Kvt.	Mh. i Klt.

Af Plantesygdomme har Brand i Vaarsæden og særlig i Havren, den graa og brogede Havre været mere udbredt end almindelig. Paa enkelte Mosestrækninger klages ogsaa over Rust paa Havren. Her paa Gaarden har i flere Aar vist sig Kaalbrok paa Turnips, men ej i ualmindelig Grad i Aar.

Insektangreb har jeg ikke hørt om.

Af Ukrudt var det særlig Tidsel og Følfod samt Spergel, der havde gunstige Betingelser i den kolde, vaade Forsommer, og have været generende.

Brakbehandlingen har været let, men Agerkaal og andet Frøudkrudt har ej spiret livligt i den kolde Forsommer.

Vintersædens Lægning er i Aar foregaaet meget uregelmæssig. Da den rette Tid til Saaning — fra 6. til 20. Sept. — var inde, havde vi den travleste Høsttid og det bedste Høstvejr. Forholdet var derfor oftest, at enten var man vidt fremme med Høsten, men havde ikke saaet en Kjerne, eller man havde saaet helt eller halvt, men var saa tilbage med Høsten.

Kreatureernes Sommerernæring har som Regel været rigelig — fra d. 15. Juli til d. 15. Aug. dog kun nogenlunde, men Kreaturerne have ofte lidt af det kolde, blæsende og vaade Vejr. Mælkeudbyttet har derfor kun været ret godt.

Arbejdskraften har været omtrent som de senere Aar, dog gaar det Arbejde, der i Gjennemsnit præsteres af en Mand, stadig tilbage baade i Kvt. og Klt., medens Betalingen stadig stiger.

Produktpriserne have i Gjennemsnit været lave, og fremfor noget andet, virker de usikre Afsætningsforhold for fedt

Kvæg og Kjød stærkt i en saa opdrættende Egn som Vendsyssel.

Fra det nordlige Vendsyssel. Imod Forventning, eftersom Sommeren var saa kold, ondog med enkelte Nætters Frost og skjønt det truede med, at den sildig saae Sæd, især Havren, ikke blev moden, og vi belavede os paa som 1851 ikke at faa indhøstet før Vinteren kom — fik man det bedste Høstvejr, man kunde ønske sig, Sommervarme, stærkt Solskin og lette, tørrende Vinde — først sidst i September kom der ved Solopgang en stærk Taage, der generede Høstarbejdet, som derfor først kunde begynde opad Dagen. Sæden blev nu godt moden og alt kom godt i Hus og Resultatet blev det bedste Høstudbytte Egnen har haft i mange Aar. Rugen som er Egnens Vintersæd, giver desværre et daarligt Resultat, hvad Kjerneudbyttet angaar, idet den under Blomstringen led af Nattefrost og vedvarende stormende Veir. Ved Tærskningen viser den kun at give 4 Skp. i en Trave Rug, medens man under normale Forhold kan opnaa 12 Skp. pr. Trave.

Boghvedeavl og Lupinerne, der var aldeles mislykkede, aale ikke vaade, kolde Sommere.

Fra Egnen ved Ringkjøbing Fjord. Udbyttet af Agerhø har været ualmindelig godt, baade med Hensyn til Kvantitet og Kvalitet.

Enghøet gav ogsaa et stort Udbytte, kun de lavere Enge i Skjernaadal blev mer eller mindre ødelagte ved Oversvømmelse forinden Græsset var slaaet.

Høstarbejdet var besværligt, Sæden, særlig Havre og Byg, gik i Leie, saa Høstmaskinerne ikke kunde benyttes, men da Veiret blev saa heldigt, blev dog alt godt indbjerget.

Udbyttet har for alle Kornsorter været meget godt, naar undtages Boghveden, hvilken Kornsort dog dyrkes meget lidt.

Rugen fyldte godt, men giver ikke mange Fold, da den har lidt for meget ved de mange Stormdage, vi havde i Juni og Juli.

Byggen var meget godt groet og godt kjærnesat, men laa vel meget.

Havren var usædvanlig stærkt groet, men blev sildig moden, var godt kjærnesat og vil sikkert folde stærkt, men vil vist være mindre vægtig af Kjærne.

Rodfrugterne ville neppe give en Middelhøst.

Kartoflerne ere smaa, sene at optage og fylder for lidt.

Turnips giver langt under Middelhøst, Kaalrabi og Gulerødder synes derimod at naa op mod en Middelhøst.

Vintersæden er, hvor der er saaet, kommen i Jorden under heldige Forhold.

Da Rug kun saas i Stubjord, eller hvor der har været Turnips eller Kartoffler og der til en Del skal kjøres Gjødning, bliver Saatiden noget sildig, hvilket dog ikke synes at forringe Avlen. Kreaturerens Sommernæring har været rigelig og Mælkeudbyttet som Følge deraf tilfredsstillende.

Arbejdskraften her er som man har sørget for den, Daglejere ere ikke til at faa, man er nødt til at leje faste Folk i saadant Antal, at man dermed kan hjælpe sig baade i Højbjergning og Høst, hvorfor Indbjergningen af Kornet tog lang Tid, da der maatte høstes mere med Leen end paaregnet, dertil kom, at det var Lejesæd og endelig er det en Kjendsgjærning, at hvor der i flere Aar har været anvendt Høstmaskiner, kan man ikke faa høstet stort mere end det Halve med Leen, end før Maskinerne kom tilstede.

Produktpriserne ere upaaklagelige undtagen for Kjød, men saa maa man jo producere mindre af den Artikel. Saalænge Smør, Svin og Heste holder de nuværende Priser er der ingen Grund til Klage. Med dette Aars Avl kan man paaregne at ernære Besætningerne med sin egen Avl og ikke, som sidste Aar, med hvad der skulde kjøbes, saa jeg har iaar ikke hørt nogen, der klager, hvilket er mærkeligt.

Fra Egnen ved Kolindsund. Høstudbyttet har paa Ageren været saa stort, som ikke i mange Aar, jeg tror uden Overdrivelse over dobbelt saa stort som normalt, enkeltvis endog

mere end tredobbelt. Udbyttet af Engene kan næppe siges at have været over det Normale, for Efterslettens Vedkommende endog endel under, formentlig paa Grund af den periodisk meget vaade og kolde Sommer. Bjergningen er i Regelen foregaaet under særdeles gode Forhold, hvor Høsletten ikke begyndte før lige i Slutningen af Juni; tidligere afhugget Agerhø blev temmelig meget udvadsket, og har altsaa lidt meget. — Høsten kom silde, men var i høj Grad begunstiget af Vejret; medens selve Meiningen var besværlig, hvor der var Lejesød, gik Hjemkjørslen uforstyrret, og forholdsvis hurtigt for sig. Vintersæden giver meget Straa men forholdsvis lidt Kjerne, og Kvaliteten af denne er ei heller god. — Vaarsæden synes at give godt, særlig Havre og Blandsød, ligesom ogsaa Bælplanter synes at ville give et godt Udbytte. — Rodfrugterne give kun et jævnt godt Udbytte, idet de voxede for langsomt i den regnfulde Tid. Eftersommeren har dog været ret gunstig for Tilvæksten. Kartoflerne give et tarveligt Udbytte og ere ofte skurvede. Plantesygdomme have kun vist sig i særlig Grad som Rust paa Hveden i Kolindsund (Bladrust). Derimod have Smelderlarven og en stor muldgraa Orm gjort megen Skade, og i Kolindsund fuldstændig afgravidet hele Arealer. De vaade Perioder have selvfølgelig begunstiget Ukrudtets Opvæksten. — Skjønt en fugtig Sommer er heldigere for Brakbehandling end en tør, har den forløbne dog vistnok været fugtigere end heldigt i saa Henseende. — Vintersæden er bleven lagt sildig, men i særdeles bekvem Jord. — Græsningen har været usædvanlig rigelig, og Mælkeudbyttet godt, om end Kulden stundom har gjort Skade. — Arbejdsforholdene have været normale. — Priserne paa Korn ere fortiden nærmest flove, og paa Foderstoffer høje, saa at der for Øjeblikket ikke er særlig Grund til at foretage Ombytning.

Fra Hammerum Herred. Højbjergningen foregik under ret gunstige Væjrforhold; vel blev i Begyndelsen noget Kløverhø udvadsket af Regnen, men det synes ikke at have tabt saa meget ved at ligge paa Skaar, som man først antog.

Kvaliteten er gennemgaaende meget god og Kvantiteten er langt over en Middelhøst.

Græsvæksten paa Engene var i Forsommeren meget trykket af Kulden, men den rigelige Væde i Forbindelse med nogle meget varme Dage fremkaldte hurtigt en frodig Græsvækst, som for det meste blev indberget i god Tilstand. Den stærke Blæst i Midten af Juli Maaned var Noget til Hinder for Arbejdet, men til Gjengjæld kom den stærke Varme i Maanedens Slutning rigtig tilpas og blev udnyttet med fuld Kraft.

Udbyttet af Enghø er over en Middelhøst og Kvaliteten er meget god.

Rughøsten kom noget sent, men blev hurtigt fremmet, da enkelte lokale Byger ikke var til stor Hinder i det ellers gode Vejr. Rugen fylder ret godt, men den giver lidt i Skjæppen og der er meget Smaakorn, saa Kjerneudbyttet nærmest er under en Middelhøst.

Bygget har givet et godt Udbytte baade af Straa og Kjerne og er kommen godt i Hus.

Havren har ligeledes givet et godt Udbytte, især hvor den var saaet tidlig. Paa lave og kolde Jorder med sildig Saaning var den noget tilbage i Væksten og blev ikke overalt fuldt moden.

Rodfrugterne ere i Reglen smaa og ville næppe naa en Middelhøst. Rensningen har ofte været mangelfuld og er som Regel afsluttet for tidligt, da Ukrudtet blev ved at skyde frem.

Plantesygdomme ere ikke optraadte i nogen væsentlig Grad i Aar. De stærke Rustangreb paa Havren, som vare saa ødelæggende ifjor, have ikke gjentaget sig i Aar. Af Ukrudt har Tidslen været slem i Havren, i enkelte Tilfælde er den Inget af med Tidseltang, inden Havren blev for stor.

I Brakmarken har det været let at faa Ukrudtsfrøet til at spire, men Rodukrudt har været vanskelig at ødelægge. Hvor der anvendes Halvbrak var Jorden ofte ikke saa findelt som ønskeligt.

Vintersæden kom temmelig sent i Jorden paa Grund af den sene Høst, og Spiringen foregik langsomt. Sæden er derfor langt tilbage i Væksten og er temmelig svag, hvis vi faar tidlig Vinter.

Kreaturene kom tidligt paa Græs i Foraaret paa Grund af de knappe Foderbeholdninger. Græsset kom langsomt igjen efter Aftøjringen, indtil der i Slutningen af Maj Maaned kom mildere Vejr med rigelig Nedbør. Græsningen var derefter rigelig hele Sommeren og navnlig har Eftergræsningen paa Kløvermarken været særdeles god. Mælkeudbyttet har været me-

get godt og Kreaturerne ere komne paa Stald i god Foderstand.

Arbejdskraften har været nogenlunde tilstrækkelig, hvilket navnlig skyldes en større Anvendelse af Maskiner. Paa mindre Bøndergaarde er det ikke sjelden at 2 eller flere slaar sig sammen om at anskaffe Slaa- og Mejemaskiner i Fællesskab.

Der er nogen Mangel paa Tjenestepiger til November Flyttedag, tildels begrundet paa, at den i Egnen saa meget udbredte Trikotagevirksomhed, der drives dels som Husfid oð dels som Industri, trækker dem bort fra Landbruget.

Fra Egnen ved Fredericia. Høstarbejdet gik iaar særdeles rask fra Haanden takket være det gode Veir og Høstmaskinerne; til at begynde med tegnede Veiret ikke godt; der var enkelte, der høstede Rug de første Dage i Aug. D. 7. S. 9. kom der megen Regn, som skadede den Rug, der stod i Hob; derefter blev dog Veiret straalende, hvad der var særdeles heldigt, da Vaarsæden var noget tilbage, saa der kom først egentlig Fart i Høstarbejdet i Slutningen af Aug.; takket være det gode Vejr blev fleste færdige midt i Sept. Paa de større Gaarde og hos enkelte Efternølere var der ganske vist endnu noget tilbage, men alt kom godt med. Alle Sædarter fyldte godt og derom vidner ogsaa de talrige Stakke, der sees rundt omkring, men efter de Erfaringer, der alt haves, vil Foldudbyttet næppe blive saa stort over et godt Middelaar, ialtfald klages der over Rugen, at den giver for lidt, ligesom ogsaa Hveden giver mindre end ventet.

Rodfrugterne ser endda nogenlunde ud, Udbyttet bliver dog neppe særlig stort; de have manglet Varme.

Jordlopperne har der været megen Klage over og mange Stykker Rodfrugter maatte ompløjes. Ukrudtet var ikke vanskeligt at faa Bugt med, hvor det blev passet itide.

Fra Thy. Høbjergningen fra Ager og Eng skete under de bedste Vejrforhold, saa Kvaliteten er meget god. Udbyttet af Agerhø var ualmindelig stort, Engene gav gennemgaaende en Middelhøst.

Høstarbejdet gik ligeledes godt fra Haanden i stadigt og godt Vejr, men Udbyttet af de forskellige Kornarter afvege meget, idet Rug gaar langt under en Middelhøst. Byg og Havre fylder stærkt og om det end ikke giver mange Tdr. i Læsset antages det dog, at Foraarskornet vil give tilfredsstillende mange Fold, da der er mange Læs. Stormen d. 31. Aug. gjorde endel Skade paa den da uhøstede Byg ligesom

Havren, der dengang var halvmoden, tog mere eller mindre Skade paa udsatte Steder, antagelig indtil 2 à 3 Fold.

Rodfrugtarealerne ere meget forskellige, Gulerødderne — hvoraf endel dyrkes her — ere jevn gode, ligesom Kaalrabi og den tidligsaade Turnips. Den midt i Juni, og senere saade Turnips er alt for lille, da Slutningen af denne Maaned var tør og kold ligesom det meste af Juli og de ere da aldrig rigtig komne i Væxt. Kartofflerne ere saa stærkt beskadigede af Storm og Kulde i Juli Maaned, at de neppe giver halv Afgrøde.

Det synes som Smørpriserne bliver lavere det ene Aar efter det andet. Slagterisvinene har i Sommertiden kostet mellem 25 og 28 Øre. Efteraarsbærende Køer ere dyre, de have kostet op til 200 Kr. enkelte derover, ligesom Ungkvæg og tomme Køer til Fedning koster 100 à 150 Kr., hvad der i Forhold til, hvad Dyr har kostet de foregaaende Aar, maa anses for gode Priser. Faar og gode Lam koster 18 à 20 Øre pr. Pd. Hestehandelen har været livlig Sommeren igjennem til de sædvanlige Priser og Plagehandelen i Efteraaret i Forhold dertil.

Fra Egnen Nord for Aalborg. Alle langstraaede Sædarter have givet meget store Afgrøder, betydeligt over Middelhøst, og gjælder dette fornemmelig alle saadanne Jorder, som ikke ved Saatiden vare side, tunge og kolde af den megen Foraarsregn. — Foldudbyttet vil dog maaske neppe komme til at staa i Forhold til Massen, da en stor Del af Sommeren var megen solfattig. —

Den store Afgrøde gav overordentligt meget Arbejde, men da Vejret gennemgaaende var godt, gik alt godt fra Haanden. Alt modnedes imidlertid sent, særligt paa disse Egnes lavtliggende Kjær- og Mosejorder, og paa mange af de større Gaarde fik man først indhøstet midt i October. —

Kaalrabi og Turnips maa vist betegnes som meget tilfredsstillende, hvorimod Kartofflerne overalt ere meget tarvelige saavel i kvantitativ som i kvalitativ Henseende, og ville absolut blive Aarets daarligste Afgrøde. —

Den sene Høst, som ikke blev afbrudt af nogen Regnperiode i den sædvanlige Rugsædstid, foranledigede, at Rugen her i Egnen er saet usædvanlig sent i Aar; endnu midt i October saade man mange Steder Rug endnu. —

Hestene ere meget dyre i al Hjemmeomsætning, og hævde deres Plads som det mest stabile; Malkekøer med Kalv ere ogsaa dyrere end de have været i flere Aar.

Fra Egnen ved Jyderup. Hvor man ellers begyndte for tidlig, bjergedes Høet udmærket og det var meget rigeligt, men paa lavere Enge var det ofte vanskeligt paa Grund af Vand at faa det bjerget rettitigt; hos os slog vi det og fodrede det grønt paa Stald til Kvæget.

I Høsten har vi jo gjennemgaaende haft godt Vejr, naar jeg undtager den 23. Aug., da vi om Natten fik 25 m. m. Regn, samt i Ugen fra den 26. Aug. til 1. Sept., hvor der kom en forfærdelig Storm med Byger, som i 4 Dage dog kun gav ialt 20 m. m., og som blæste af lige saa hurtig som det kom, havde vi godt Vejr hele Høsten, som derfor gik meget godt, men det kneb med Folk og Daglejen maatte sættes i Vejret. Heldigvis kunde vi bruge Meje- og Slaamaskine, den sidste til liggende Rug og Hvede, og det hjalp, thi Høsten var jo meget stor og god. I det Hele tror jeg, det vil folde godt, dog vil den Byg, som pidskedes af Stormen d. 31. Aug., rimeligvis have tabt nogle Fold paa Marken.

Havren er udmærket og folder vist særdeles godt.

Ved det milde Vejr rettede Roerne sig en Del, men de ere i sig selv smaa og ville kun fylde lidt.

Tidslen synes at tage til og er meget vanskelig at standse.

Brakbehandlingen har været meget vanskelig; hvor der var Qvikgræs, har det næsten ikke været muligt at faa Bugt med det.

Høsten trak saa langt ud, at Vintersæden mange Steder lagdes meget sent, og da den saaedes, var Jorden mange Steder tør som Aske, saa at den var meget sen med at komme op.; i det Hele staar den ikke stærkt iaar og trænger til Nedbør for at blive god til næste Aar.


Fra Vestlolland. Sommeren 1898 har bragt de lollandske Landbrug en Mængde Skuffelser. Hveden gav saaledes kun fra 10 til 15 Fold imod som Regel 15 til 20 Fold. Sukkerroerne vil give fra 150 til 280 Ctr. pr. Td. Ld. mod 300 til 400 Ctr. og derover pr. Td. Ld., som de i Almindelighed giver, saa det vist bliver det daarligste Sukkerroear siden Sukkerfabrikken blev bygget. Havernes Frugttræer ere mod Sædvane næsten aldeles tomme. Køerne have lidt meget ved den regnfulde og kolde Forsommers Vejrlig. Høbjergningen blev besværliggjort og uhyre meget Hø halvt eller helt ødelagt af Regn, og da der var rigeligt af det, blev det et sent og trivielt Arbejde. — Markarbejderne blev forsinkede og besværliggjorte af Regnen, og da Jorden, grundet

paa den milde Vinter uden Frost var klæget og beget og død, saa Redskaberne vanskeligt kunde bearbejde den, blev den endnu værre at have med at gjøre ved al den Mængde Regn, der faldt i April og Maj Maaned, — saa mange blev først færdige med at saa sidst i Maj Maaned, skjønt de pleje at være færdige sidst i April. Flere Stykker lavtliggende Jord maatte saaes om baade med Sukkerroer og Korn, da det førstsaaede var kvalt af stillestaaende Vand, eftersom Drænene mange Steder viste sig i Uorden. Høsten blev derfor begyndt 2 à 3 Uger senere end sædvanligt, derfor blev der kun et kort Efteraar, som tilmed blev saa tørt, at der efter Høstens Tilendbringelse og til Midten af Oktober næsten ikke kunde pløjes en ordenlig Plovfure, undtagen i Brakken. Pløjningen og det paa mange Gaarde store Roearbejde er derfor trængt sammeu til at udføres fra henved Midten af Oktober til Vinteren engang melder sig, maaske midt i November, saa det har været alt andet end lystige Førhold, Landmanden har arbejdet under i denne Sommer.


Af Lyspunkter er der kun faa. Først den rigelige Kløver- og Græsgrøde og de frodige og stærk foldende Havremarker, som hos de fleste lollandske Landbrugere ere indskrænkede til det mindst mulige, da Havren plejer at berede dem mange Skuffelser, ved i Reglen at give meget smaa Fold; — men ingen Regel uden Undtagelse, og dette viste sig iaar med Havren, eftersom man deraf har faaet et Par og tyve Fold, ja nogle have endog avlet et Par og tredive Fold. — Arbejdskraften er i Reglen ret rigelig, især hvor der er indført polske Piger til Roemarkerne.

Vintersæden blev saaet i temmelig tør Jord, men staaer dog nu efter det milde fugtige Vejr helt kraftigt og godt.


I. Fremmede Plove.




Nr. 22. Rod, Sack.




Nr. 18. Albion H^o.




Nr. 20. »Norwegian».



Nr. 19. »Eli».




Nr. 21. »Fragde» (hjemmelavet amerikansk Plov).




Nr. 6. F. A. østl. Jylland. (Hjemmelavet amerikansk Plov).


II. Danske Plove med lang Muldfjæl.




Nr. 5. S. S. Østl. Jylland.




Nr. 1. Z. Nordlige Jylland.




Nr. 2. Aalborg. Thy-Mors.




Nr. 3. W. F. Thy-Mors.




Nr. 7. B. E. Sydvestlige Jylland.



Nr. 10. F. Nordsjælland.




Nr. 11. Plov fra Kjøbenhavns Omegn.




Nr. 17. Plov fra Bornholm.


III. Danske Plove med kort stejl Muldfjæl.




Nr. 8. D. Vestsjælland.



Nr. 9. B. M. Sydjylland.




Nr. 12. Sk. Kjøbenhavns Omegn.



Nr. 16. B. N. Loll-Falster.



Nr. 15. P. K. Loll-Falster.





J. Wilson