

Agerdyrkningsberetning

(indtil Slutningen af Maj Maaned).

For Kornhøstens Vedkommende maa 1902 betegnes som et tilfredsstillende Aar, om man end, som altid, kunde ønske et eller andet anderledes i en eller anden Retning, og det er da særlig Kvaliteten, man paa Steder kunde have ønsket noget bedre; men den sene Høst og det vanskelige Høstvejr i Forbindelse med det forudgaaende kølige og fugtige Vejr satte en Hindring for hvad Mejning paa passende Modenhedsgrad og omhyggelig Indhøstning ellers kan udrette.

Rodfrugterne, med Undtagelse af Kartoffler, vare Aarets Smertensbarn, og Skuffelserne vare store, da Høsten af dem begyndtes, ligesom det mindre Udbytte beredte mange Vanskeligheder for Vinterfodringen og fordyrede den betydeligt.

Af omstaaende Tabel I ser man strax Aarets Overvægt over dets Forgjængere, idet Foldudbyttet er betydeligt højere for alle de langstraade Sædarters Vedkommende end Gjennemsnitsudbyttet af de foregaaende 13 Aar.

Ved at sammenligne Middeltallet af Foldudbyttet af Hovedsædarterne i omstaaende Tabel I, ser man endnu tydeligere forrige Aars Overvægt overfor dets Forgjængere med Hensyn til Høstudbyttet, idet

1889 gav	12.20	Fold	1896 gav	13.66	Fold
1890 —	13.46	—	1897 —	13.66	—
1891 —	13.48	—	1898 —	12.82	—
1892 —	15.07	—	1899 —	13.01	—
1893 —	11.96	—	1900 —	13.07	—
1894 —	12.80	—	1901 —	12.18	—
1895 —	13.42	—	1902 —	14.66	—

Dette var 1.53 Fold større end Gjennemsnittsudbyttet af de 13 foregaaende Aar. Kun Aaret 1892 har overgaaet 1902.

Tabel I.

Aaret	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Havre
1889.....	14.8	12.6	10.6	11.2	11.8
1890.....	13.9	11.2	13.1	13.1	16.0
1891.....	15.7	12.9	12.8	12.9	13.1
1892.....	17.5	13.4	14.1	14.5	16.6
1893.....	15.3	12.5	10.6	10.8	10.6
1894.....	14.6	10.4	12.0	11.8	15.0
1895.....	14.6	11.4	12.3	12.4	16.4
1896.....	16.8	12.6	12.1	11.9	14.2
1897.....	16.3	12.0	11.4	10.5	13.1
1898.....	14.2	10.1	11.9	11.9	16.0
1899.....	16.5	12.0	11.8	12.4	12.7
1900.....	16.1	12.1	12.9	13.1	14.5
1901.....	12.9	10.9	12.2	11.8	13.1
Gjennemsnit....	15.3	11.8	12.1	12.2	14.0
1902.....	17.8	12.7	13.3	13.5	16.0

For at bedømme Afgrødernes Værdi er der i Tabel II givet en Oversigt over Sædarternes Kvalitetsvægt i 1902, sammenlignet med Kvalitetsvægten i de 13 foregaaende Aar. Det vil af Tabellen fremgaa, at alle Sædarternes Kvalitetsvægt har været tilfredsstillende og for Vaarsædens Vedkommende endog betydelig højere end Gjennemsnittet af de foregaaende 13 Aar.

I Tabel III vil ses den sædvanlige Oversigt over Gjennemsnittsudbyttet af de forskellige Kornsorter og deres Kvalitetsvægt for Aaret 1902, sammenlignet med Gjennemsnittsud-

byttet og Kvalitetsvægten for Aarene 1889—1901, beregnet for de forskellige Landsdele.

Tabel II.

Aaret	Hvede	Rug	2-rd. Byg	6-rd. Byg	Havre
1889.....	130.4	123.8	113.4	106.6	79.8
1890.....	126.0	119.0	111.8	104.1	80.3
1891.....	124.6	115.9	109.6	104.5	79.1
1892.....	129.1	122.3	112.7	107.5	82.5
1893.....	130.4	124.9	113.4	107.0	80.7
1894.....	127.0	118.7	110.7	103.8	78.0
1895.....	127.9	119.1	110.2	103.2	81.9
1896.....	130.0	122.8	112.8	104.6	80.7
1897.....	127.4	120.3	107.7	107.7	76.0
1898.....	127.5	119.4	112.5	104.5	84.0
1899.....	132.3	123.5	114.7	108.5	83.4
1900.....	128.9	121.1	112.0	105.4	79.9
1901.....	129.3	121.5	110.8	106.9	79.3
Gjennemsnit	128.5	120.9	111.7	105.7	80.4
1902.....	128.6	120.0	112.9	108.8	82.8

I Tabel III faar man yderligere konstateret Aarets gode Høstudbytte. Paa Landets gode Hvedejorder paa de sydlige Øer er Hvedudbyttet 4.6 Fold større end i de foregaaende 13 Aar, og for hele Landets Vedkommende 3.3 Fold større; og om Merudbyttet af de andre Sædarter end ikke er fuldt saa stort, saa have de dog alle givet omkring et Par Fold over en Middelhøst.

Hvad Hveden angaar, saa havde det sin Vanskelighed paa Grund af den slette Hvedehøst i 1901 at faa tilstrækkelig god Saasæd. Herom skrives fra Slagelse—Korsør-Eggen, at

Tabel III.

Gjennemsnit af Foldene (Tdr. pr. Td. L. O.
sammenlign

	Hvede				Rug			
	1902		1889-1901		1902		1889-1901	
Sjælland ¹⁾	18.2	129.7	14.0	130.0	14.2	122.4	12.3	122.0
Lolland	19	128.7	13.4	130.7	14.5	121.2	11.7	122.0
Falster	19	130.5	14.3	129.3	12	122.0	14.0	121.0
Fyen	16.5	126.5	14.6	128.4	13.5	116.5	12.1	120.0
Langeland	17.0	127.5	»	»	14.5	123.0	11.0	»
Jylland:								
a) gode Jorder ²⁾	16.5	125.0	17.1	129.1	11.6	118.2	11.2	120.0
b) middelgode do. ³⁾	18	130	13.4	126.8	11.0	118.0	9.5	120.0
c) simple do. ⁴⁾	»	»	»	»	10	»	8.2	119.0
I Gjennemsnit	17.7	128.2	14.4	129.0	12.6	120.1	11.2	121.0

¹⁾ Med Samsø, Moen og Bornholm. ²⁾ Østkysten af Halvøen op til Randers samt Viborg, Struer og Herningegnen. ³⁾ Hammerum Herred og Vestkys-

hvor man saaede fjorgammel Hvede, havde man endnu større Udbytte; thi hvor man glædede sig over at have overvintret Saahvede, viste denne sig at være lille i Kjærnen, mindre givtig og ikke ægte Square head.

I forskellige Egne som paa Bornholm, i Ringe—Faaborg-Eggen og paa Falster har Hveden enkelte Steder endog givet 24 à 25 Fold.

Paa Hindsholm i Nord-Fyen groede Hveden stærkt til, men da Udsæden i mange Tilfælde stammede fra udartede Sorter, foldede den ofte for lidt.

Fra Langeland klages over Lejesæd, og fra Grenaa- og Hjørring-Eggen meddeles, at der kun dyrkes Hvede enkelte Steder.

Rugen har givet 1.4 Fold over Middelhøst, men Kvali-

g Kornets Vægt (holl.) for Aaret 1902,
med 1889—1901.

2-rd. Byg				6-rd. Byg				Havre			
1902		1889-1901		1902		1889-1901		1902		1889-1901	
13.7	114.5	13.0	111.9	14.6	109.8	12.6	107.8	17.5	84.9	14.4	83.0
15.5	112.7	12.0	113.1	14	110	12.7	109.0	18.5	85.0	14.2	80.7
15.0	112.0	14.1	110.8	»	»	»	»	19.0	87.0	16.9	81.2
16.0	110.7	13.9	110.7	15	»	11.7	107.1	17.6	83.7	12.8	78.0
16.0	112.5	11	110.5	15.5	»	11.0	109.5	19.0	»	21.5	77.5
12.7	111.7	12.4	111.7	16.0	104.0	16.0	108.7	15.9	81	13.7	76.7
11.2	111.2	10.2	112.6	10.6	106	10.5	104.5	14.2	79.7	11.2	78.4
»	»	9.1	111.1	10	»	8.5	100.8	12	»	7.8	80.0
14.3	112.1	11.9	111.5	13.6	102.4	11.8	106.7	16.7	83.5	14.0	79.4

mt Thy og Mors. ³⁾ Den lille jyske Halvø, Jyllands Østkyst nord for Ran-

teten var ikke saa god som ønskelig, hvilket dels ses af Kvalitetsvægten, som er 0.9 Pd. holl. under Middelhøst, og dels fremgaar af forskellige Meddelelser. Fra Nord-Fyen skrives saaledes, at Rugen som Regel var meget svær, og at den var gaaet i Leje før Blomstringen. I Thy led den under Blomstringen paa Grund af stærk Blæst, og i Hjørring-Egnen blev den høstet i mindre tør Tilstand.

Udbyttet af Byg var saavel for 2- som 6-radets Vedkommende et Par Fold over Middelhøst, derimod var det 6-rd. Bygs Kvalitetsvægt betydelig lavere end Gjennemsnitsvægten. Fra Slagelse—Korsør-Egnen klages der over, at Bygget ikke var nogen god Maltvare, og at det havde mere eller mindre »Vandlugt«. I Nord-Fyen var det vanskeligt at faa Bygget tilstrækkelig tørt, og meget deraf blev ladebrændt. Ogsaa fra

Nord-Jylland fremkommer der Udtalelser om, at det var vanskeligt at faa Bygget tørt.

I Thy blev det 6-rd. Byg for tidlig modent og indeholdt som Følge deraf megen Smaasæd.

Ligesom de andre Sædarter, saaledes gav Havren ogsaa et betydeligt større Udbytte end Gjennemsnittet af de foregaaende 13 Aar, og om den end omtales at være af meget forskjellig Kvalitet, var den dog usædvanlig vægtig.

Bælgæd er som sædvanlig kun dyrket i ringe Udstrækning og har dertil baade paa Falster og Fyen været stærkt angrebet af Bladlus, der paa Steder endog helt har ødelagt denne Afgrøde. Ærterne have dog i Gjennemsnit givet 10.1 Fold imod 9.6 Fold i 1901 og 9 Fold i 1900. Paa Grund af det regnfulde Vejr have de givet et stort Udbytte paa de lettere og magrere Jorder, saaledes i Askov-Eggen 11 $\frac{1}{2}$ Fold.

Hestebønner have kun været dyrket et Par Steder, hvor de have givet et Gjennemsnitsudbytte af 12.5 Fold. Om Boghvede er der ogsaa kun modtaget to Meddelelser. I Askov-Eggen har den givet 4 $\frac{1}{2}$ og i Vestjylland 6 Fold.

Enkelte Steder har der været saet Spærgel, som er afgræsset.

Kartoflerne have ikke alene givet et stort Udbytte, men ogsaa Kvaliteten har efter forskjellige Udtalelser været god. De have i Gjennemsnit givet 85.2 Tdr. pr. Td. Ld. imod 64.3 Tdr. i 1901 og 76 Tdr. i 1900. Gjennemsnitsudbyttet i de to foregaaende Aar, 1899 og 1898, var henholdsvis 67 og 58 Tdr. pr. Td. Ld. 1902 viser herefter en betydelig Overvægt.

Kun i een Korrespondance omtales Gulerødder at have givet 240 Fold.

For Runkelroernes Vedkommende har 1902 været et meget daarligt Aar. De kunde paa Grund af det kolige og fugtige Vejr ikke udvikle sig; de bleve smaa og mange Steder fulde af Rodtrevler, men til Gjengjæld faste. Gjennemsnitsudbyttet i Landets forskjellige Egne var kun 232.3 Tdr. pr. Td. Ld. imod 288.5 Tdr. pr. Td. Ld. i 1901 og 339 Tdr. i 1900. Udbyttet pr. Td. Ld. varierer imellem 160 og 325 Tdr.

Rutabaga, der ligesom Turnips kun dyrkes i lille Udstrækning i Forhold til Runkelroer, har i Gjennemsnit givet et Udbytte af 265.7 Tdr. pr. Td. Ld. imod 288.5 Tdr. i 1901 og 339 Tdr. i 1900.

Turnips har givet 283.9 Tdr. pr. Td. Ld., medens Udbyttet deraf i 1901 kun var 169 Tdr.

Ligesom de andre Rodfrugtafgrøder have Sukkerroerne ogsaa ladet meget tilbage at ønske; de have kun givet et Gjennemsnitsudbytte af 217 Centner pr. Td. Ld. imod 339.8 Centner i 1901; og medens det største Udbytte i dette Aar var 400 Centner pr. Td. Ld., naaedes i 1902 kun 280 Centner.

Cikorie opgives et enkelt Sted at have givet 200 Centner pr. Td. Ld.

Fra Nord-Fyen meddeles, at Dyrkning af Sennep er almindelig udbredt, men den blev mange Steder ikke moden. Udbyttet opgives til 1200 Pd. pr. Td. Ld. I de senere Aar har der paa Sennepen vist sig en lille Bille, som fuldstændig har ødelagt den.

Efter denne kortfattede Oversigt over Høstudbyttet i 1902, skulle vi i det efterfølgende samle de velvilligst fremsendte Besvarelser af de Spørgsmaal, vi have tilladt os at rette til d'Hrr. Korrespondenter i Landets forskjellige Egne.

Vintersæden blev, som Følge af den sildige Indhøstning, saaet sent i Efteraaret, og saavel Hvede som Rug udviklede sig i Begyndelsen kun tarveligt. Planterne vare gennemgaaende svage og stode mange Steder stærkt spredte, men den milde Vinter og den foraarsagtige Marts Maaned hjalp Vintersæden godt frem, om den end mange Steder lader endel tilbage at ønske. Som en af Grundene hertil udtales i Korrespondancen fra Vordingborg-Eggen, at Landmændene som Regel ere utilbøjelige til at paatage sig den forholdsvis lille Udgift og Ulejlighed, der er forbundet med at skaffe Saasæd af gode Stammer, hvilket ikke alene gjælder Rugen, men samtlige Kulturplanter. I samme Egn saa Hveden en Periode i Foraaret daarlig ud, formentlig angrebet af en eller anden Sygdom, og enkelte Steder maatte den ompløjes, men som Regel staar den dog nu tilfredsstillende. Selv paa de ud-

prægede Hvedejorder paa de sydlige Øer var Hveden tarvelig og spæd fra Efteraaret, hvilket bl. a. tilskrives mangelfuld Spireevne. Mindre Stykker ere hist og her ompløjede. Medens Hveden har bedret sig godt paa Lolland og lover en normal tilfredsstillende Afgrøde, menes den gennemgaaende kun at ville give en tarvelig Afgrøde paa Falster og kun faa Steder at ville give en god Afgrøde. Ligesom Hveden saaledes er ogsaa Rugen meget forskjellig; lidt er ompløjet, andet er fremhjulpet ved Chilisalpet, medens atter andet staar glimrende. Tidlig Saaning, ikke senere end Midten af September, har vist sig heldigst. — Fra Fredericia-Egnen anføres som en Mærkelighed, at Rugen staar bedst paa de tarveligst behandlede Brakmarker.

Den unge Kløver tegner gennemgaaende godt; som Regel staa Planterne sluttede, men synes noget kortere end almindeligt, Paa Fyen synes Kløveren dog at blive holdt noget tilbage i Væksten som Følge af Foraarskulden, og fra Herning-Egnen skrives, at Kløveren ikke har gjort stor Fremgang, og at man kun venter et lille Udbytte. Det viser sig der paa Egnen vanskeligere nu end tidligere og lykkes sjældnere at frembringe en god Kløverafrøde, af hvilken Grund mange ere begyndte at forøge Mængden af Græsfrø i Frøblanding.

Hvad Husdyrenes Føder- og Sundhedstilstand angaar, saa har den gennemgaaende været god. Kun fra Slagelse—Kallundborg-Egnen klages der over stærk Lunge- og Halsbetændelse blandt Hestene. Paa Samsø har der været Rygmarvstufus i en Hestebesætning, og paa en Gaard bleve Køerne angrebne af en Lamhed i Bagkroppen, som senere bredte sig over hele Kroppen og endte med Døden. Det mentes at være Meningitis. I Aalborg—Hadsund-Egnen er der forekommet endel Fødselsvanskeligheder blandt Følhopperne, og i Hjørring-Egnen nogle Kastningstilfælde blandt Køerne. Fra Fredericia-Egnen meddeles, at Stivsyge blandt Svinene ikke er saa almindelig nu som tidligere.

Med Hensyn til anvendte Føderstoffer, da synes der i Reglen at være anvendt mere Oliekager end tidligere og i nogle Egne mindre hjemmeavlet Sæd og Klid. Forbruget af Majs har ligeledes været indskrænket paa Grund af dets høje

Pris og flere Steder slette Kvalitet. Af Kager ere Solsikke-, Bomuldsfrø-, Jordnød- og Hampefrøkager de mest anvendte.

I de modtagne Korrespondancer klages der over forskellige af de anvendte Kager. Fra Jyderup-Egnen skrives saaledes, at Bomuldsfrøkagerne vare af slet Kvalitet og fra Hjørring-Egnen, at de, der indførtes i Marts, vare sorte og haarde, saa Kvæget ikke kunde tygge dem.

I Jyderup-Egnen er der brugt endel Jordnødkager, men hvor der er fodret med en 5—6 Pd. af dem, synes man at have sporet en begyndende Bensvaghed hos Køerne. De havde, da de kom paa Græs, en vaklende Gang, som dog snart fortog sig. Man er blevet lidt bange for disse Kager, fordi der paa en Gaard, hvor der ligeledes var fodret stærkt med dem, pludselig udbrød en Epidemi, der særlig viste sig ved nævnte Bensvaghed og pludselig Død.

I forskellige Egne er der benyttet endel Hampefrøkager, der vare billige, men som ikke synes i lige høj Grad yndede af Kreaturerne.

Fra Herning-Egnen, hvor der er benyttet en Mængde forskellige Oliekager, klages der over, at Jordnødkager og franske Rapskager have haft et mindre Indhold end garanteret. Paa Bornholm ere Hampefrøkager kjøbt forholdsvis billigt direkte fra Rusland; derimod var Majs glutenmel, som roses meget, for dyrt. Man er paa Samsø, ligesom mange andre Steder, godt inde paa at anvende kvælstofholdigt Foder i Forbindelse med Roefoder, og der findes mange Besætninger, til hvilke man slet ikke anvender Kjærne. I Mod sætning hertil er der i Syd Fyen anvendt megen hjemmeavlet Sæd, og i Fredericia-Egnen antagelig mere end sædvanlig. I Vordingborg-Egnen er der kjøbt endel russisk Byg til Svinefoder.

Kun fra Korsør—Slagelse-Egnen klages der over stærk Dødelighed blandt Smaagrisene, der vedblev, trods gjennemgribende Desinfektion, og som først standsede som Følge af Sommervarmen.

De fleste af de modtagne Meddelelser gaa ud paa, at Svinebestanden snarere tiltager end aftager, idet der rundt omkring tillægges en Mængde Grise. Kun fra Falster og

Mors meddeles, at Svinebestanden er lidt under den normale Størrelse, medens de store Slagtninger paa Lolland tyde paa en stor Svinebestand.

Rodfrugtbeholdningerne have gjennemgaaende kun vist sig tilstrækkelige, hvor man har anvendt den fornødne Sparsommelighed, medens de mange Steder ere slupne for tidligt op, baade til Skade for Mælkeudbyttet og for Udgiften til Erstatningsfoder, hvortil der paa Lolland hyppig anvendes Melasse.

Endnu inden Roerne vare blevne høstede i Efteraaret frøs mange af dem, og hvor man saa ikke senere var omhyggelig med Roekulernes Pasning ved at formindske Dækningen i den milde Vinter, raadnede Roerne henad Foraaret. Fra flere Steder klages over, at Roerne vare mindre holdbare end normalt, og at de vare stærkt trevlede, saa der hang megen Jord ved dem, men til Gjengjæld indeholdt de smaa Roer mere Tørstof end sædvanligt.

I enkelte Egne paa Fyen var Halmmængden saa knap, at man maatte købe.

De fleste Steder vare Køerne komne paa Græs omkring Midten af Maj, men ikke sjældent bleve de i Begyndelsen tagne paa Stald om Natten paa Grund af Kulde. Snestormen i Slutningen af April satte Græsvæksten noget tilbage og sinkede Udbindingen. Samsø synes at danne en Undtagelse, idet Kvæget der kom paa Græs i den første Uge i Maj, og Meddelelsen gaar ud paa, at det er længe siden, man har haft saa tidligt og frodigt Græs.

Vinterarbejderne ere gaaede godt fra Haanden. Frostvejret i November frembragte vel en Standsning, men i Løbet af den senere milde Vinter indhentede man det forsømte. Man fik pløjet al den Jord, der skulde pløjes, ligesom der ogsaa blev Lejlighed til at faa de forskellige Kjørselsarbejder udførte.

Jorden var tidlig tjenlig til Behandling i Foraaret, og Foraarsarbejderne gik til at begynde med — med Undtagelse af nordjydske Egne — rask fra Haanden, men Snestormen omkring den 20. April bragte en brat Standsning, saa de og dermed Foraarssaaningens faldt i to Afsnit med

en 10—14 Dages Standsning. Da man atter skulde tage fat paa Saaningen, var Jorden mange Steder bleven tung og vanskelig at behandle. Om der end blev omtrent en Maanedes Forskjel paa det først og sidst saaede, saa spirede alt Kornet dog jævnt og smukt, om end paa Steder noget langsomt, og Afgrøderne udviklede sig gjennemgaaende godt, indtil de i Maj Maaned i høj Grad begyndte at trænge til Regn.

Paa Bornholm synes det som Nemathoderne atter i Aar skulle angribe den Havre, der ikke er saaet i Grønjord.

Angaaende Spørgsmaalet, om der er Udvidelse af Rodfrugtdyrkningen, da gaa af 21 Besvarelser de 16 ud paa, at der finder en saadan Udvidelse Sted, medens Forholdet for de 5's Vedkommende er uforandret. Paa Øerne synes man særlig at foretrække Barres Roen, medens enkelte sætter mere Pris paa Eckendorfer, der dels er mere givtig og dels lettere at trække op. I Jylland dyrkes hovedsagelig Kaalrabi, Rutabaga og Turnips.

For Roedyrkningens Vedkommende spiller Arbejderspørgsmaalet altid en vigtig Rolle, og fra flere Steder klages der over Mangel paa tilstrækkelig Arbejdskraft for at faa Roerne passede i rette Tid.

Der synes i de fleste Egne og særlig paa Øerne at komme lidt mere Ro i Arbejderforholdene. Det viser sig vedblivende vanskeligt at faa gode Karle, medens der mellem dem findes mange løse og daarlige Elementer, som have faaet Løbepas i Byerne. Man hjælper sig mange Steder hovedsagelig med gifte Arbejdere og Akkordarbejde. I flere jyske Egne er Lønnen stigende, medens den gjennemgaaende er normal paa Øerne. Det kniber særlig, som sædvanlig, med at faa Malkepiger, og som et Kuriosum meddeles fra Hjørring Egnen, og Landmændene kunne næsten ikke opdrive Piger til den nødvendige Gjærning. Til Malkning benyttes ikke ualmindelig Dreng og gifte Malkere, ligesom man, hvor det kan lade sig gennemføre, lader den udføre paa Akkord.

Fra Mors klages der over, at Daglønnen stiger. Der betales nu 2 Kr. + Kost, men Arbejderforholdene ere iøvrigt gode og sunde.

Udvandringen fra Thy til Amerika har i Aar været stærkere end sædvanlig. I flere Egne paa Øerne er det nu langt lettere at faa tilstrækkelig Arbejdskraft end tidligere, men maaske kan det tilskrives, at der mange Steder benyttes indførte Arbejdere, idet, som der skrives fra Langeland, den indførte Arbejdskraft giver normale Forhold.

Gjennemgaaende have Priserne paa Slagtekvæg ikke været saa lidt bedre end det foregaaende Aar. Priserne paa gode Udsætterkøer have ligget mellem 20 og 23 Øre, medens halvfedede kun ere betalte med 15 à 18 Øre pr. Pd. lev. Vægt. For 1. Klasses Køer er der betalt fra 23 og indtil 32 Øre pr. Pd. lev. Vægt.

Kælvkøer og Kvier med Kalv ere overalt dyre, og fra Aalborg—Hadsund-Egnen skrives herom, at Efterspørgslen efter Køer og Kvier er i stadig Stigen, og at ingen Forretning er sikrere, end at have drægtige Kvier tilsalg.

I Jylland synes Handelen med gode Heste at have været ganske livlig til noget stigende Priser. I Herning-Egnen opgives Prisen paa 2-aarige Heste til 250—300 Kr., paa 3-aarige til 350—450 Kr., paa 4-aarige til 4—600 Kr. og paa 7-aarige til 4—700 Kr., medens almindelige Arbejdsheste ere betalte med 350—500 Kr. Paa Mors have Priserne været bedre end i mange Aar. Paa Øerne synes Forholdet et noget andet. Fra Slagelse—Kallundborg-Egnen meddeles vel, at Prisen er stigende, og at der for 2 à 3 Aars Heste er betalt 5 à 600 Kr. I Nordsjælland ere Heste betalte med 6—800 Kr. I Slagelse—Korsør-Egnen ere Plage næsten usælgelige, i det nordøstlige Fyen ere Hestepriiserne ikke saa gode, i Middelfartegnen ere Hestene billigere end før, og i Nakskovegnen er Prisen paa dem lav. I Assens-Egnen ere de bedste Heste betalte med 600 Kr.

Af de modtagne Korrespondancer meddeles følgende Foldudbytte (Tdr. pr. Td. Ld., holl. Vægt):

Fra Horns Herred: Rug 12—13 Tdr. til 122—124 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. til 114—118 Pd., 6 rd. Byg 14 Tdr. til

110—116 Pd., Havre 15 Tdr. til 88—90 Pd., Kartofler 100 Tdr., Runkelroer 200 Tdr., Turnips 200 Tdr.

Fra Frederiksborg-Eggen: Hvede 22 Tdr., Rug 14 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 15 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. Byg 15 Tdr. til 108 Pd., Havre 18 Tdr. til 82—84 Pd., Kartofler 100 Tdr., Runkelroer 200 Tdr., Rutabaga 200 Tdr., Turnips 250 Tdr.

Fra Jyderup-Eggen: Hvede 20 Tdr. til 129—130 Pd., Rug 16 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. til 112—114 Pd., Havre 12 Tdr. til 80 Pd., Ærter 12 Tdr., Kartofler 100 Tdr., Runkelroer 250 Tdr.

Fra Slagelse—Korsør-Eggen: Hvede 16—18 Tdr. til 128—132 Pd., Rug 12—15 Tdr. til 120—124 Pd., 2-rd. Byg 13—17 Tdr. til 112—116 Pd., Havre 18—24 Tdr. til 85—90 Pd., Kartofler 60 Tdr., Runkelroer 2—300 Tdr.

Fra Kallundborg—Slagelse-Eggen: Hvede 16 Tdr. til 130 Pd., Rug 15 Tdr. til 123 Pd., 2-rd. Byg 15 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. Byg 17 Tdr. til 109 Pd., Havre 19 Tdr. til 85 Pd., Ærter 8 Tdr., Kartofler 70 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Turnips 300 Tdr.

Fra Vordingborg-Eggen: Hvede 17 Tdr. til 130 Pd., Rug 13 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 13 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. Byg 13 Tdr. til 109 Pd., Havre 16 Tdr. til 88 Pd., Ærter 9 Tdr., Kartofler 50 Tdr., Runkelroer 225 Tdr., Sukkerroer 235 Centner.

Samsø: Hvede 17 Tdr., Rug 16 Tdr., 2-rd. Byg 14 Tdr., Havre 19 Tdr., Kartofler 80 Tdr., Runkelroer 250 Tdr.

Bornholm: Hvede 19 Tdr. til 129 Pd., Rug 14 Tdr. til 123 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 115 Pd., 6-rd. Byg 14 Tdr. til 110 Pd., Havre 20 Tdr. til 82 Pd., Kartofler 90 Tdr., Runkelroer 200 Tdr.

Falster: Hvede 18—20 Tdr. til 130—31 Pd., Rug 12 Tdr. til 122 Pd., 2-rd. Byg 14—16 Tdr. til 111—113 Pd., Havre 18—20 Tdr. til 87 Pd., Bønner 10 Tdr., Ærter 10 Tdr., Runkelroer 250 Tdr., Sukkerroer 200 Centner, Rutabaga 240 Tdr.

Midtjylland: Hvede 17 Tdr. til 130 Pd., Rug 13 Tdr. til 124 Pd., 2-rd. Byg 14 Tdr. til 112 Pd., Havre 16 Tdr.

til 85 Pd., Ærter 12 Tdr., Kartoffler 80 Tdr., Runkelroer 275 Tdr., Sukkerroer 230 Centner, Rutabaga 275 Tdr.

Vestlolland: Hvede 21 Tdr. til 127—128 Pd., Rug 16 Tdr. til 118—119 Pd., 2-rd. Byg 17 Tdr. til 113—114 Pd., 6-rd. Byg 14 Tdr. til 110 Pd., Havre 23 Tdr., Ærter 12 Tdr., Kartoffler 80 Tdr., Runkelroer 300 Tdr., Sukkerroer 280 Centner.

Langeland: Hvede 12—22 Tdr. til 125—130 Pd., Rug 14—15 Tdr. til 123 Pd., 2-rd. Byg 14—18 Tdr. til 111—114 Pd., 6-rd. Byg 15—16 Tdr., Havre 18—20 Tdr., Kartoffler 70—90 Tdr., Runkelroer 300—350 Tdr.

Assens-Egnen: Hvede 16 Tdr., Rug 15 Tdr., 2-rd. Byg 17 Tdr., 6-rd. Byg 15 Tdr., Havre 17 Tdr., Bønner 18 Tdr., Runkelroer 230 Tdr., Sukkerroer 208 Centner, Turnips 250 Tdr.

Egnen mellem Ringe og Faaborg: Hvede 16 Tdr. til 126 Pd., Rug 12 Tdr. til 114—120 Pd., 2-rd. Byg 16 Tdr. til 108—110 Pd., Havre 18 Tdr. til 80 Pd., Kartoffler 100 Tdr., Runkelroer 300 Tdr.

Nordøst-Fyen: Hvede 15—20 Tdr. til 124—130 Pd., Rug 12—15 Tdr. til 118—122 Pd., 2-rd. Byg 13—17 Tdr. til 110—115 Pd., Havre 16—20 Tdr. til 80—95 Pd., Ærter 5—8 Tdr., Kartoffler 100 Tdr., Runkelroer 230 Tdr., Sukkerroer 150 Tdr., Sennep 1200 Pd.

Askov-Egnen: Rug 8 Tdr. til 112 Pd., 2-rd. Byg $7\frac{1}{2}$ Tdr. til 104 Pd., 6-rd. Byg 7 Tdr. til 120 Pd., Havre $13\frac{1}{2}$ Tdr. til 72 Pd., Bønner $4\frac{1}{2}$ Tdr., Ærter $11\frac{1}{2}$ Tdr., Boghvede 4 à 5 Tdr., Kartoffler 130 Tdr., Runkelroer 160 Tdr., Rutabaga 280 Tdr., Turnips 340 Tdr., Gulerødder 240 Tdr., Cikorie 200 Centner.

Egnen ved Fredericia: Hvede 14 Tdr., Rug 12 Tdr., 2-rd. Byg 12 Tdr., 6-rd. Byg 13 Tdr., Havre 18 Tdr., Kartoffler 70 Tdr., Runkelroer 175 Tdr., Rutabaga 200 Tdr., Turnips 300 Tdr.

Aarhus-Egnen: Rug 10—12 Tdr. til 120—124 Pd., 2-rd. Byg 12—14 Tdr. til 110—112 Pd., Havre 14—16 Tdr. til 76—80 Pd., Kartoffler 80 Tdr., Rutabaga 250 Tdr., Turnips 250 Tdr.

Grenaa-Eggen: Hvede 18—20 Tdr. til 124—126 Pd., Rug 10—12 Tdr. til 118—120 Pd., 2-rd. Byg 10—12 Tdr. til 110—114 Pd., 6-rd. Byg 18—20 Tdr. til 106—110 Pd., Havre 12—14 Tdr. til 80—82 Pd., Bønner 14—16 Tdr., Kartofler 90—100 Tdr., Runkelroer 180—220 Tdr., Rutabaga 3—400 Tdr., Turnips 250—300 Tdr.

Aalborg—Hadsund-Eggen: Rug 12 Tdr. til 116—120 Pd., 2-rd. Byg 12 Tdr. til 112—113 Pd., Havre 13 Tdr. til 80—83 Pd., Kartofler 90—110 Tdr.

Vendsyssel: Rug 10 Tdr., 2-rd. Byg 10 Tdr., 6-rd. Byg 10 Tdr., Havre 13 Tdr., Kartofler 60—80 Tdr., Rutabaga 250—300 Tdr., Turnips 270—300 Tdr.

Mørsø: Rug 10—14 Tdr. til 116 Pd., 2-rd. Byg 12—16 Tdr. til 114 Pd., 6-rd. Byg 14—18 Tdr. til 100 Pd., Havre 12—22 Tdr. til 80—82 Pd., Kartofler 50—80 Tdr., Runkelroer 175—225 Tdr., Rutabaga 225—275 Tdr., Turnips 250—300 Tdr.

Thy: Rug 10—14 Tdr. til 116 Pd., 2-rd. Byg 12—15 Tdr. til 110 Pd., 6-rd. Byg 14—18 Tdr. til 104 Pd., Havre 15—18 Tdr. til 84 Pd., Kartofler 60—80 Tdr., Runkelroer 150—300 Tdr., Turnips 300 Tdr.

Hjørring-Eggen: Hvede 18 Tdr. til 130 Pd., Rug 10 Tdr. til 117 Pd., 2-rd. Byg 12.8 Tdr. til 110 Pd., 6-rd. Byg 12 Tdr. til 106 Pd., Havre 16 Tdr. til 78 Pd., Blandsæd 18 Tdr. til 90 Pd., Kartofler 100 Tdr., Runkelroer 225 Tdr., Rutabaga 360 Tdr., Turnips 450 Tdr.

Herning-Eggen: Rug 12 Tdr., 2-rd. Byg 10 Tdr., 6-rd. Byg 10 Tdr., Havre 15 Tdr., Kartofler 80—100 Tdr., Rutabaga 250 Tdr., Turnips 300 Tdr.

Skjern-Eggen: Rug 10 Tdr., 6-rd. Byg 10 Tdr., Havre 12 Tdr., Boghvede 6 Tdr., Kartofler 80 Tdr., Rutabaga 250 Tdr., Turnips 200 Tdr.

Af de modtagne Beretninger meddeles følgende:

Horns Herred.

Rugen har gennemgaaet forskjellige Stadier, inden den har naaet sin nuværende lovende Udvikling, navnlig synes den kolde og tørre Periode i Marts og Begyndelsen af April at have hæmmet og trykket den meget, hvorimod det Snelag, der kom sidst i April, nærmest synes at have virket som en Overgødning med Chilisalpeter, i alt Fald staar den nu med en meget kraftig Farve og er tætsluttet og stærk.

I Almindelighed har det været Meningens at forøge Svinebesætningerne, og naar dette ikke er sket, maa det tilskrives en stor Dødelighed blandt Smaagrisene. At en stor Svinebesætning i de sidste Aar har været et lukrativt Foretagende, er givet, og Sandsynligheden taler for, at det vil vedblive at være det for det første.

Sidste Aar har været godt for Landmanden, som ikke har nogen skellig Grund til Klage, og Forholdene i Aar tegne for Øjeblikket særdeles godt.

Frederiksborg-Eggen.

Arbejderforholdene ere bedre. Efter at det i mange Aar ikke har været muligt at faa Karle, har man i Aar let kunnet faa saadanne, selv paa store Gaarde.

Jyderup-Eggen.

Lønningen til Daglejere er uforandret, medens den er stigende for faste Folk. Det er underligt at høre Tale om Arbejdsløshed og Trang til Erhverv, naar man her paa Eggen ikke har Arbejdskraft nok og maa baade tigge og betale for at faa Arbejdere.

Slagelse—Korsør-Eggen.

Den unge Kløver har overvintret godt og viser en forbausende Frodighed, men den trænger til en ordentlig Regn for ikke at standse i Væksten. Kreaturerne kom paa Græs allerede i Begyndelsen af Maj i varmt Vejr, men i Midten af Maanedens fik vi mange kolde Nætter, hvor Temperaturen var nær Frysepunktet. Hvor Køerne ikke toges paa Stald om

Natten eller havde Dækkener, led de meget af Kulden. Mælkeudbyttet sank, men da det senere i Maanedens atter blev varmt, tiltog det ganske betydeligt.

For velfodrede Udsættere og Overløbere har der været udmærket god Afsætning over Kiel med Dampskib fra Korsør, og de have meget godt kunnet bære Omkostningerne ved de 10 Dages Karantæne.

Kallundborg—Slagelse-Egnen.

Kreaturpriserne have været gode. Hestehandelen har i Foraarstiden været meget god, og Priserne ere stadig stigende, saa alt, hvad der kaldes Handelsheste, er udsolgt.

Vordingborg-Egnen.

Afsætningen af Kvæg til Slagtning har været omtrent som de nærmest foregaaende Aar, undtagen for de allertarveligste Varers Vedkommende; her har nemlig Efterspørgslen været større end Tilbudet, og Prisen paa en tuberkulos, mager Ko har i Slutningen af Vinteren været ca. 60 Kr. for et lignende Individ, som for 1 à 2 Aar siden kun kostede 30—40 Kr.

Bornholm.

Kartoffelhøsten var god og her er solgt en hel Del til Export. Prisen, der ikke har været saa god som forrige Aar, varierede fra 3 til $3\frac{1}{2}$ Kr. pr. Td.

Her synes at være lidt Fremgang i Dyrkningen af Ærter, en Følge af Statskonsulent K. Hansens Foredrag: Kan vi selv avle vort Kvælstof. De lokale Gjødningsforsøg vise i Aar lidt Fremgang, og landøkonomisk Forening indbyder atter i Aar til at deltage i Konkurrence samt paabegynder Præmiering af hele Landbrug.

Skjøndt Mængden af Vaarsædshalm de fleste Steder har været mindre end sædvanlig, har man dog ikke hørt Tale om synderlig Halmmangel, enten det nu ligger i, at der har været anvendt stor Sparsommelighed eller at Halmen har været mere drøj. Mange Steder høstedes der for hurtigt, og Tærskning fra Marken skaffede Møllere og Kjøbmænd mindre tør Rug og Hvede.

Nord-Falster.

Der blev i Februar for første Gang afholdt et nyt etableret Hestemarked i Nykjøbing, idet man mente, at den efterhaanden lettere Forbindelse med Tyskland maatte gjøre Nykjøbing til en heldig beliggende Plads for et saadant. De samvirkende Landboforeninger tog Initiativet og fik Markedet arrangeret, og det lykkedes særdeles godt. Der var mange Heste, ret talrige Kjøbere og tilfredsstillende Handel.

De samv. Landboforeninger har fra 1. April faaet etableret en Art Planteforædlingsstation paa Lolland, idet Bestyrelsen for Abbed Høj- og Landbrugsskole har overladt Foreningerne Skolen med et Tilliggende af ca. 12 Tdr. Land paa meget favorable Vilkaar.

Skolen, der er en selvejende Institution, blev strax efter Krigen i 1864 oprettet ved Tilskud af patriotiske Mænd, blandt hvilke særlig maa nævnes afdøde Etatsraad Jørgensen til Søholt og Søllestedgaard.

Landbrugskandidat Westergaard, som i flere Aar har arbejdet med Planteforædling, er antaget som Bestyrer, og Op-gaven er at frembringe yderige og solide Varieteter af Landbrugets Kulturplanter. Statens Planteavlsudvalg støtter Sagen paa forskjellig Vis, og bl. a. ved, at det der lader udføre Hvede- og Bygdyrkningsforsøg. Men Sagen har kun kunnet bringes i Gang ved, at alle Stiftets Landboforeninger have vist sig endog meget offervillige.

Midtlolland.

Forbruget af indkjøbte Foderstoffer koncentrerer mere og mere om de kvælstofholdige Stoffer — en naturlig Følge af, at Roefoderet spiller en forøget Rolle i Foderrationen — medens de kvælstoffattigere Fodringsmidler, som Klid og Sæd, i tilsvarende Grad trænges tilbage i anden Linie. For afvigte Vinters Fodring var det en følelig og kostbar Ulempe, at Roefoderet gennemgaaende slap for tidligt op og kun delvist lod sig erstatte ad anden Vej — hyppigst ved Anvendelse af Melasse eller Melassefoder i Foderblandingen.

Jorden var usædvanlig tidlig bekvem til Saaning, og i den sidste Uge af Marts Maaned saaedes her paa Egnen be-

tydelige Mængder af Sæd i udmærket bekvem Jord. Som sædvanligt synes den tidlige Saaning ogsaa i Aar at hævde sin Overlegenhed.

Vestlolland.

De forskellige Sædarter have her paa Egnen givet et meget stort Foldudbytte, saa det endog overgik det meget gunstige Aar i 1892. Hvedemarker, der gav 24—28 Fold, vare ikke sjældne, ligesom der var Marker med toradet Byg, som gav over 20 Fold, noget, vi ellers ikke kjende her paa Egnen. Men var Kornet foldrigt, saa vare Rodfrugterne, særlig Sukkerroerne, meget daarlige, og der fandtes Marker, paa hvilke der kun avledes 200 Centner og derunder pr. Td. Ld.

Der har i de sidste Aar fundet en Udvidelse af Sukkerroedyrkingen Sted, men det er et Spørgsmaal, om Dyrkingen deraf ikke bliver for dyr i Længden, da Arbejdskraften bliver vanskeligere og vanskeligere at skaffe tilveje og Lønkravet bliver større og større, saa bliver Resultatet ikke større end i 1902, medfører Sukkerroedyrkingen absolut Tab, og det tilmed større, end Landbruget vel kan bære.

Assens-Egnen.

Vintersæden tegner de fleste Steder fortrinlig, dog findes der hist og her enkelte tynde saavel Hvede- som Rugmarker. Hist og her er noget Rug pløjet om og i dens Sted saaet 6-rd. Byg eller Roer. Allerede i Slutningen af Marts var Jorden mange Steder tjenlig til Saaning, og der saaedes da ogsaa en Del Ærter, og i den første Uge af April ikke saa lidt Byg; men Saaningen blev dog ikke almindelig før efter den 6. April.

Faaborg—Ringe-Egnen.

Begrundet paa den store Kornavl i 1902, er der ikke brugt nær saa mange indkjøbte Foderstoffer i afvigte Vinter som i tidligere Aar. For de Kjøbmænd, som handle med Foderstoffer i stor Stil, har Vinteren været slem, og de have tabt mange Penge.

Smørpriserne have vel gennemgaaende været lidt lavere end ifjor, men de fleste Mælkeproducenter ere Medlemmer af et eller andet Andelsmejeri, som alle faa over Topnoteringen for Smørret, hvorved dettes Pris højnes med 2 à 3 Øre pr. Pd.

Der er siden 15. December 1902 leveret mange Svin paa Slagterierne. Om dette ogsaa vil blive Tilfældet i Fremtiden, er vanskeligt at sige. Grisepriserne ere høje, hvilket tyder paa god Efterspørgsel og en ikke stor Produktion. De høje Baconpriser i 1902 og den store Kornavl have været en Opfordring til at holde mange Svin, hvilket ogsaa hidtil har været Tilfældet. Baconpriserne ere jo imidlertid lavere nu, og det er saa let at aflægge nogle Grisesøer, hvorfor det er umuligt at sige, hvad Fremtiden i den Henseende vil bringe.

Grisenes Dødelighed er nærmest et lokalt Onde, hidrørende enten fra en daarlig Race eller fra Fejl i Søernes og Grisenes Behandling eller endelig fra daarlige Svinestier og for lidt Strøelse.

Nordøstlige Fyen.

Rodfrugtdyrkningen er temmelig udbredt her paa Egnen, særlig i de mindre Agerbrug. Her er i de senere Aar dyrket endel Sukkerroer, men Resultaterne have været mindre gode, og der lægges nu særlig Vægt paa Dyrkning af Foderroer.

Skjøndt Høavlen i Fjor var lille og Roemarkerne kun gave et tarveligt Udbytte, har Mælkeydelsen dog været ret god. De smaa Roer have sikkert haft stor Næringsværdi, men desværre slap de som Regel for tidligt op.

Askov-Egnen.

Kløveren, der stod særdeles godt fra Efteraaret af, overvintrede godt, men fylder dog tilsyneladende ikke saa meget i den sjældne gode Græsafgrøde, som nu staar paa Marken. Især paa de kraftigt gødede Marker har Græsset taget Têten. Mon ikke den megen Tale om, at Kløveren ikke vil trives nu som forhen, for en stor Del hænger sammen med Jordens øgede Kultur og Gjødningskraft, som begunstiger Græssets

Væxt langt mere end Kløverens og hvorved denne trænges tilbage i Væxt; mange Forhold tyde paa, at det er saaledes.

Rodfrugtarealerne tage jævnt til baade i Udstrækning og i Godhed, særlig i Godhed. Der er heller ingen Tvivl om, at der ved et intensivere Arbejde paa og bedre Gjødningskraft i disse Marker opnaas den gunstigste Balance mellem Indtægt og Udgift, ligesom Arbejdet ogsaa derved lettere overkommes.

Fredericia-Egnen.

Naar der spørges om Svinebestanden er over eller under normal Størrelse, er dette lidt vanskeligt direkte at besvare, thi hvad er det normale? Svinebestanden er taget til i flere Aar og maaske stærkere ifjor og iaar; der lægges en Mængde Grise til, men desuagtet koste de 12—16 Kr. pr. Stk., fem Uger gamle. Vedblive disse gode Priser, vil Svinebestanden vedblive at voxе.

Saavel Afsætning som Priser paa Heste tegnede ikke godt til at begynde med, og der mentes, at de forskjellige tekniske Drivkræfter vare ifærd med at gjøre endel af Hestebestanden overflødig; men der viste sig dog senere god Efterspørgsel, og der blev endog bedre Brug for mindre gode Heste, end man troede muligt. Skjøndt Priserne ere lavere end for faa Aar tilbage, ere de dog store nok til, at det er en god Forretning at opdrætte en god Hest.

Aarhus-Egnen.

Kornet blev i Foraaret ikke saaet under saa gunstige Betingelser som ønskeligt, idet Jorden var endel haard og fugtig. Om Følgen heraf er en enestaaende Mængde Ukrudt af alle Slags, skal jeg ikke kunne sige, men Faktum er, at det er længe siden, at man har set saa gennemgaaende urene Marker som i Aar.

Grenaa-Egnen.

Den Skik, som mange følger, at sprede Gjødningen paa Vinterfuren i Februar, har i Vinter vanskeligt kunnet følges, og Udkjørselen har ofte maattet udsættes til Foraaret. Flere

have da brugt at bredsaa paa Gjødningen og dække begge Dele med Skrælleplov, en Fremgangsmaade, der yndes af mange.

Rodfrugtdyrkningen er i jævn Fremgang. Den gamle Frygt for ikke at kunne overkomme det deraf flydende Arbejde, hører man nu sjældent om. Der begyndes altid med Turnips, men efterhaanden gaas over til Runkelroer, hvor Forholdene passe dertil. Guleroden taber Terræn af let forklarlige Grunde; den kræver meget mere Arbejde og har ikke saa store Fortrin, som man tidligere tillagde den. Kaalrabi giver stort Udbytte og vil nok vinde Udbredelse, naar den er fri for de forskjellige Angreb, for hvilke den er udsat.

Aalborg—Hadsund-Egnen.

Faar gaa her paa Egnen mere og mere ud af Kurs. Her er i Aar gjort Forsøg med at saa Raps paa Kjærjord. Den er gjødet med Kainit og Thomasslakke og staar lovende.

Sydøst-Vendsyssel.

Arbejdsforholdene ere nogenlunde rolige og uforandrede, dog mangler som oftest tilstrækkelig Arbejdskraft i de travle Perioder. Blot Tjenestefolkene i Byerne, som ere indvandrede fra Landet, vilde kunne forstaa, at de selv vare bedst tjente med atter at udvandre til Landet, hvor de altid kunne finde lønnende og stadigt Arbejde.

Morsø.

I de senere Aar har Udvidelsen af Roedyrkningen været stor, hvilket i Forbindelse med Afskaffelse af Brakken, Ud-kjørsel af al Gjødning om Foraaret, Pløjning af 2 à 3 Marker om Foraaret har foraarsaget en hel Omvæltning i Foraarsarbejdet, der nu strækker sig over 2 Maaneder, fra først i April til omkring 1. Juni, da man er færdig med Saaning af de sidste Turnips. At pløje Sæden ned er meget i Brug, og man er meget opmærksom paa Resultatet deraf.

Hjørring-Egnen.

Der er et levende Røre blandt Interessenterne i et enkelt Mejeri. Leverandørerne af fed Mælk, særlig af Jersey-Køer,

paastaa at lide et stort Tab ved Afregning efter Fjords Tabeller med Konstanten 2. Der har været nedsat en Voldgift med en af Retten udnævnt Opmand, som er kommet til det Resultat, at vedkommende Leverandør af Jersey-Mælk med ca. 5 pCt. Fedt ikke faar den fulde Værdi af sin Mælk betalt efter Fedtindhold, saaledes som Lovene lyde. Efterhaanden som Kontrolforeningerne paavise Forskjellen i Fedtindholdet i de forskjellige Besætningers Mælk, bliver dette Spørgsmaals rette Afgjørelse af stor Betydning.

Herning-Eggen.

Siden 1. Februar har man ikke set ret mange Roebatterier, uden at der har været en Mængde ubrugelige Roer i dem. Dette skyldes sikkert udelukkende mangelfuld Dækning mod den tidlige, ganske vist kortvarige, men temmelig strenge Frost, vi havde i December. Roerne har da efter Optøningen taget Varme og Ødelæggelsen har hærget Batterierne.
