

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøiskolen og Landhuusholdningssekskabets Stationer i Mai og Juni Maaneder 1861.

Mai.

	Middelvarme (°C)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regn- og Snees- dagens Antal	Middel-Varige- hedsgrad R. 2 i pGr.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøiskolen	8,0	30te	15,3	2den	+1,5	28" 0,08	13,0	16	61
Hindholm ved Nestved . . .	8,0	30te	16,4	4de	+2,3		19,8	17	72
Næsgaard ved Stubbebjerg	7,6	27de	14,6	2den	+2,0	28" 0,35	14,1	15	68
Smidstrup ved Hjørring . .	7,5	30te	13,3	7de	+4,2		14,9	8	67
Tarum ved Varde	7,6	30te	15,3	2den	+2,9		21,0	16	74
Skaarupgaard ved Aarhus	7,3	30te	13,6	8de	+2,9	28" 1,48	7,3	13	61
Maibølgaard ved Sønderborg .	7,9	30te	15,4	4de	+3,8		15,5	15	mangler.

Paa Landbohøiskolen havde den laveste Varmegrad den 3die og 8de med $\div 2,0^{\circ}$ C., paa Hindholm den 2den med $\div 2,3^{\circ}$ og paa Skaarupgaard den 8de med $\div 3,0^{\circ}$ C.

Paa Landbohøiskolen var Varmen i 5 Døgn under Frysepunktet, paa Hindholm i 6 og paa Skaarupgaard i 12 Døgn.

I Tarum faldt den 31te 10,8 Linier Regn.

Paa Hindholm har der været Hagelsæld paa 7 forskellige Dage, paa Maibølgaard 5, Skaarupgaard 4, Landbohøiskolen 3 og Tarum 2.

Ligesom i April har Vinden ogsaa i Mai overveiende holdt sig mellem Vest og Nord. Dens Retning iagttages 3

Gange daglig, altsaa i Mai Maaned ialt 93 Gange, og deraf har den været i de nævnte Himmelhjørner eller mellem dem: paa Landbohoisfolen 53 Gange, Hindholm 50, Næsgaard 44, Smidstrup 59, Tarum 59, Skaarupgaard 45 og Maibølgaard 59 (deraf 43 Gange i N.).

Juni.

	Middelvarme (Go)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regndagenes Antal	Middel-Fugtigheds- grad Al. 2 i pSt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohoisfolen	16,1	16de	22,2	1ste	11,0	28" 0,52	35,0	13	63
Hindholm . . .	16,1	16de	23,7	1ste	12,1		37,9	11	65
Næsgaard . . .	14,7	16de	20,0	2den	10,7	28" 0,36	53,8	13	78
Smidstrup . . .	14,7	15de	18,7	1ste	9,3		21,6	12	65
Tarum	15,3	13de	19,4	1ste	11,9		22,6	11	71
Skaarupgaard .	14,7	15de	18,5	1ste	11,1	28" 1,83	32,9	15	72
Maibølgaard .	15,2	16de	18,7	2den	11,1		41,4	12	mangler.

Paa Landbohoisfolen havde den laveste Varme den 4de med $7,2^{\circ}$ C., paa Hindholm samme Dag med $6,3^{\circ}$ C., paa Skaarupgaard ligeledes den 4de med $4,5^{\circ}$ C.

Juni Maaned har været rig paa hyppige og temmeligt stærke Regnstyl. Størst Regnmængde faldt der ved Landbohoisfolen den 30te, nemlig 13,5 Linier, paa Hindholm den 25de $8,1'''$, paa Skaarupgaard den 1ste $8,3'''$, paa Næsgaard den 30te $11,9'''$, i Smidstrup den 1ste $4,2'''$, i Tarum den 10de $5,8'''$ og paa Maibølgaard den 22de med 11,0 Linier.

Anm. Maanedens Middelvarme er ved Landbohoisfolen bestemt ligesom Middelal af Jagttagelser Al. 7, 12 og 11; Jagttagelserne Al. 8, 2 og 10 have givet $8,58^{\circ}$ C., altsaa en Forskel af $0,58^{\circ}$ C. Denne Forskel er brugt som Rettelse for de andre Stationer, hvor der kun iagttages Al. 8, 2 og 10. Varmegraden, der findes anført under varmeste og koldeste Dag, er derimod Middelal af Jagttagelserne Al. 8, 2 og 10 uden Rettelse. — Luftens Middeltryk er bestemt ved Jagttagelser Al. 8, 2 og 10.