

3,762 Pbd. Oliefager à 13 $\frac{1}{2}$	100 Pbd.	81 Rbd.	2 $\frac{1}{2}$	9 β
48 $\frac{1}{2}$ Tdr. Smaabhg à 21 $\frac{1}{2}$	141	-	1 - 15 -
24 Tdr. 6 $\frac{1}{2}$ Skp. Havre à 18 $\frac{1}{2}$.	74	-	5 - 8 -
Summa for Oliefager og Søb:		297 Rbd.	4 $\frac{1}{2}$	" β

Trækkes Summen 297 Rbd. 4 Mk. fra det ved Salget fremkomne Overskud: 575 Rbd., faaes tilbage 277 Rbd. 2 Mk., der skal betale de opsovrede Koer, hvoraf der er medgaaet 588 $\frac{1}{2}$ Tdr., der saaledes er udbragt til 2 Mk. 13 Sk. Tønden.

Fedekvæget har altsaa betalt: Oliefager, Korn og Koer ligefrem ved Salget. Hø og Halm repræsenterer Gjødningens Værdi.

4.

Roedyrkning paa Bernstorff Hovmarksgaard ved Kjøbenhavn.

Af Proprietair Lund.

Gaarden har 150 Td. Land Ager, inddeelt i 7 Indtægter af 21 Tdr., og et Bænge paa en 3 til 4 Tdr. Land; af Jordsmønnet er de $\frac{1}{4}$ Dele muldleret med Keermergel til Underlag, $\frac{1}{4}$ Deel Sandmuld med Sandmergels Underlag.

Sædstiftet er: 1, Havre, 2, Rodfrugt, 3, Bhg, 4, Biske-Havre og 1 til 2 Tdr. Land Værtter, (Biskehavren fodres grøn op til Køerne og de mange Tørveheste) 5, Hvede og Bhg, 6 og 7, Kløver, som afgræsses.

Havrestubbene pløies en 7" dybt saa hurtigt som muligt efter at Afgrøden er kommen bort; naar Veiret og Tiden tillader det, undergrundpløies en 12" dybt, saa meget som muligt i December og November, Resten tidlig i Foraaret — Gjødningen nedpløies som den udfjøres, naar Veiret tillader det, og sidste Pløining gives en 3 til 6 Dage før der skal saaes. Til Saaeningen opkammes Jorden med en almindelig Høppeplov, og Rammene tromles for at fastne Jorden. Opkammningen skeer gjerne umiddelbart efter Saaeningen, for at Jorden kan have sin Fugtighed til Frøets Spirning.

Om Vinteren og Foraaret udfjæres en 40 Læs Staldgjøbning pr. Td. Land, som spredes strax og nedpløies saa hurtigt som Veiret tillader det. Naar der ikke habes Staldgjøbning nok, gives 5 Læs Latrin- og 20 Læs Hestegjøbning (godt sammenblandet) pr. Td. Land. Kunstgjøbning har jeg ikke benyttet; kun 1862 prøvede jeg nogen Guano til Kaastrabi og Turnips; til første mislykkes Forsøget, fordi Planterne bleve ædt bort af Jordlopper, Turnipsen derimod var større og smukkere end ellers paa Marken, men jeg kan ikke opgive nogen Talstørrelser. 1 til 2 Tdr. Land besaaer jeg med røde grøn- hovebe Ræmpe-Gulerødder til Foder for Hestene, 3 til 5 Tdr. Land med stor Ræmpe-Rokaal og 1 til 2 Tdr. Land med Kartofler til Hunsholdningen, Resten af Marken besaaes gjerne med lige Dele Runkelroer ($\frac{1}{2}$ gul og $\frac{1}{2}$ overjordist), Kaastrabi og Turnips; alt bliver saaet undtagen Kaaalen, som plantes; dog har jeg stedse nogle Bede med Runkelroer og Kaastrabi til at udbedre med, hvor det skulde mislykkes; 1862 saaede jeg de første Runkelroer den 9de Mai, men det var for tidligt, de gif i Stof; den 21de Mai begyndte den egentlige Runkelroesaening; sidst i Mai saaede jeg Kaastrabi og var færdig midt i Juni; Turnips saaedes sidst i Juni og først i Juli.

Runkelroefrøet saaes med Haanden, Kaastrabi og Turnips saaes med en Maskine fra Schwefel & Howald i Kiel. Gulerødder har jeg de sidste 2 Aar bredsaet, før saaede jeg dem i Rader paa Kamme. Udthningen skeer med Fingrene og Haandhakkem; imellem Kammene renses med Hestehakkem, og 1 til 2 Gange bruges en lille Hypeplov til at sætte Jorden op med.

Oftagningen udføres med en Greb eller en Haffe efter at Toppen med en almindelig stor Kniv er skaaret af og kastet i Bunke, til at hjemføres for Køerne; jeg troer ikke, at man skal bruge Koetoppen, uden at man tillige giver Køerne en 6 til 8 P. Sæd om Dagen. 1862 høstes 280 Tdr. Runkelroer, 264 Tdr. Kaastrabi, 300 Tdr. Turnips og 220 Tdr. Gulerødder pr. Tønde Land; de foregaaende Aar er her høstet indtil

over 300 Tdr. Koer, 400 Tdr. Turnips og 330 Tdr. Gulerødder pr. Tønde Land. Koerne opbevares i Batterier, 2½ M. brede i Bunden og opstablede saa høit som muligt; de dækkes med Tang og, naar Frosten bliver stærk, kaste vi gammel Halm, ja undertiden halmet Heftegjødning derover igjen; men der maa pasfes paa, naar Frosten tager af, da at kaste Gjødningen og Halmen bort, da ellers Koerne varmes, spire og let raadne. Kaalen tage vi fra Stedet, hvor de vore og kaste for Køerne; disse og Blade pleie at vare til 2 Foder daglig for Køerne indtil Nytaar, og da begyndes først med Koerne og gives da 2 til 3 Skp. daglig til hver Ko, hvilke dog ikke erstatte Kaalen og Toppen. 1862 kostede hver Td. Land 8 Rd. for Saaening, Udthjyding og Lugning. Optagningen og Topastfjerselen sfeer i Accord og koster 3 Rd. pr. Td. Land.

Koerne opfodres hele som de ere vorede (raae); jeg kan ikke sige, hvad Priis de bør sættes til — vel 10 Tdr. Koer liig 1 Td. Byg; — dog vil Melken blive mindre, dersom jeg giver 1 Td. Byg for hver 10 Tdr. Koer nu. Koen giver en deilig Gjødning; ogsaa mener jeg, at Koemarken bliver lige saa godt renset som en Brakmark; efter Koer har jeg ikke hørt under 18 Tdr. 2rad Byg pr. Td. Land og undertiden 22 Tdr. Jeg finder, at Jorden efter Koer stedsfe viser sig mere porøs, reen og givtig, end efter enhver anden Afgrøde.