

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøjskolen og Landhusholdningssekskabets Stationer i Maanederne Novbr., Decbr. 1862 og Jan. 1863.

November 1862.

| | Middelvarme (C°) | Varmeste Dag | | Koldeste Dag | | Luftens Middel- tryk | Regnhøide i Linier | Regndagenes Antal | Luftens Middel- Fugtighedsgrad R. 2 i pSt. |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | Dag | Varme | Dag | Varme | | | | |
| Landbohøjskolen | 3,9 | 1ste | 8,8 | 21de | ÷7,0 | 28"1,85 | 14,18 | 13 | 88 |
| Hindholm ved Nestved . . . | 3,3 | 3die | 8,3 | 21de | ÷6,3 | | 14,86 | 15 | 90 |
| Næsgaard ved Stubbejøbing | 4,0 | 1ste | 9,8 | 22de | ÷3,8 | 28"1,28 | 10,86 | 12 | 88 |
| Smidstrup ved Hjørring . . | 3,8 | 2den | 8,3 | 22de | ÷9,4 | | 27,37 | 17 | 92 |
| Viborg | 3,8 | 1ste | 8,8 | 24de | ÷3,2 | | 16,30 | 21 | 85 |
| Tarum ved Varde | 3,4 | 1ste | 8,7 | 24de | ÷5,9 | | 21,75 | 17 | 93 |
| Silkeborg . . . | 3,8 | 3die | 8,7 | 24de | ÷3,3 | | 22,63 | 19 | 90 |
| Skaarunggaard ved Aarhus | 3,7 | 3die | 8,3 | 21de | ÷3,1 | 27"10,39 | 27,25 | 22 | 91 |
| Maibølgaard ved Sønderborg. | 4,1 | 3die | 8,3 | 21de | ÷1,8 | | 21,47 | 17 | — |

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 21de med $\div 9,4^{\circ}$ C. Paa Smidstrup var Varmen den 22de Kl. 10 Aften kun $\div 12,6^{\circ}$.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i November Maaned er $3,8^{\circ}$ C., hvilket er $0,1^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelvarme efter 72 Aars Jagttagelser; men derimod $0,1^{\circ}$ høiere end ifjor paa de samme Stationer.

De østlige Vinde have været stærkt fremherskende, — paa Derne navnlig de sydpøstlige. Af de 90 Gange, Vindretningen i November er noteret paa Landbohøjskolen, har den saaledes de 64 Gange været *DSV*.

December 1862.

| | Middelvarme (C°) | Varmeste Dag | | Køleste Dag | | Luftens Middel- tryk | Regnhøide i Linier | Regndagens Antal |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Dag | Varme | Dag | Varme | | | |
| Landbohøjskolen | 0,8 | 28de | 4,5 | 10de | ÷5,8 | 28" 0,27 | 31,04 | 14 |
| Hindholm | 0,7 | 30te | 4,6 | 5te | ÷4,2 | | 34,87 | 18 |
| Næsgaard | 0,9 | 28de | 5,4 | 10de | ÷8,9 | 28" 0,29 | 32,88 | 16 |
| Smidstrup | 1,7 | 28de | 5,9 | 11te | ÷4,1 | | 25,18 | 11 |
| Biborg | 1,2 | 25de | 5,0 | 10de | ÷5,4 | | 24,55 | 19 |
| Larum | 1,6 | 28de | 5,7 | 5te | ÷4,4 | | 39,10 | 18 |
| Silkeborg | 1,4 | 28de | 6,0 | 10de | ÷5,3 | | 42,13 | 19 |
| Skaarupgaard | 1,1 | 28de | 5,7 | 10de | ÷5,3 | 27" 8,79 | 30,18 | 20 |
| Maibølgaard | 2,0 | 28de | 6,0 | 10de | ÷2,5 | | 36,59 | 17 |

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 10de med $\div 8,2^{\circ}$ C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i December har været $1,26^{\circ}$ C., hvilket er $0,35^{\circ}$ høiere end Rjøbenhavns Middelvarme i December efter 72 Aars Sagttagelser, men derimod $1,0^{\circ}$ lavere end ifjor paa de samme Steder. Sylland har iaar havt $0,73^{\circ}$ varmere end Derne. Slutningen af Maanedens var langt varmere end Begyndelsen.

Regnmængden har været stor i December; i Gjennemsnit af de 9 Steders Sagttagelser 33 Linier eller mere end det Dobbelte af Rjøbenhavns Middelregnmængde for December; men denne store Regnmængde er mere fremkommet ved de hyppige Regn- og Sneedage (i Gjennemsnit 17) end ved stærke Regnskyl.

Den 20de Decbr. om Middagen viste Barometret kun mellem 9 og 10 Linier over 26 Tommer paa Landbohøjskolen

og Næsgaard. Derimod var det lavest om Morgenens paa Skaarupgaard og stod da kun 6 Linier over 26 Tommer; (NB. Skaarupgaard ligger temmelig høit). Vinden var paa de 2 førstnævnte Steder d. 20de sydvestlig, paa Skaarupgaard derimod vestlig med en Streg til Nord.

Den 9de og 10de blæste en stærk Østenstorm, den 20de og 27de en stærk Vestenstorm.

Januar 1863.

| | Middelvarme (C°) | Varmeste Dag | | Kuldeste Dag | | Luftens Middel- tryk | Regnhøide i Linier | Regndagens Antal |
|------------------|---------------------|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Dag | Varme | Dag | Varme | | | |
| Kandbohøjskolen | 2,9 | 23de | 6,6 | 18de | ÷0,2 | 27" 10,04 | 19,13 | 13 |
| Hindholm . . . | 2,8 | 30te | 5,7 | 16de | 0,3 | | 16,69 | 16 |
| Næsgaard . . . | 2,9 | 23de | 6,8 | 18de | 0,0 | 27" 10,11 | 17,48 | 15 |
| Smidstrup . . . | 3,2 | 30te | 6,7 | 14de & 18de | 0,7 | | 18,74 | 19 |
| Viborg | 3,1 | 30te | 6,6 | 19de | ÷0,3 | | 31,11 | 27 |
| Larum | 3,5 | 30te | 6,7 | 14de | 0,7 | | 39,18 | 24 |
| Silkeborg . . . | 3,3 | 30te | 6,7 | 18de | 0,4 | | 30,84 | 17 |
| Skaarupgaard . | 2,8 | 30te | 6,4 | 18de | ÷0,7 | 27" 6,26 | 16,92 | 21 |
| Maibølgaard . | 3,4 | 23de | 6,3 | 18de | 0,3 | | 26,92 | 20 |

Den laveste Varmegrad paa Kandbohøjskolen havde den 20de med $\div 1,2^{\circ}$ C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i Januar har været $3,09^{\circ}$ C., hvilket er $4,34^{\circ}$ højere end Rjøbenhavns Middelvarme efter 72 Mars Jagttagelser, og $5,43^{\circ}$ højere end Middeltallet af de to foregaaende Mars Veiriagttagelser paa de samme Steder. Den højeste Middelvarme i Rjøbenhavn for Januar i Løbet af de 72 Mar naaedes 1824 med $3,08^{\circ}$. Sjælland har iaar havt $0,40^{\circ}$ varmere end Døerne.

Regnhøiden paa Døerne har ikke naaet det Almindelige for Rjøbenhavn ($20,60$ Linier), i Sjælland har den derimod været betydelig større.

Luftrykket var d. 19de og 20de overordentlig ringe; mindst d. 20de Kl. 2 Middag. og var da paa Landbohøjskolen kun 26"6,04" og paa Staarupgaard kun 26"2,39".

Anm. Maanedens saube Middelværme bliver paa Landbohøjskolen bestemt ved Jagttager Kl. 7, 12 og 11; sammesteds ligesom paa alle de andre Stationer bliver Varmen ogsaa iagttaget Kl. 8, 2 og 10. Forskjellen paa Landbohøjskolen mellem de 2 Jagttageresystemer bliver brugt som Rettelset for de andre Stationers Vedkommende. Den under varmeste og koldeste Dag opførte Middelværme er derimod Middeltallet af Jagttagerne Kl. 8, 2 og 10 uden Rettelset. — Luftrykket bliver bestemt som Middeltal af Jagttagerne Kl. 8, 2 og 10.

Regnhøide i Skovegne

fra 1ste til 15de November.

a. Silkeborg—Frysenborg:

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| Gludsted | 10,11 | Linier. |
| Guldborhoved . . . | 13,30 | " |
| Rødbæk (Skov) . . . | 12,50 | " |
| Grønbæk | 12,50 | " |
| Kalbysgaard | 13,27 | " |
| Kraghslund (Skov) | 11,93 | " |

b. Frederiksdal ved Fursøen:

| | | |
|----------------------|------|---------|
| Smørum | 8,28 | Linier. |
| Store Harekølv . . . | 9,17 | " |
| Humletofte | 7,50 | " |

Anm. Da der ingen Sneemaalere findes paa disse Stationer, kan Nedslaget ikke med Sikkerhed ventes bestemt i Vintermaanederne fra 1ste Decbr. til 1ste Marts. Saar have imidlertid enkelte Stationer paa Grund af den sneefrie Vinter indsendt Beretninger om Regnmængden baade i Decbr. og Januar.