

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøjskolen og Landhusholdningsforeningens Stationer i Maanederne Marts og April 1863.

Marts 1863.

	Middelvarme (60)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regnbagens Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad N. 2 i pGt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	2,3	23de	8,0	9de	÷ 3,1	27"11,23	22,63	17	84
Hindholm ved Nestved . . .	2,3	24de	6,8	9de	÷ 4,3		19,90	13	86
Næsgaard ved Stubbejøbing	2,5	24de	7,5	9de	÷ 2,3	27"11,10	20,08	15	85
Smidstrup ved Hjørring . .	2,0	23de	6,3	9de	÷ 5,1		7,45		
Biborg	2,2	23de	7,6	9de	÷ 4,0		15,30	22	82
Larum ved Varde	2,2	23de	7,3	9de	÷ 4,2		18,04	14	90
Silkeborg . . .	2,1	23de	8,1	9de	÷ 4,3		42,02	17	85
Skaarupgaard ved Aarhus	1,7	23de	7,9	9de	÷ 4,5	27"8,22	22,12	20	85
Maihofgaard ved Sønderborg.	2,8	23de	7,0	9de	÷ 1,9		21,98	18	87

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 9de med ÷ 5,4° C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i Marts har været 2,23° C., hvilket er 1,30° højere end Kjøbenhavns Middelvarme efter 72 Mars Jagttagelser og 0,66° C. højere end Middeltallet af de 2 foregaaende Mars Varmejagttagelser paa de samme Steder.

April 1863.

	Middelvarme ($^{\circ}$)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regndagenes Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad R. 2 i pSt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	6,4	7&21	10,0	1 & 2	3,5	28" 0,54	21,41	11	76
Hindholt . . .	6,9	7de	11,2	1ste	3,7		19,04	15	71
Næsgaard . . .	6,2	7de	11,6	1ste	3,0	28" 0,38	11,99	12	76
Smidstrup . . .	6,3	15de	9,9	1&24	4,9		20,56	6	72
Viborg	6,6	20de	11,2	1ste	4,3		15,18	18	66
Larum	6,4	15de	11,0	1ste	2,9		14,78	12	76
Silkeborg . . .	6,5	20de	10,8	1ste	3,8		23,20	19	70
Skaarupgaard .	5,7	20de	10,4	1ste	3,1	27" 9,17	21,24	18	74
Maihelgaard .	6,5	20de	11,2	2den	3,5		14,69	14	69

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 1ste med $\div 2,4^{\circ}$ C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i April Maaned har været $6,38^{\circ}$ C., hvilket er $0,82^{\circ}$ høiere end Kjøbenhavns Middelvarme efter 72 Aars Jagttagelser og $1,29^{\circ}$ høiere end Middeltallet af de 2 foregaaende Aars Varme-
iagttagelser paa de samme Steder.

Regnhøide i Skovegne i Marts og April 1863.

a. Silkeborg—Frynsenborg:

	Marts	April
Guldsted	10,77 Linier.	20,18 Linier.
Guldforhoved . . .	" "	47,52 "
Rødbæk (Skov) . . .	12,96 "	21,46 "
Grønbæk	10,46 "	21,62 "
Kalbhygaard . . .	14,09 "	15,56 "
Kraghlund (Skov) .	15,05 "	25,35 "

b. Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	" Linier.	25,41 "
Store Hareklov . . .	18,50 "	22,00 "
Humletofte	23,50 "	20,94 "