

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøjskolen og Landhuusholdningssekskole Stationer i Maanederne Mai og Juni 1863.

Mai 1863.

	Middelvarme (Go)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Finter	Regndagenes Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad R. 2 i pG.
		Dag	Varmer	Dag	Varmer				
Landbohøjskolen	10,2	18de	15,8	1fte	6,8	28°0,97	11,28	9	67
Hindholm ved Nestvet . . .	10,7	17de	16,1	27de	8,3		10,38	8	60
Næsgaard ved Stubbejøbing	10,4	18de	16,4	1fte	6,3	28°1,04	9,25	8	64
Smidstrup ved Hjørring . .	8,5	17de	12,0	5te	6,1		21,40	8	71
Viborg	9,6	10de	14,8	1fte	6,3		15,93	16	61
Larum ved Varde	9,0	10de	14,0	1fte	5,9		19,42	10	75
Silkeborg . . .	9,2	17de	13,6	1fte	6,5		12,38	15	63
Skaarupgaard ved Narhuus	9,0	17de	13,0	1fte	6,5	27°9,77	13,02	14	61
Malbølgaard ved Sønderborg.	10,6	17de	14,9	2den	7,7		9,20	8	53

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 2den Mai med 1,4° C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarmer i Mai har været 9,67° C., hvilket er 1,29° lavere end Kjøbenhavns Middelvarmer efter 72 Aars Jagttagelser og 0,09° C. lavere end Middeltallet af de 2 foregaaende Aars Varmejagttagelser paa de samme Steder.

Mai Maaned har for Dernes Vedkommende været temmelig tør; i Sylland er derimod omtrent falden ligesaa megen Regn som sædvanligt.

Juni 1863.

	Middelvarme ($^{\circ}$)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- truf	Regnhøide i Linier	Regndagenes Antal	LuftensMiddel- Fugtighedsgrad Rl. 2 i pGt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	15,4	25de	21,9	1 & 5	11,1	28" 0,20	27,50	12	61
Hindholm . . .	15,1	25de	22,3	5te	10,7		25,99	12	64
Næsgaard . . .	14,6	25de	22,1	1ste	10,0	28" 0,13	31,55	15	72
Smidstrup . . .	13,9	19de	17,6	6te	10,7		42,03	12	69
Viborg.	14,9	21de	21,3	5te	9,6		45,78	13	59
Tarum	14,2	21de	19,3	5te	10,1		25,72	13	69
Silleborg . . .	14,1	21de	18,4	5te	9,9		26,86	13	61
Skaarupgaard .	13,8	25de	17,8	5te	10,5	27" 9,12	39,57	17	70
Maihølggaard .	14,3	25de	20,7	5te	10,1		28,72	13	66

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 1ste med $3,8^{\circ}$ C.

Middeltallet af de ovennævnte 9 Steders Middelvarme i Juni Maaned har været $14,47^{\circ}$ C., hvilket er $0,97^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavn's Middelvarme efter 72 Aars Jagttagelser, men $0,26^{\circ}$ varmere end Middeltallet af de 2 foregaaende Aars Varme-
iagttagelser paa de samme Steder.

Skjøndt Regndagenes Antal ikke synderligt har overstrebet det Normale, har Regnhøiden dog været usædvanlig stor, hidrørende fra de stærke Tordenbyger, hvorpaa Juni Maaned har været saa rig; stærkest vare de, der faldt ved Viborg d. 14de (14,32 Linier), ved Landbohøjskolen d. 12te (12,88 Linier) og ved Smidstrup og Tarum d. 25de om Formiddagen (begge Steder 10,11 Linier).

Anm. Maanedens fande Middelvarme bliver paa Landbohøjskolen bestemt ved Jagttagelser Rl. 7, 12 og 11; samme-
steds ligesom paa alle de andre Stationer bliver Varmen ogsaa iagttaget Rl. 8, 2 og 10. Forskjellen paa Landbohøjskolen

mellem de 2 Jagttagelsesystemer bliver brugt som Rettelse for de andre Stationers Vedkommende. Den under varmeste og koldeste Dag opførte Middelværme er derimod Middeltallet af Jagttagelserne Kl. 8, 2 og 10 uden Rettelse. — Lufttrykket bliver bestemt som Middeltal af Jagttagelserne Kl. 8, 2 og 10.

Regnhøide i Skovegne

i Mai og Juni 1863.

a. Silkeborg—Frønsborg:

	Mai	Juni
Gludsted	17,66 Linier.	23,72 Linier.
Guldførhøved . .	19,51 "	27,64 "
Rødbæk (Skov) .	16,75 "	36,75 "
Grønbæk	13,77 "	31,37 "
Kalbysgaard . . .	13,26 "	30,51 "
Kraghlund (Skov)	15,07 "	32,30 "

b. Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	10,27 Linier.	49,17 "
Store Harekølv .	9,75 "	29,17 "
Humletofte . . .	13,17 "	45,00 "
