

## Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøjskolen og Landhuusholdningssekskabets Stationer i Maanederne Marts, April og Mai 1864.

Marts 1864.

	Middelvarme (6°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regnagens Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad Sl. 2 i pSt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	1,57	24de	6,03	22de	÷-1,03	27"9,76	21,41	14	82
Hindholm ved Nestved . . .	1,85	26de	6,07	2den	÷-0,20		19,84	14	79
Næsgaard ved Stubbekjøbing	1,93	7de	6,00	2den	÷-0,13	27"9,85	25,04	12	82
Smidstrup ved Hjørring . .	0,36	24de	4,53	5te	÷-5,20		22,32	7	80
Larum ved Varde	1,33	26de	5,80	10de	÷-0,53		15,23	10	84
Skaarupgaard ved Aarhus	0,94	26de	5,43	10de	÷-1,73	27"6,29	20,84	15	81
Maiholgaard ved Sønderborg .	2,21	24de	6,23	10de	÷-0,43		19,95	15	75
Biborg . . . . .	1,35	14de	3,90	9de & 10de	÷-0,40		13,33	16	76
Silkeborg . . .	1,40	26de	6,59	10de	÷-1,04		25,03	15	78

Den laveste Varmegrad havde paa Landbohøjskolen den 17de med ÷ 5,5° C.

Middeltallet af ovennævnte 9 Stationer har været 1,44°, hvilket er 0,51° høiere end Kjøbenhavns Middelvarme for Marts efter 72 Aars Jagttagelser, og 0,35° lavere end Middeltallet af de 3 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer.

## April 1864.

	Middelvarme (G°)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regnøgenes Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad Sl. 2 i pGt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	4,64	26de	11,0	5te	÷2,1	27" 11,59	6,87	8	65
Hindholm . . .	5,20	26de	12,73	5te	÷1,53		9,67	8	62
Næsgaard . . .	4,37	26de	8,97	7de	÷1,57	28" 1,44	9,81	11	72
Smidstrup . . .	4,94	20de	12,47	5te	÷1,13		9,15	4	68
Larum . . . . .	5,42	20de	12,27	5te	÷0,87		10,73	9	75
Skaarupgaard .	4,81	27de	10,80	5te	÷2,17	27" 10,59	5,47	7	62
Maiibølgaard .	5,21	26de	11,10	7de	÷0,87		9,39	9	65
Viborg . . . . .	6,55	20de	13,48	7de	÷0,37		0,87	4	55
Silleborg . . .	5,44	20de	13,73	5te	÷1,00		4,58	9	57

Den laveste Varmegrad havde paa Landbohøjskolen den 5te med  $\div 3,5^{\circ}$  C.

Middeltallet af ovennævnte 9 Stationer har været  $5,17^{\circ}$ , hvilket er  $0,39^{\circ}$  lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for April efter 72 Aars Sagttagelser og  $0,35^{\circ}$  lavere end Middeltallet af de 3 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selskabets Stationer.

## Mai 1864.

	Middelvarme (G°)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regnøgenes Antal	Luftens Middel- Fugtighedsgrad Sl. 2 i pGt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	8,13	18de	15,97	3die	2,13	28" 1,03	12,73	10	62
Hindholm . . .	8,36	18de	17,07	3die	1,87		19,38	9	57
Næsgaard . . .	7,67	18de	16,67	4de	2,53	28" 0,85	17,23	9	68
Smidstrup . . .	7,89	13de	13,93	3die	1,47		10,02	6	57
Larum . . . . .	8,07	18de	14,67	3die	2,73		18,18	10	69
Skaarupgaard .	7,69	18de	14,60	3die	2,10	27" 9,88	8,08	9	54
Maiibølgaard .	7,62	17de	13,50	4de	3,23		17,81	10	59
Viborg . . . . .	10,45	17de	16,60	31te	6,32		6,24	7	43
Silleborg . . .	8,26	18de	15,32	3die	2,49		16,53	9	55

Den laveste Varmegrad havde paa Landbohøjskolen den 2den Mai med  $\div 3,5^{\circ}$  C.

Middeltallet af ovennævnte 9 Stationer har været  $8,23^{\circ}$ , hvilket er  $2,73^{\circ}$  lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for Mai efter 72 Mars Jagttagelser og  $1,5^{\circ}$  lavere end Middeltallet af de 3 foregaaende Mars Jagttagelser paa Selskabets Stationer.

Anm. Maanedens sande Middelvarme bliver paa Landbohøjskolen bestemt ved Jagttagelser Nr. 7, 12 og 11; sammesteds bliver ligesom paa alle de andre Stationer Varmen ogsaa iagttaget Nr. 8, 2 og 10. Forskjellen paa Landbohøjskolen mellem de 2 Jagttagelsessystemer bliver brugt som Rettelset for de andre Stationers Vedkommende. Den under varmeste og koldeste Dag opførte Middelvarme er derimod Middeltallet af Jagttagelser Nr. 8, 2 og 10 uden Rettelset. — Lufttrykket bliver bestemt som Middeltal af Jagttagelserne Nr. 8, 2 og 10.

### Regnmængden i Skovegne i April og Mai 1864.

a. Silkeborg—Frijsenborg:	April.	Mai.
Guldborhoved . . . . .	17,01 Linier	16,03 Linier
Rødbæk (Skov) . . . . .	6,40 "	15,79 "
Grønbæk . . . . .	3,33 "	10,38 "
Kalbhygaard . . . . .	5,08 "	17,38 "
Kraghlund (Skov) . . . . .	5,41 "	14,04 "
b. Frederiksdal ved Fursøen:		
Smørum . . . . .	4,00 "	13,20 "
Haretkov . . . . .	8,25 "	16,00 "
Humletofte . . . . .	5,00 "	16,58 "
c. Samsø, Ørnfund . . . . .	10,05 "	16,67 "

Anm. Paa Grund af Fjendtlighederne ere Beretningerne over Veirforholdene i Juni Maaned endnu ikke indtrufne fra Sylland.