

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøiskolen og Landhuusholdningssekselskabets Stationer i Maanederne April, Mai, Juni og Juli 1865.

April 1865.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnsøide i Tønder	Regnbagens Antal	Luftens Mid- delfugtigheds- grad Sl. 2 i p C.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøiskolen	5,57	25de	11,58	1ste	0,98	28"2,95	3,23	5	70
Hindholm ved Næstved . . .	6,23	23de	12,60	2den	0,87		3,00	1	66
Næsgaard ved Stubbeljøbing	5,24	25de	11,93	4de	0,43	28"2,81	2,11	6	77
Smidstrup ved Hjørring . .	5,31	24de	11,67	3die	1,27		5,98	4	83
Tarm ved Varde	5,67	22de	13,07	4de	0,53		1,08	2	76
Skaarupgaard ved Aarhus	5,46	23de	11,73	2den	0,80	27"11,72	1,87	3	68
Maiølsgaard ved Sønderborg.	6,42	25de	13,47	3die	0,33		0,42	3	76
Viborg	6,45	23de	14,00	1ste & 3die	0,93		0,95	3	64
Silkeborg . . .	6,16	23de	12,88	3die	1,45		2,00	3	66

Den laveste Varmegrad paa Landbohøiskolen habdes den 5te med $\div 2,35^{\circ}$ C.

Middelvarmen af ovennævnte 9 Stationer har været $5,83^{\circ}$ C., hvilket er $0,27^{\circ}$ C. høiere end Kjøbenhavns Middelvarme for April Maaned efter 72 Aars Jagttagelser og $0,39^{\circ}$ C. høiere end Middelvarmen af de 4 foregaaende Aars Jagttagelser ved Selskabets Stationer.

Maanedens har været usædvanlig tør, idet Middelregnmængden for alle Stationer kun er $\frac{1}{8}$ af hvad der pleier at falde i Kjøbenhavn i April Maaned.

M ai 1865.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel= tryk	Regnhøide i Fimier	Regndagenes Antal	Luftens Mib= belligtigbeds= grad af. 2 i p. C.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	12,96	22de	20,62	1ste	5,92	28"1,28	7,12	8	57
Hindholm . . .	13,65	25de	21,27	1ste	6,07		8,28	5	55
Næsgaard . . .	12,42	28de	18,50	1ste	5,97	28"1,05	4,93	7	66
Smidstrup . . .	12,07	25de	20,47	1ste	6,20		19,58	10	77
Larm	12,34	22de	20,60	1ste	6,13		24,37	9	70
Skaarupgaard .	12,00	25de	20,27	1ste	6,73	27"9,83	14,24	11	68
M. ibølgaard . .	12,88	23de	20,00	1ste	6,13		9,78	9	58
Viborg	11,36	24de	21,47	1ste	6,67		10,30	13	64
Silkeborg . . .	12,69	24de	22,33	7de	6,83		21,80	10	63

Den laveste Varmegr. havde paa Landboh. d. 1. med $\div 3,35^{\circ}$ C.

Middelvarmen af ovennævnte 9 Stationer har været $12,49^{\circ}$ C., hvilket er $1,53^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for Mai Maaned efter 72 Mars Jagttagelser og $3,12^{\circ}$ højere end Middelvarmen af de 4 foregaaende Mars Jagttagelser ved Selskabet's Stationer.

Maanedens har saaledes været særdeles varm og for Dernes Vedkommende meget tør, da der paa disse neppes er falden halvsaamegen Regn som sædvanligt.

Juni 1865.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel= tryk	Regnhøide i Fimier	Regndagenes Antal	Luftens Mib= belligtigbeds= grad af. 2 i p. C.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	12,69	23de	17,72	1ste	8,65	28"1,66	13,45	10	56
Hindholm . . .	12,74	23de	17,47	1ste	8,87		8,13	3	57
Næsgaard . . .	13,09	21de	17,33	1ste	9,67	28"1,60	16,90	5	61
Smidstrup . . .	12,51	22de	16,67	1ste	8,33		3,22	2	74
Larm	11,92	22de	16,80	1ste	7,20		9,86	4	72
Skaarupgaard .	12,03	23de	18,80	1ste	7,60	27"10,84	8,53	8	59
M. ibølgaard . .	13,00	16de	16,90	3de	9,40		17,96	6	53
Viborg	12,74	22de	18,40	1ste	8,20		1,38	6	66
Silkeborg . . .	12,34	23de	18,48	1ste	7,48		5,93	7	53

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 2den med $\div 0,35^{\circ}$ C.

Middelvarmen af ovennævnte 9 Stationer har været $12,56^{\circ}$ C., hvilket er $2,88^{\circ}$ C. lavere end Rjøbenhavns Middelvarme for Juni Maaned efter 72 Aars Jagttagelser og $1,47^{\circ}$ C. lavere end Middelvarmen af de 4 foregaaende Aars Jagttagelser ved Selskabets Stationer.

Maaneden har saaledes været meget kold og usædvanlig tør, idet Middelregnmængden for alle Stationer har været omtrent $\frac{1}{3}$ af den sædvanlige for Juni Maaned ($25,2$.) Jylland har for sit Vedkommende neppe havt $\frac{1}{4}$ af den sædvanlige Regnmængde.

Juli 1865.

	Middelvarme ($^{\circ}$)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regndagene's Antal	Luftens Middel- bøfugtigheds- grad $\&L 2$ i pCt.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	17,89	22de	25,28	12te	12,05	28" 0,54	25,11	14	59
Hindholm . . .	18,27	22de	26,40	12te	13,60		29,17	10	62
Næsgaard . . .	17,55	20de	23,53	12te	12,23	28" 0,38	34,82	13	72
Smidstrup . . .	15,86	22de	23,33	10de	12,27		24,42	8	80
Larm	15,81	22de	22,93	10de	12,20		31,53	13	75
Staarupgaard .	16,13	16de	23,47	12te	11,97	27" 9,27	18,79	14	67
Malsgaard . . .	17,95	22de	24,37	3die	12,87		9,70	6	54
Biborg	15,97	16de	23,27	12te	12,20		34,87	14	58
Silleborg . . .	16,42	16de	24,84	30te	11,88		33,54	13	63

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 31te med $7,95^{\circ}$ C.

Middelvarmen af ovennævnte 9 Stationer har været $16,87^{\circ}$ C., hvilket er $0,47^{\circ}$ C. lavere end Rjøbenhavns Middelvarme for Juli Maaned efter 72 Aars Jagttagelser, og $1,93^{\circ}$ C. høiere end Middelvarmen af de 4 foregaaende Aars Jagttagelser ved Selskabets Stationer.

Maaneden har saaledes noget nær havt samme Middelvarme som efter 72 Aars Jagttagelser og hidrører Afvigelsen fra

de jydste Stationer, hvis Middelværme har været 16,04 eller 1,30° C. for lav.

Maanedens Middeltregnmængde (26,88) har ligeledes med en ringe Afvigelse (0,52 Linier) naaet Middeltallet af 44 Aars Jagttagelser (27,4.)

En Station, Maibølgaard, har dog haft en usædvanlig ringe Regnmængde (9,70) eller kun c. $\frac{1}{3}$ à $\frac{1}{4}$ af Regnmængden paa enhver af de øvrige Stationer og $\frac{1}{3}$ af den sædvanlige for Juli Maaned.

Den største Regnmængde er falden i Viborg, Næsgaard og Silkeborg med omtrent 7 Linier mere end sædvanlig.

Anm. Maanedens samlede Middelværme bliver paa Landbohøjskolen bestemt ved Jagttagelser Kl. 7, 12 og 11; sammesteds ligesom paa alle de andre Stationer bliver Varmen ogsaa iagttaget Kl. 8, 2 og 10. Forskjellen paa Landbohøjskolen mellem de to Jagttagelsesrækker bliver brugt som Rettelsete for de andre Stationers Vedkommende. Den under varmeste og koldeste Dag opførte Middelværme er derimod Middeltallet af Jagttagelserne Kl. 8, 2 og 10 uden Rettelsete. — Lufttrykket bliver bestemt som Middeltal af Jagttagelserne Kl. 8, 2 og 10.

Regnhøide i Skovegne i April, Mai, Juni og Juli 1865.

a. Silkeborg—Frisenborg:

	April. Linier	Mai. Linier	Juni. Linier	Juli. Linier
Gludsted	1,88	18,78	6,63	30,68
Guldførhøved	"	20,46	3,97	28,88
Rødbæk (Skov)	0,00	22,17	5,44	33,58
Grønbæk	2,18	18,33	4,48	29,75
Kalbhygaard	1,00	20,96	5,00	29,83
Kraghlund (Skov)	2,95	20,84	5,16	28,73

b. Frederiksdal ved

Fursøen:

Smørum	2,58	6,96	5,98	22,12
Store Harrestov	"	6,92	14,13	25,67
Humletofte	"	5,61	11,53	"

c. Sam sø, Ornslund

	1,96	8,79	4,25	15,85
--	------	------	------	-------