

## Veirforholdene

i Marts og April Maaneder 1867 paa Landbohøjskolen  
og 8 af Landhusholdningssekskabets Stationer.

Marts 1867.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk.	Regnhøide i Linier.	Regn- og Sne- bagenes Antal	Luftens Mib- besigtigheds- grad St. 2 i p. C.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	÷1,35	28de	4,25	12te	÷9,62	28"0,21	7,22	15	—
Hindholm ved Næstved . .	÷0,78	27de	8,07	12te	÷9,07	—	8,73	5	—
Næsgaard ved Stubbeljøbing	÷0,68	26de	6,50	12te	÷7,67	27"11,78	8,87	10	—
Smidstrup ved Hjørring . .	÷1,72	27de	4,27	18de	÷9,80	—	33,08	10	—
Biborg . . . .	÷0,95	27de	6,60	12te	÷9,33	—	7,33	12	—
Larm v. Varde	÷1,09	26de	5,97	12te	÷9,87	—	8,65	5	—
Silleborg . . .	÷1,01	27de	7,37	12te	÷9,89	—	11,72	12	—
Staarupgaard ved Aarhus	÷1,69	27de	5,13	12te	÷10,47	—	—	—	—
Maibølgaard v. Sønderborg	÷0,40	27de	7,37	13de	÷6,90	—	9,51	14	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 171.

De skarpe Nordens- og Østenvinde, der med faa Dages Unbtagelser herskede fra den 6te til den 28de Marts, og som flere Gange gif over til at blive temmelig stærke Storme, gav Maaneden en Vinterkarakter, der ved et jevnligt og paa sine Steeder temmelig stærkt Snefald blev endnu mere fremtrædende. Kun d. 3die—5te og den sidste Uge af Maaneden var Varmen over Frysepunktet; flere Gange, som f. Ex. den 12te og 13de og d. 23de var Kulden endog meget stærk, og Thermometret sank til ÷12° à 13° C. Hele Maanedens Middelvarme for alle Stationerne har derfor været lav, nemlig ÷1,07°, hvilket er 2 Grader lavere end Kjøbenhavn's Middelvarme for Marts Maaned efter 72 Mars Jagttagelser og 1,84° C. lavere end Middelvarmen af de 6 foregaaende Mars Jagttagelser paa Sekskabets Stationer.

Naar unbtages Smidstrup, hvor Regn- og Snemængden naaede op til over 33 Linier, har den paa de andre Stationer kun været det Halve af den almindelige, der efter 44 Mars Jagttagelser i Kjøbenhavn beløber sig til 18,5 Linier. Derimod har der været større Ulighed i Nedslagenes Antal paa de enkelte Steeder, idet Hindholm og Larm kun har havt 5, Landbohøjskolen og Maibølgaard derimod 15 og 14 Sne- og Regndage.

April 1867.

	Middelvarme (°C)		Varmeste Dag		Koldbeste Dag		Luftens Middel= tryk	Regnhøide i Linier	Regnbagens Antal	Luftens Mid= befugtigheds= grad S. 1. 2 lip St.
	Dag	Varme	Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	4,35	21de	10,42	5te	1,28	27°8,89	33,63	20	82	
Hindholm . . .	4,91	24de	11,03	13de	1,73	—	35,11	21	83	
Næsgaard . . .	4,81	24de	11,47	5te	1,80	27°9,00	36,33	20	81	
Smidstrup . . .	3,66	20de	10,07	4de	0,40	—	33,70	12	85	
Viborg . . . . .	4,69	20de	10,27	11te	1,40	—	23,83	22	80	
Tarm . . . . .	4,67	20de	11,00	5te	2,37	—	44,60	20	83	
Silleborg . . .	4,59	20de	13,36	10de	1,19	—	26,49	15	77	
Slaarupgaard .	3,75	21de	9,43	5te	0,83	—	24,59	14	83	
Waibølgaard .	—	—	—	—	—	—	29,46	17	—	

April Maaned har gennemgaaende været kold og meget regnsfuld. — Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 6te med  $-4,35^{\circ}$  C. Middelvarmen af ovennævnte 8 Stationer har været  $4,43^{\circ}$  C., hvilket er  $1,13^{\circ}$  C. lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for April Maaned efter 72 Aars Jagttagelser og  $1,10^{\circ}$  C. lavere end Middelvarmen af de 6 foregaaende Aars Jagttagelser ved Selskabets Stationer.

Medens Maaneden for Kjøbenhavns Vedkommende pleier at bringe 17,4 Linier Regn i 11 Nedslagsdage (deraf 1 Sne dag), har den iaar som Middeltal af alle 21 Stationer givet 29,62 Linier Regn og Sne og paa de 9 Høvedstationer i Gjennemsnit 18 Nedslagsdage, hvoraf flere Sne dage. Navnlig ved Tarm har Regnmængden været meget stor, nemlig 44,60 Linier.

Flere Gange har der været meget stærke Storme og mindre Stormbyger ledsagede af Hagl. Under den stærke Storm d. 14de—17de fant Barometret meget lavt og naaede sit Laveste d. 15de om Morgenen, da det paa Landbohøjskolen viste  $26^{\circ}11,92$  og paa Næsgaard  $27^{\circ}0,78$ ; Stormcentret er altsaa passeret Nord for os, hvilket Vindens Dreining under Stormen ogsaa tydelig paaviser; den stod nemlig d. 14de i SØ, gik Sønden om, var d. 15de om Morgenen SV og holdt sig dernæst i V, medens den stærkeste Storm rasede, indtil den 16de om Aftenen, da den dreiede sig videre til NV og i Løbet af d. 17de om til N, hvorpaa Stormen lagde sig; det sidste af Stormhvirvlen havde da utvivlsomt passeret os, og Vinden forandrede sig nu ogsaa pludselig til S. En lignende om end ikke saa stærkt udpræget Uregelmæssighed viste Stormen d. 21de—23de. Begge disse Storme indtraf ved lav Barometerstand og medførte stærk Regn, navnlig den førstnævnte. Den østlige Storm d. 27de—29de indtraf derimod ved høj Barometerstand, holdt sig uforandret i næsten 3 Dage og bragte ingen Regn.

#### Regnhøide i Skovegne.

a) Silleborg-Frysensborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Gludsted . . . . . — Lin.	Smørum . . . . . 10,98 Lin.
Guldforskov . . . . . 31,17 "	St. Hareffov . . . . . 30,88 "
Rødbæl . . . . . 36,96 "	Humletofte . . . . . — "
Grønbæl . . . . . 25,15 "	Trøslund paa Samsø 24,81 "
Kalbygaard . . . . . 26,44 "	Taarnborg ved Korsør 22,02 "
Kraghslund . . . . . 27,83 "	Bukkehave N. p. Thorseng 29,03 "
	L. Kjøbelevgd. v. Raskov 36,48 "
	Lovijelyst ved Helsingør 32,46 "