

Veirforholdene

i Juli og August Maaneder 1867 paa Landbohøiskolen
og 22 af Landhusholdningsseksels Stationer.

Juli 1867.

	Middelvarme (C°)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- temp.	Regnhøide i Linier.	Regnagens Mængde.	Luftens Mib- besigtigelses- grad R. 21 p. C.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøiskolen	14,58	13de	19,38	7de	10,72	27"10,86	57,52	21	76
Hindholm ved Næstved . .	14,34	13de	19,40	7de	10,33	—	58,33	18	77
Næsgaard ved Stubbejøbing	14,22	12te	18,53	7de	10,80	27"10,89	57,32	22	80
Smidstrup ved Hjørring . .	14,38	13de	20,00	3die	10,87	—	48,52	12	82
Biborg	14,08	13de	20,33	7de	9,93	—	49,40	21	67
Larm v. Varde	13,85	13de	19,00	3die	10,07	—	46,80	15	75
Silleborg . . .	14,34	13de	20,06	3die	10,63	—	34,41	15	73
Staarupgaard ved Aarhus	13,49	12te	19,53	7de	10,07	—	34,15	16	74
Malbølgaard v. Sønderborg	14,36	13de	20,40	7de	11,13	—	46,57	23	79

Regnhøide i Skovegne.

a) Silleborg-Frysenborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørreflene 52,75 Lin.	Smørum 57,16 Lin.
Guldborhoved 38,36 "	St. Hareflov 53,71 "
Rødbæk 42,29 "	Humletofte 54,33 "
Grønbæk 38,12 "	Drøslund paa Samsø . 50,21 "
Kalbysgaard 37,57 "	Taarnborg ved Korsør . 45,48 "
Kraghslund 45,02 "	Bullehave M. p. Thorseng 56,93 "
	L. Kjøbelevgd. v. Næstved 51,79 "
	Lovisehøst ved Helsingør 51,97 "

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 171.

Den Varme, som havde indfundet sig i Slutningen af Juni, varede kun kort; allerede d. 28de begyndte det at blive kjendelig koldere, og hele Juli Maaned har, med Undtagelse af nogle faa Dage midt i Maaneden, været meget kold, nemlig i Gjennemsnit af de ovennævnte 9 Stationer kun 14,2° C., hvilket er 1,2° lavere end Juli-Middelvarme af de 6 foregaaende Mars Jagttagelser ved de samme Stationer, og 3,2° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme efter 72 Mars Jagttagelser. Den laveste Varmegrad paa Landbohøiskolen havde den 2den med 4,0° C.

SB-, B- og NB-Vindene have været stærkt fremherskende, og baade i Begyndelsen og Slutningen af Maaneden har Sjælland-Falster haft temmelig stærke Storme.

Spvad der foruden den lave Varmegrad især har gjort Veiret ugunstigt for Landbruget er den stærke og vedholdende Regn, der navnlig paa

Derne har besværliggjort Høsten overordentlig meget. Medens Juli Maaned kun pleier at bringe 27,4 Linier Regn, har den i Aar som Gjennemsnit af de ovennævnte 22 Stationer bragt 48 Linier; Derne have faaet mest, nemlig i Gjennemsnit 58 Linier, Sjælland derimod kun 43 Linier. Regnen er ofte falden som Byger, ledsaget af Torden, men ogsaa jævnlig som Landregn; fra d. 15de og til Maanedens Udgang faldt der næsten hver Dag Regn paa Derne, hvorimod der i Sjælland, navnlig i det østlige, havde flere mellemiggende Tørveirsdage, der gjorde det muligt at bjerge en Del af Høet. Af stærke Regnskov skulle vi nævne d. 6te paa Landbohøjskolen (9,3 Linier), Hindholm (12,0 L.) og Næsgaard (8,6 L.), d. 15de i Larm (13,4 L.), d. 24de paa Hindholm (9,5 L.) og Næsgaard (11,4 L.) og d. 27de i Smidstrup (9,6 L.)

August 1867.

	Middelvarme (C ^o)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regnbagens Antal	Luftens Mid- befugtigheds- grad p. l. 2 p. C ^t
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	15,80	20de	18,92	9de	13,78	28 ⁿ 1,16	8,10	10	72
Hindholm . . .	16,14	15de	19,73	28de	13,73	—	4,89	5	67
Næsgaard . . .	15,78	31te	19,00	7de	14,20	28 ⁿ 1,17	7,97	9	77
Smidstrup . . .	15,66	15de	19,60	9de	14,00	—	10,37	6	78
Biborg	14,92	15de	19,73	18de	12,67	—	25,06	10	63
Larm	15,31	15de	21,87	5te	12,73	—	11,04	6	71
Silleborg . . .	15,41	15de	20,88	9de	12,28	—	16,44	10	66
Staarupgaard .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Waibølgaard .	16,36	26de	21,13	8de	14,17	—	9,33	5	70

Regnhøide i Skovegne.

a) Silleborg-Frysenborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørresnebe 18,08 Lin.	Smørum 8,88 Lin.
Guldsforhoved . . . 12,56 "	St. Hareskov 8,79 "
Rødbøl 20,83 "	Humletofte 23,67 "
Grønåsk 15,33 "	Druslund paa Samsø 12,05 "
Kalbysgaard 16,08 "	Taarnborg ved Korsør 6,96 "
Kraghslund 16,83 "	Bullehave M. p. Thorsøng 7,70 "
	L. Kjøbelevgd. v. Næstov 2,93 "
	Lovisehøst ved Helsingør 13,18 "

Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 9de med 7,0^o C. Middelvarmen af ovennævnte 8 Stationer har været 15,7^o C., hvilket er 1,2^o lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for August Maaned efter 72 Aars Sagttagelser og 1,0^o højere end Middelvarmen af de 6 foregaaende Aars Sagttagelser ved Selskabets Stationer.

Medens Middelvarmen altsaa omtrent har været den almindelige, er der — til Gavn for Høsten — kun faldet meget lidt Regn, nemlig i Gjennemsnit af ovennævnte 21 Stationer 13,2 Linier eller over 16 Linier mindre end den almindelige Regnmængde for denne Maaned, som er 29,5 Linier; navnlig paa Derne har Regnmængden været meget ringe, i Gjennemsnit kun lidt over 9 Linier.

De vestlige Vinde have været stærkt fremherskende hele Maanedens.