

## Vejrforholdene

i Januar Maaned 1868 paa Landbohøjskolen og paa 10 af Landhusholdningsforeningens Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Køleste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- begenes Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bis- borg . . . . .	÷1,12	17de	5,20	23de	÷10,33	—	37,68	18
Tarm (Varde), ved Lærer Rasmussen . . .	÷0,51	17&31	5,27	23&24	÷ 6,73	—	34,25	15
Viborg ved Distrikts- læge Berg . . . . .	÷0,90	17&31	5,67	23de	÷ 7,27	—	18,23	17
Silkeborg ved Distrikts- læge Fibiger . . . . .	÷0,46	17de	5,99	23de	÷ 6,18	—	19,64	14
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen . . .	÷1,23	17de	5,23	23de	÷ 7,40	—	19,02	12
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt . . . . .	÷1,05	17de	4,80	24de	÷ 7,10	27" 9,33	27,53	15
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . . . .	÷0,65	17de	4,37	24de	÷ 6,50	—	22,09	16
Nyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen . . .	÷0,89	17de	5,20	24de	÷ 6,10	—	22,18	15
Sindholm (Næstved), ved Avlsbestyrer Sørensen . . . . .	÷1,06	17de	4,07	24de	÷ 8,20	—	21,69	6
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn) ved Assi- stent Greve . . . . .	÷1,29	31te	4,07	24de	÷10,63	27"11,90	12,36	17
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan . . .	÷0,58	17de	5,60	24de	÷ 8,80	27"11,89	24,12	14

Ved Marskiftet er der oprettet 5 nye Stationer ifølge velvilligt Tilbud fra d'Hr. Skolebestyrer Frederiksen i Gjerlev ved Randers, Læge Bay i Eskelund ved Skodborghus, Forstander Krarup paa Daugaard ved Veje, Lærer Jørgensen i Nyslinge ved Odense og Lærer Clausen i Sct. Nicolai paa Bornholm. Derimod maa Stationen paa Skaarupgaard, hvorfra der ingen Jagttagelser er modtaget i længere Tid, betragtes som ophørt.

Med Undtagelse af den 3die Uge og det sidste Par Dage af Januar stod Thermometret hele Maanedens under Frysepunktet og den 24de om Mor-

genen endog paa  $\div 13,6^{\circ}$  paa Landbohøjskolen, efter at en Storm fra *ND* havde blæst hele det foregaaende Døgn. Middelvarmen af ovennævnte 11 Stationer har været  $\div 0,89^{\circ}$  C., hvilket er  $0,3^{\circ}$  lavere end Januar-Middelvarmen af de 7 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og  $0,3^{\circ}$  højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser.

Den første Halvdel af Maaneden var tør; i den 3die Uge faldt megen Regn og i Slutningen af Maanedens lidt Regn og Sne. Maanedens hele Regn- og Snemængde afviger kun lidt fra det Almindelige; først var Regnmængden i det nordlige og vestlige Jylland; navnlig faldt en stærk Regn, 15,5 Linier, d. 31te paa Smidstrup.

En stor Mængde kortvarige, men heftige Storme ere dragne hen over os i Januar Maaned, og næsten altid med tilsvarende Fald af Barometerstanden; navnlig d. 19de og 20de var denne meget lav, lavest om Morgen d. 20de med 26" 10,53 paa Landbohøjskolen.

---