

## Veirforholdene

i Maj Maaned 1868 paa Landhusholdningssekskabets Stationer.

	Middelvarme. (°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad St. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg . . . . .	13,16	21de	20,87	6te	7,7	—	11,62	4	68
Tarm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	12,67	21de	19,60	5te	6,7	—	6,24	6	57
Biborg, ved Distrikts- læge Berg . . . . .	12,79	21de	19,53	7de	6,20	—	5,88	4	51
Silleborg, ved Di- striktslæge Fibiger .	12,55	21de	19,53	7de	5,29	—	4,96	5	51
Stelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	12,62	21de	19,73	5te	4,63	—	8,65	6	54
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	12,18	21de	18,93	6te	5,00	—	6,11	6	54
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt . . . . .	12,41	21de	19,27	5te	3,70	27" 11,39	4,83	8	56
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	13,08	14de	19,07	6te	7,07	—	6,17	6	58
Nyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	11,93	30te	19,00	6te	4,93	—	5,30	4	63
Hindholm (Næstved), ved Aulsbefyrer Sansen . . . . .	12,80	30te	19,50	6te	5,67	—	5,23	4	69
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Greve . . . . .	12,47	30te	18,20	6te	5,20	28" 1,91	3,30	9	56
Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Dver- lærer Jacoppidan .	12,14	30te	18,37	6te	7,00	28" 1,79	2,88	3	68
St. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen . . . . .	11,81	27de	17,93	6te	5,00	—	7,23	7	62

## Regnhøjde i Skovegnene.

a) Silleborg-Frynsborg:

Nørresnede . . . . .	3,23	Linier.
Guldforhoved . . . . .	4,21	—
Rødbæk . . . . .	5,77	—
Grønbæk . . . . .	5,92	—
Kalbysgaard . . . . .	4,13	—
Kraghslund . . . . .	5,00	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum . . . . .	3,18	Linier.
St. Hareskov . . . . .	3,42	—
Humletofte . . . . .	4,67	—

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samsø har været 5,22 Linier.

do.	„	Taarneborg ved Korsør . . . . .	4,64	—
do.	„	Bukkehave Mølle paa Thorseng . . . . .	5,43	—
do.	„	Lille Kjøbelengaard ved Raskov . . . . .	5,75	—
do.	„	Lovisehøst ved Helsingør . . . . .	5,18	—

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer har været 12,51° C., hvilket er 3,12° højere end Maj-Middelvarmen af de 7 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabet's Stationer og 1,6° højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 28de med 24,3° C.; Varmen sank ikke i Maj Maaned uuder Frysepunktet. Det var først fra d. 9de og 10de, at en for Maj Maaned høj Varme indfandt sig; indtil da var Vegetationen paa Grund af Kulden midt i April snarere forsinket end fremstødet i sin Udvikling, men i Løbet af nogle faa Dage indvandedes ikke blot hvad den var tidligere end i et almindeligt Aar, saa at Bøgen om-trent sprang ud d. 10de—11te, altsaa kun 1 à 2 Dage senere end den plejer, men Vegetationen tog efterhaanden et stærkt Fremspring for et almindeligt Aar, — Rugen stred saaledes allerede strax efter Maanedens Midte. Tillige har en ualmindelig Tørke, en klar Himmel, og en ringe Værling i Luftertrykket karakteriseret Maj Maaned iaar; kun d. 24de og 25de faldt der Regn (en Landregn) af nogen Betydning, og som Gjennem-snit af ovenstaaende 27 Stationer har hele Maanedens Regumængde kun været 5,3 Linier, medens den plejer at være 17,8 Linier; den var lidt større paa de jydskke Stationer, i Gjennemsnit 5,9 Linier, end paa Øerne i Gjennemsnit 4,8 Linier.

### Juni 1868.

	Middelvarme (C°).		Varmeste Dag.		Kuldeste Dag.		Luftens Middelt-tryk.	Regnhøide i Linier.	Regnbogens Antal.	Luftens Middelt-højhedsgræd i Ft. 2 i pGt.
	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	15,64	22de	23,33	8de	10,17	—	19,63	9	64	
Tarm . . . . .	15,24	22de	25,00	8de	10,93	—	6,81	6	56	
Viborg . . . . .	15,84	22de	24,60	8de	9,47	—	13,93	2	52	
Silleborg . . . .	14,97	22de	24,79	8de	10,19	—	14,40	6	56	
Effelund . . . . .	15,37	22de	24,80	8 & 9.	10,93	—	6,39	5	52	
Gjerlev . . . . .	14,87	21de	21,93	8de	9,37	—	8,98	3	50	
Daugaard . . . . .	15,45	22de	24,20	8de	10,87	27" 11,71	5,77	4	53	
Majbølgaard . . .	16,25	21de	21,73	8de	10,37	—	8,00	4	58	
Rønslinge . . . .	15,01	22de	23,07	8 & 9.	10,93	—	3,83	4	58	
Sindholm . . . . .	15,82	22de	23,20	8de	11,70	—	0,23	2	59	
Landbohøjskolen	16,01	22de	23,33	8de	12,47	28" 1,97	1,19	3	51	
Ræsgaard . . . . .	15,92	15de	21,40	8de	12,53	28" 1,93	7,77	6	64	
St. Nicolai . . . .	15,28	22de	22,07	9de	12,00	—	5,69	6	62	

## Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Rødbel . . . . . 24,83 Linier.	Smørum . . . . . 1,61 Linier.
Grønbeil . . . . . 12,61 —	St. Hareklov . . . . . 1,13 —
Kalbysgaard . . . . . 13,92 —	
Kraghslund . . . . . 8,18 —	

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været 9,01 Linier.

do. „ Taarnborg ved Korsør . . . . .	1,23 —
do. „ Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . . . .	5,51 —
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Nakstov . . . . .	3,87 —
do. „ Loviselyst ved Helsingør . . . . .	1,38 —

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer har været 15,51° C., hvilket er 1,56° højere end Juni-Middelvarmen af de 7 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selstabet's Stationer og lig med Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. — Højest Barmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 15de med 28,0° C.

Den stærke Varme, der begyndte i Maj Maaned, har altsaa ogsaa i Juni holdt sig betydeligt over denne Maaned's Middelvarme, og Regnen er falden endnu sparsommere end i hin Maaned. Middeltallet for samtlige 24 Stationer har nemlig kun været 7,75 Linier eller kun  $\frac{1}{3}$  af det for Juni almindelige, som er 25,2 Linier.

Middeltallet for Jyllands 11 Stationer har været 12,3 Linier med 5 Regndage, medens det for Verne's 13 Stationer kun har været 3,9 Linier med 4 Regndage.

De vestlige Vindretninger have været meget overvejende.

Den høje Varme og den ringe Regnmængde har fremkaldt en usædvanlig Tørke. — Den Regn, der er falden, skyldes væsentlig Dagene omkring den 8de og særlig omkring den 24de Juni. I de første er der paa de fleste Stationer, i de sidste paa alle Stationer, undtagen ved St. Nicolaj paa Bornholm, opsamlet Regn. Begge Regnsaldene bebudedes af en høj og derpaa faldende Barometerstand, saa at det laveste Lufttryk indtraf den 8de Juni, om Morgenen i Jylland, om Middagen paa Verne, samt den 22de om Aftenen i Jylland og paa Falster, den 23de om Morgenen ved Kjøbenhavn. Foruden Regnen iagttoges som sædvanlig ved de laveste Lufttryk en Drejning af Vinden fra SØ gennem S henimod N og især for det sidste lave Lufttryks Vedkommende en stærk Stigning og derpaa et pludseligt Fald af Thermometret.