

Vejrforholdene

i September Maaned 1868 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnsagens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pCt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	11,92	7de	18,20	27de	8,07	—	41,01	15	76
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	12,56	7de	19,27	14de	9,67	—	36,85	9	73
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	12,41	7de	19,20	13de	9,00	—	48,47	14	67
Silleborg, ved Di- striktslæge Fibiger .	12,31	7de	19,09	13de	9,86	—	38,93	13	70
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	12,70	7de	18,73	12te	9,47	—	24,57	8	„
Gjerlev (Manders), ved Lærer Frederiksen .	12,26	7de	19,13	13de	9,37	—	40,04	16	72
Daugaard (Vejlø), ved Landinspektør Lind- hardt	12,36	5te	18,20	13de	9,43	27" 9,59	23,77	14	73
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . . .	13,65	7de	19,47	14de & 16de	9,73	—	28,18	15	73
Nyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen .	13,01	7de	19,66	14de	9,37	—	37,08	16	74
Hindholm (Rastved), ved Avlsbestyrer Hansen	12,99	7de	18,93	14de	9,27	—	34,10	11	76
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Greve	12,76	6te	17,60	13de	8,83	27" 11,87	29,50	15	74
Rasgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	13,45	6te	18,67	13de	8,93	27" 11,75	36,60	11	77
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	13,34	8de	17,80	13de & 14de	9,67	—	27,73	16	76

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silleborg-Frysenborg:

Nørresnede	21,48	Linier
Guldfors hoved	48,29	—
Rødbæk	36,17	—
Grønbæk	30,02	—
Kalbysgaard	38,31	—
Kraghlund	30,56	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	40,06	Linier.
St. Hareskov	31,17	—
Humletofte	41,67	—

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samso har været 33,63 Linier.

do. paa Taarnborg ved Korsør 25,08 —

do. ved Buffehave Mølle 27,12 —

do. „ Lovisehøst ved Helsingør 44,64 —

3 September Maaned have Vejrforholdene ikke afvejet ret meget fra det almindelige. — Varmen, der som Gjennemsnit af alle Stationer har været $12,75^{\circ}\text{C}$., har saaledes kun været $0,24^{\circ}$ højere end Middelvarmen for September efter de 7 foregaaende Aar paa Selskabets Stationer; den var højest i det 2det Hæmdogn ($16-17^{\circ}$), hvorimod Midten af Maaneden var koldest. — Paa Landbohøjskolen havde den højeste Varmegrad d. 6te med $23,6^{\circ}\text{C}$.

Regnmængden har været lidt højere end almindelig. — Medens der er temmelig stor Forskjel mellem de enkelte Stationer, og medens navnlig det nordlige Jylland har haft en Del mere Regn end det sydlige, saa er Gjennemsnittet af Regnmængden paa Jyllands 13 og Dernes 13 Stationer dog omtrent det samme, nemlig 35,27 Linier paa de førstnævnte og 33,58 paa de sidstnævnte. — Det var navnlig den sidste halve Snes Dage af Maaneden, der bragte Regn, hvorimod den første Halvdel var temmelig tør; især faldt der d. 24de en ualmindelig stærk Regn paa alle de jydskke Stationer og Næsgaard, nemlig paa Smidstrup 8,57 Linier, Larm 15,83 L., Viborg 22,56 L., Effelund 11,34 L., Gjerlev 15,58 L., Daugaard 10,27 L., Majbølgaard 10,42 L. og Næsgaard 10,65 L.; ogsaa d. 21de havde Næsgaard en stærk Regn, 8,50 L., og Bornholm 11,59 L., og d. 20de faldt ved Ryslinge 13,70 Linier.

Oktober 1868.

	Middelvarme ($^{\circ}\text{C}$).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøjde i Linier.	Regnbogens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Sl. 2 i pgt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	7,01	7de	11,07	21de	3,13	—	42,86	23	79
Larm	7,38	7de	11,53	2den	4,73	—	64,44	17	81
Viborg	7,37	7de	12,87	27de	4,47	—	43,42	21	75
Effelund	7,36	7de	11,87	27de	4,30	—	55,65	21	79
Gjerlev	6,88	7de	11,27	26de	4,17	—	31,90	17	81
Daugaard	7,05	7de	11,60	26de	3,70	27" 9,42	43,79	22	85
Majbølgaard . . .	8,39	1ste	12,83	29de	5,13	—	29,40	16	90
Ryslinge	7,87	7de	12,27	27&30	5,00	—	29,64	20	84
Bindholt	7,59	1ste	11,60	28de	5,20	—	23,50	11	85
Landbohøjskolen	7,67	1ste	11,07	28de	4,03	27" 11,83	27,90	20	83
Næsgaard	8,30	1ste	12,87	20de	5,27	27" 11,97	33,72	11	84
Sct. Nicolai . . .	8,59	1ste	12,93	29de	6,00	—	36,74	19	86

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg=Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen
Nørresnede 39,03 Linier.	Smørum 19,46 Linier.
Guldforhoved 48,15 —	St. Hareffov . . . 20,92 —
Rødbæk 46,21 —	
Grønbæk 36,36 —	
Kalbygaard 50,56 —	
Kraghslund 30,37 —	

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været 25,17 Linier.

Do. paa Taarnborg ved Korsør 20,16 —

Do. ved Bukkehavn Mølle paa Thorseng . 23,21 —

Do. „ Lille Rjøbelevgaard ved Raskov . 27,31 —

Oktober Maaned begyndte og sluttede med kolde Dage, men iøvrigt afveg dens Varmeforhold ej synderlig fra de almindelige. Middelvarmen af de ovennævnte 12 Stationer har været 7,62°, medens den som Gjennemsnit af de foregaaende 7 Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer har været 8,27°. Den laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 29de med 0,8° C.

Sele Maaned, men dog især den sidste Halvdel af den, har været regnfuld, baade hvad Hyppigheden og Mængden af Regn angaaer; navnlig har Jylland faaet megen Regn, i Gjennemsnit af de 12 Stationer 44,4 Linier, medens Dernes 12 Stationer kun have faaet 26,4 L., og den almindelige Regnmængde for Oktober endog kun plejer at være 25,8 L.

Oktober havde jævnlig temmelig voldsomme om end kortvarige Storme. Den 25de Kl. 9 Form. viste Barometret paa Landbohøjskolen kun 27" 0,57.