

Vejrforholdene

i December Maaned 1868 paa Landhusholdningssektors Stationer.

	Middelbarne. (G ^o).	Barmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- dagenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pct.
		Dag.	Barne.	Dag.	Barne.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Wi- borg	1,33	6te	6,80	9de	÷ 4,93	—	46,75	21	95
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	2,57	5te	8,13	9de	÷ 5,00	—	42,03	21	94
Viborg, ved Distrikts- Læge Berg	2,11	5te	8,67	9de	÷ 4,47	—	37,29	19	79
Silkeborg	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Effelund (Stodborg- hus), ved Læge Bay	2,56	5te	8,20	9de	÷ 4,27	—	54,43	22	91
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	1,94	5te	8,87	9de	÷ 5,03	—	38,81	23	94
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt	2,48	5te	8,73	1fte	÷ 4,40	27" 6,30	58,22	19	95
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . .	3,41	6te	7,67	10de	÷ 1,30	—	72,08	22	"
Hjølslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	3,22	5te	9,50	9de	÷ 3,50	—	66,52	24	"
Hindholm (Næstved), ved Avlsbestyrer Hansen	2,39	5te	7,93	9de	÷ 3,93	—	59,46	22	94
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- rent Greve	2,49	5te	8,37	9de	÷ 3,77	27" 8,69	45,61	24	"
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	3,34	5te	9,33	9de	÷ 1,77	27" 8,77	71,48	21	92
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Claußen	2,46	6te	6,60	10de	÷ 3,00	—	47,52	28	95

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørrefjæde 40,88 Linier.	Smørum 47,76 Linier.
Guldfors hoved . . . 49,20 —	St. Hareftov . . . 45,75 —
Nødbæk 62,25 —	Humletofte 50,50 —
Grønbæk 36,44 —	
Kalbysgaard 57,04 —	
Kraghlund 47,84 —	

Regnhøjden ved Ørnslund paa Samø har været	46,63	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	49,29	—
do. ved Bulkehøve Mølle	71,39	—
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Ralskov .	73,57	—
do. „ Loviselyst ved Helsingør	47,83	—

Barmen iagttages daglig Kl. 8—2 og 10; Middeltallet af disse Jagttagelser giver ikke Døgnet's sande Mittelvarme; denne faaes derimod nogenlunde nøjagtig ved at tage Mittelværdien af Barmeagttagelse Kl. 7—12 og 11; paa Landbohøjskolen er Barmen iagttaget til alle disse 6 Klokketlet fra 1861—65; den Forskjel, som derved er fundet at være mellem Jagttagelserne Kl. 7—12—11 og Kl. 8—2—10, for hver enkelt af Aarets Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettelse for den tilsvarende Maaned's Jagttagelser.

Luftens Mitteltryk er bestemt ved Jagttagelser Kl. 8—2—10.

Med Undtagelse af d. 8de, 9de og 10de, da en stærk østlig Vind bragte Barmen nogle faa Grader under Frysepunktet, har Maaned'en været meget mild, nemlig i Gjennemsnit for ovennævnte 12 Stationer $2,53^{\circ}$ C, hvilket er $1,02^{\circ}$ højere end December-Mittelvarmen af de 7 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $1,59^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Mittelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. — Laveste Barmegrad paa Landbohøjskolen habdes d. 10de med $-8,0^{\circ}$ C.

Regnmængden har været meget stor. — Ved Kjøbenhavn bringer December Maaned i Gjennemsnit 20,10 Linier. — Gjennemsnittet af alle 26 Stationer har i Aar derimod været 52,56 Linier, altsaa over dobbelt saa meget som almindelig. — Mest Regn faldt paa Zerne, nemlig i Gjennemsnit 56,81 Linier i 24 Dage, medens Jyllands 12 Stationer i Gjennemsnit fik 47,60 Lin. i 21 Dage.

December var meget stormfuld, og stærke Stormhvirvler fulgte ofte umiddelbart efter hinanden. — Barometret har derfor ogsaa gjennemgaaende staaet lavt, kun i 6 Dage har det været over 28 Tommer, og flere Gange har det været ualmindelig lavt, navnlig i Slutningen af Maaned'en. — Fra d. 22de om Morgenen til d. 30te om Aftenen naaede det saaledes ikke op over $27'' 6,5'''$; lavest stod det d. 27de, nemlig $26'' 8,8'''$, umiddelbart før de stærke Storme d. 28de og 30te.