

Vejrforholdene

i Marts Maaned 1869 paa Landhusholdningssekskabets Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Vinter.	Regn- og Sne- bøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	0,55	26de	4,33	14de	÷ 5,93	—	7,40	16	•
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	0,44	25de	4,87	7de	÷ 4,07	—	5,43	5	80
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	0,34	25de	5,27	14de	÷ 6,00	—	5,09	9	73
Eftelund (Stodborg- hus), ved Læge Bay	0,32	20de og 26de	3,47	3die	÷ 6,07	—	5,96	7	85
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	0,16	26de	4,27	14de	÷ 5,03	—	8,14	8	86
Daugaard (Vejlø), ved Landinspektør Lind- hardt	0,27	26de	4,57	13de	÷ 2,93	27" 8,77	18,15	14	89
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	1,04	18de	4,80	7de	÷ 2,30	—	5,76	8	•
Kyslinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	1,00	18de	4,33	3die	÷ 1,10	—	6,01	11	•
Hindholm (Næstved), ved Aulksbestyrer Hansen	0,91	18de	5,07	14de	÷ 1,43	—	6,31	9	83
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- sistent Greve	0,81	18de	4,20	1ste	÷ 1,37	27" 11,18	6,20	10	•
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	0,91	27de	3,53	1ste	÷ 1,53	27" 10,75	10,49	10	85
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Elaufen	0,62	18de	3,53	4de	÷ 1,87	—	6,28	15	83

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne see Side 78.

Marts Maaned har iaar i Modsetning til de foregaaende Maaneder været lidt koldere end almindelig, og navnlig har Sylland haft det en Del koldere. Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har nemlig kun været 0,41° C., hvilket er 0,43° lavere end Marts-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Sekskabets Stationer og 0,54° lavere end Kjøbenhavns-Middelvarmen for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser.

Løveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde den 4de med \div 6,5° C. Den første Halvdel af Maanedens var den koldeste, og der faldt lidt Sne; men baade Sne- og Regnfaldet var isvrigt meget lille i Marts Maaned, og udgjorde i Gjennemsnit af de ovennævnte 12 Stationer kun 7,6 Linier eller omtrent $\frac{1}{3}$ Del af den almindelige Nedslagsmængde for Marts.

Maanedens var altsaa baade kold og tør, og de østlige og nordlige Vindretninger vare ogsaa stærkt fremherskende, hvorimod der i Modsetning til de foregaaende Vintermaaneder kun kom faa og svage Stormhvirvler hen over os.

Da en Del af Nedslaget i Marts Maaned har været Sne, kan der ikke meddeles Jagttagelser fra Regnstationerne, hvor der ingen Snemaaler findes.

April 1869.

	Middelvarme (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøide i Linier.	Regnbøgenes Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Bl. 2 i Dct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	5,87	27de	12,20	12te	1,27	•	12,22	12	72
Larm	7,40	27de	14,87	1ste	2,77	•	8,65	6	67
Biborg	7,54	27de	15,87	2den	1,40	•	6,24	6	59
Estelund	7,63	27de	15,27	1ste	2,20	•	4,89	5	65
Gjerlev	7,08	27de	14,47	1ste	1,53	•	8,43	5	64
Daugaard	7,44	27de	14,90	1ste	1,23	27" 11,00	7,58	12	68
Majbølgaard . .	8,26	26de	16,13	1ste	1,30	•	5,28	7	•
Ryslinge	8,15	28de	15,97	1ste	2,20	•	9,08	9	68
Sindholm	8,15	27de	15,60	1ste	2,57	•	10,76	8	68
Landbohøjskolen.	7,47	27de	14,77	1ste	2,30	28" 1,44	4,41	8	64
Næsgaard	7,59	28de	14,40	1ste	1,97	28" 1,29	3,32	6	72
Ect. Nicolai . . .	6,81	27de	13,67	1ste	1,47	•	18,05	12	70

Regnhøjde i Skovegne:

a) Silkeborg-Frysenborg:

Grønåst	5,29	Linier
Kalbysgaard	8,50	—
Kraghslund	7,58	—

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum	5,79	Linier.
St. Haretkov	2,21	—

Regnhøjden ved Drnselund paa Samsø har været 5,40 Linier.

do.	paa Taarnborg ved Korsør	7,07	—
do.	ved Bullkehavn Mølle paa Taasinge	5,53	—
do.	„ Lille Kjøbelevgaard ved Raskov	0,45	—
do.	„ Lovisehøjt ved Helsingør	5,36	—

April Maaned har været meget varm og tør. Middelvarmen af de ovennævnte 12 Stationer har været 7,45° C. hvilket er 2,08° højere end

April=Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $1,90^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maa= ned efter 82 Aars Jagttagelser. Laveste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 10de med $4,2^{\circ}$ C. Det var navnlig Maaanedens sidste Halvdel, der var usædvanlig varm, og skjøndt Nætterne vare klare og stille havde der dog ikke nogen Nattefrost af Betydning inden April Maaanedes Udgang. Vegetationen udviklede sig derfor hurtig, men paa Grund af den stærke Tørre ikke kraftig.

Sels April Maaanedes Regnmængde paa Selskabets Stationer var nemlig kun halv saa stor, som den plejer at være, og i den sidste Halvdel af Maa= neneden faldt saa at sige ingen Regn, men derimod allerede fra omtrent den 20de en ret god Dug, som den stærke Solvarme strax om Morgenen imid= lertid hurtig borttørrede. Kun paa Bornholm faldt den almindelige Mængde Regn; af det øvrige Land fik især det østlige Sjælland og Volland= Falster meget lidt Regn; Vest-Volland (Lille Kjøbelevgaard) fik ej engang $\frac{1}{2}$ Linie Regn, og da denne tilmed var fordelt paa 5 Gange, kunde den ikke bløde ned i den fra forrige Sommer og den forløbne Vinter temmelig tørre Jord.
