

Bejrforholdene

i December Maaned 1869 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelvarme. ($^{\circ}$ G).	Barmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og En- højde i Minutter.	Regn- og En- højde i Minutter.	Middel- værdi af Enhedsprisen Kl. 2 i øre.
		Dag.	Barme.	Dag.	Barme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg	0,59	14de	5,33	25de	-5,20	—	25,92	17	88
Tarm (Barde), ved Lærer Nasmussen .	0,60	14de	5,03	27. & 28.	-5,73	—	24,33	15	90
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	-0,01	14de	4,40	28de	-7,33	—	30,53	13	79
Eskelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	0,42	5te	4,07	27de	-6,20	—	33,38	10	"
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	0,80	14de	4,70	28de	-6,80	—	29,54	12	93
Daugaard (Bejle), ved Landinspektør Lind- hardt	0,50	19de	4,97	28de	-6,70	27" 8,74	34,22	18	95
Majbøgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jessen . . .	1,41	4de	4,70	26de	-3,17	—	29,70	20	"
Myllinge (Odense), ved Lærer M. Jørgensen	0,72	19de	4,90	28de	-6,20	—	29,11	18	"
Hindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen	0,77	19de	4,13	26de	-3,73	—	28,08	23	94
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Afsi- stent Greve	1,11	20de	4,10	28de	-4,57	27" 11,44	14,87	18	"
Næsgaard (Stubbe- fjøbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	1,52	19de	5,40	28de	-3,53	27" 11,05	28,88	15	93
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	1,25	20de	3,93	27de	-2,07	—	29,45	25	93

Barmen iagttagtes daglig Kl. 8, 2 og 10; Middeltallet af disse Tagt-
tagelser giver ikke Døgnets sande Middelvarme; denne faaes derimod nogen-
lunde nøjagtig ved at tage Middelværdien af Barmeriagttagelserne Kl. 7,
12 og 11; paa Landbohøjskolen er Barmeren iagttaget til alle disse 6 Klokke-
slet fra 1861-65; den Forstjel, som derved er fundet at være mellem Tagt-
tagelserne Kl. 7, 12, 11 og Kl. 8, 2, 10 for hver enkelt af Aarets Maan-
eder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettelse for den
tilsvarende Maaneds Tagtagelser.

Luftens Middeltryk er bestemt ved Jagttagelser Kl. 8, 2 og 10.

Middelvarmen af ovennevnte 12 Stationer har været $0,81^{\circ}$ C., hvilket er $0,83^{\circ}$ lavere end December-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og $0,13^{\circ}$ lavere end Københavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Barmegrad paa Landbohøjskolen havdes d. 19de med $7,0^{\circ}$ C., og laveste Barmegrad d. 28de med $\frac{1}{2} 9,7^{\circ}$ C.

Indtil den 24de holdt Varmen sig temmelig stadig et Par Grader over Frysepunktet; men den Storm fra NØ, der var begyndt den 23de, bragte Varmen under Frysepunktet, og da Binden blev staende i NØ. indtil den 27de Aften, naaede Varmen først den 29de atter lidt over Frysepunktet.

I December faldt stadig og temmelig stærk Regn, og i Begyndelsen af Maaneden samt i de 2 sidste Hæftdøgn faldt en Del Sne, især i Jylland. I Gjennemsnit af ovenstaende 12 Stationer var Nedslagsmængden 28,17 Linier, medens den almindelig er 20,1 Linier. Gjennemsnittet af Jagttagelserne paa Jyllands 6 Stationer giver 29,65 Linier og paa Øernes 6 Stationer 26,68 Linier.

De sædvanlige Jagttagelser over Regnhøjden i Skovegne kunne ikke medtages denne Gang, da de dertil oprettede Stationer ikke ere forsynede med Snemaaler, og en betydelig Del af Nedslaget har været Sne. Paa Taarnborg er faldet 19,48 Lin. Regn og Sne.