

Vejrforholdene

i Januar Maaned 1870 paa Landhusholdningssekskabets Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regn- og Sne- høide i Linier.	Regn- og Sne- begenes Antal.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.			
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	0,47	9de	4,53	20de	÷3,07	—	27,43	11
Larm (Barde), ved Lærer Rasmussen .	0,78	9de	4,27	20de	÷2,73	—	19,77	13
Viborg, ved Distrikts- læge Berg	÷0,21	9de	4,33	27de	÷4,40	—	19,78	11
Effelund (Stodborg- hus), ved Læge Van	1,01	9de	4,13	21de	÷4,20	—	19,73	9
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	0,77	9de	5,13	20de	÷3,03	—	19,71	9
Daugaard (Vejele), ved Landinspektør Lind- hardt	0,52	8de	4,63	25de	÷3,03	27"10,56	29,20	15
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	1,41	4de	5,43	21de	÷1,87	—	13,88	17
Nystringe (Odense), ved Lærer M. Sorgenfen	0,71	8de	4,73	21de	÷3,40	—	18,95	16
Sindholm (Rastved), ved Lærer Chri- stensen	0,55	9de	4,50	25de	÷4,43	—	20,38	18
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Greve	0,52	9de	4,50	25de	÷4,63	28" 1,22	14,80	15
Ræsgaard (Stubbe- løbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	1,01	9de	5,00	25de	÷4,13	28" 1,08	15,83	17
St. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	0,50	9de	4,07	25de	÷3,93	—	11,78	23

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 79.

Den første Halvdel af Januar var mild; Varmen sank kun enkeltvis under Frysepunktet og holdt sig i Reglen et Par Grader derover; men da Vinden den 16de gik om til at blive nordlig og i flere Dage holdt sig nordøstlig, sank Varmen og holdt sig næsten stadig under Frysepunktet i den øvrige Del af Maanedens. Hele Maanedens Middelvarme af ovennævnte 12 Stationer har været 0,67° C. hvilket er 1,09° højere end Ja-
nuar-Middelvarmen af de foregaaende 9 Aars Jagttagelser paa Selskabets

Stationer og $1,87^{\circ}$ højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maa-
ned efter 82 Aars Jagttagelser. At Viborgs Middelvarme har været saa
lav hidrører navnlig fra at Aftenerne og Morgenerne (og rimeligvis ogsaa
Nætterne) have været meget kolde. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen
havdes den 9de med $6,0^{\circ}$ C. og laveste Varmegrad den 25de med $-7,0^{\circ}$ C.

Indtil Vejrforandringen midt i Maaeneden faldt der temmelig stadigt
Regn og lidt Sne over hele Landet, men den sidste Halvdel af Maaeneden
bragte derimod intet Nedslag i Jylland, medens Æerne, navnlig Bornholm,
temmelig jævnt fik lidt Regn og Sne. Æerne havde derfor et større Antal
Nedslagsdage end Jylland, men Regn- og Snemængden var større i Jyl-
land end paa Æerne. Paa Jyllands 6 Stationer faldt der nemlig i 11
Regn- og Snedage 22,60 Linier Vand, og paa Æernes 6 Stationer i 18
Regn- og Snedage 15,94 Linier Vand. Den almindelige Regn- og Sne-
mængde i Januar er 20,6 Linier. Regnhøjden paa Taarnborg ved Korsør
har været 15,50 Linier.

Kun fra d. 7de—9de habdes en lille Storm fra SV. med temmelig
lav Barometerstand.
