

Vejrforholdene

i Maj Maaned 1870 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelvarme. (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- vægnens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pgt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg	9,27	19de	14,13	2den	5,33	—	16,38	11	71
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	9,13	16de	14,20	3die	3,47	—	9,45	8	67
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	10,09	22de	14,87	3die	3,93	—	13,02	8	57
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	9,85	16de	15,53	3die	3,57	—	6,26	4	66
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	10,44	19de	15,80	3die	4,43	—	13,36	11	60
Daugaard (Bejle), ved Landinspektør Lind- hardt	9,99	16de	15,80	3die	3,77	27"10,10	8,82	12	65
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	9,82	20de	15,03	4de	5,73	—	7,67	8	•
Ryslinge (Dense), ved Lærer M. Sorgensten	9,76	19de	15,93	3die	3,57	—	9,02	10	63
Sindholm (Rastved), ved Lærer Chri- stensen	10,57	19de	16,40	5te	5,73	—	14,86	10	65
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asfi- stent Greve	10,47	19de	17,93	4de	4,77	28" 0,62	8,49	12	60
Ræsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	10,51	20de	17,73	4de	4,53	28" 0,52	14,52	11	66
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	9,16	16de	14,67	4de	4,00	—	17,27	15	•

Regnhøjde i Skovene:

a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresnede 14,37 Linier.

Guldforskov 6,20 —

Rødbæk 5,33 —

Grønbæk 6,18 —

Kalbygaard 9,59 —

Kraghlund 12,25 —

b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum 8,63 Linier.

Humletofte 15,54 —

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været	6,78	Linier.
do. paa Taarnborg ved Korsør	5,22	—
do. ved Buttehave Mølle paa Laasinge .	10,19	—
do. „ Lille Kjøbelevgaard ved Naffkov .	13,18	—
do. paa Lovisehøft ved Helsingør	18,04	—

Angaaende Reglerne for Jagttagerne se Side 79.

Begyndelsen af Maj Maaned var kold; det første Femdøgn's Middelsvarme naaede paa de fleste Steder kun 5—6°; men efterhaanden steg Varmen, og i det 4de Femdøgn var Middelsvarmen 9—10° højere end i Begyndelsen af Maanedens. Efter den 20de faldt Varmen atter indtil Maanedens Udgang, og i det sidste Femdøgn var Middelsvarmen kun 10—11°.

Middelsvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 9,92° C., hvilket er 0,29° højere end Maj-Middelsvarmen af de 9 foregaaende Aars Jagttager paa Selskabet's Stationer og 10,03° lavere end Kjøbenhavn's Middelsvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttager. Højestes Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 22de med 22,9° C. og laveste Varmegrad d. 5te med 0,4° C.

Ligesom de foregaaende Maaneder har ogsaa Maj kun bragt lidt Regn, nemlig i Gjennemsnit af alle Stationer 1,82 Linier; medens den almindelige er 17,8 Linier. Regnmængden har været nogenlunde ens fordelt mellem Nerne og Halvøen, idet de første i Gjennemsnit have faaet 11,49 Lin. og Sydland 10,10 Lin.; derimod er Ufligheden mellem de enkelte Stationer forholdsvis temmelig stor.

Juni 1870.

	Middelsvarme (C°).	Varmeste Dag.		Kuldeste Dag.		Luftens Middels- tryk.	Regnhøide i Linier.	Regndøgnets Aantal	Luftens Middels- fugtighedsgrad R 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	13,15	17de	21,60	11te	9,13	—	14,23	9	65
Larm	13,15	17de	22,93	12te	10,13	—	24,48	11	65
Viborg	13,71	17de	21,53	1fte	9,93	—	13,11	9	58
Estelund	13,26	17de	22,07	10de	9,07	—	13,53	7	63
Gjerlev	14,01	17de	23,67	10de	9,40	—	12,00	9	56
Daugaard	13,41	17de	22,20	12te	8,40	27" 10,27	15,30	12	63
Rajbølgaard . .	13,96	17de	21,13	12te	11,27	—	24,13	17	65
Ryslinge	13,39	17de	23,10	12te	8,53	—	16,59	15	63
Hindholm	14,26	17de	21,30	12te	10,23	—	14,92	14	64
Landbohøjskolen.	14,16	17de	20,17	13de	10,47	28" 0,75	14,90	15	58
Næsgaard	13,66	18de	18,53	12te	9,73	28" 0,66	26,78	14	71
Sct. Nicolai . . .	13,12	17de	21,20	25de	9,00	—	28,42	14	76

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsenborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørrefsnede . . . 8,10 Linier	Smørum . . 19,20 Linier
Guldsforhoved . . . 5,64 —	Humletofte . . 9,60 —
Grønbaek 19,27 —	
Kalbysgaard 24,78 —	
Kraghslund 16,38 —	
Regnhøjden ved Drøslund paa Samsø har været . . 19,77 Linier	
do. paa Taarnborg ved Korsør — — . . 19,72 —	
do. paa Lovisehøft ved Helsingør — — . . 18,36 —	

Angaaende Reglerne for Sagttagelserne se Side 79.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer har været 13,60° C., hvilket er 0,30° lavere end Juni-Middelvarmen af de 9 foregaaende Aars Sagttagelser paa Selskabets Stationer og 1,88° lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Højest Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 17de med 25,1° C. og laveste Varmegrad d. 9de og 10de med 5,4° C. Det 1ste og 3die Femdøgn i Maanedén vare de koldeste.

Ogsaa i Juni Maaned var Regnmængden betydelig ringere end den almindelig plejer at være, nemlig kun $\frac{2}{3}$ deraf, idet Middeltallet af alle Stationers Regnmængde var 17,24 Linier, medens den plejer at være 25,2 Linier. Regnmængden var meget ulige fordelt mellem de forskjellige Egne; Hedesstationerne i Sjælland og Egnen Nord for Kjøbenhavn fik kun $\frac{1}{3}$ af den almindelige Regnmængde, medens Bornholm og Næsgaard endog fik lidt mere end almindeligt. Derne fik i Gjennemsnit lidt mere Regn end Sjælland. Paa Dernes 11 Stationer faldt nemlig 19,31 Linier i 15 Regndage, medens der i Sjælland kun faldt 15,17 Linier i 10 Regndage.