

## Vejrforholdene

i Marts Maaned 1871 paa Landhusholdningssejlskabets Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Regn- og Sne- begens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pct.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg . . . . .	2,72	25de	6,20	1fte og 2den	-0,13	—	7,66	9	75
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen . . . . .	3,26	24de	7,87	1fte	-1,40	—	8,93	7	"
Biborg, ved Distrikts- læge Berg . . . . .	3,21	21de	7,47	1fte	-2,53	—	2,22	4	82
Effelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen . . . . .	2,72	25de	7,80	2den	-3,27	—	10,08	6	96
Daugaard (Veje), ved Landinspektør Lind- hardt . . . . .	3,96	25de	8,20	1fte	-1,07	—	5,19	5	69
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . . . .	3,04	25de	7,43	1fte	-1,57	27" 11,08	9,79	8	77
Myslinge (Odense), ved Lærer Thomsen . . . . .	3,49	23de	7,70	2den	-1,67	—	5,08	8	"
Hindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen . . . . .	3,03	25de	8,00	1fte	-2,50	—	10,11	12	78
Sindholm (Næstved), ved Lærer Chri- stensen . . . . .	3,29	25de	8,10	2den	-0,60	—	7,69	12	77
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- stent Forsberg . . . . .	2,85	22de	6,47	1fte	-1,23	28" 1,81	8,46	10	78
Næsgaard (Stubbe- løbing), ved Ober- lærer Lacoppidan . . . . .	3,36	12te	8,20	1fte	-1,03	28" 1,49	7,98	10	76
St. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen . . . . .	2,19	25de	6,87	1fte	-2,53	—	7,03	12	82

Regn- og Snehøjden paa Taarnborg ved Korsør (Zusitsraad Beck)  
var . . . . . 4,28 Linier

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var 3,09° C., hvilket er 2,40° højere end Marts-Middelvarmen af de 10 foregaaende Mars Jagt-  
tagelser paa Sejlskabets Stationer og 2,14° højere end Kjøbenhavns Mid-

delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Sagttagelser. Høieste Varme-grad paa Landbohøjskolen havde d. 22de med 12,6° C. og laveste Varme-grad d. 1ste med  $\div 6,7^{\circ}$  C.

Marts Maaned var altsaa meget mild, men der havde jævnlig Nattefrost, især i Slutningen af Maanedebn, da Vættehimlen var skyfri og klar.

Regnmængden var meget ringe; den almindelige Regnmængde for Marts er 18,8 Linier; iaar var den kun 7,25 L., men omtrent ligelig fordelt over hele Landet, nemlig i Gjennemsnit 7,73 L. paa Nerne og 7,31 L. i Sylland.

Enblige og vestlige Vinde vare fremherskende.

### April 1871.

	Middelvarme (C°).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- tryk.	Regnhøje i Linier.	Regnbøgenes Antal	Luftens Middel- fugtighedsgrad i pCt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup . . .	3,00	30te	7,33	22de	0,33	—	17,75	8	63
Larm . . . . .	3,63	28 & 29	7,07	5te	1,07	—	7,29	4	„
Viborg . . . . .	4,01	20de	8,00	5te	1,93	—	11,42	4	73
Esselund . . . . .	3,47	20de	7,40	5te	0,00	—	11,94	7	95
Gjerlev . . . . .	4,00	20de	9,20	5te	0,87	—	18,70	9	59
Daugaard . . . . .	3,50	20de	7,53	5te	0,40	27" 8,16	16,10	8	67
Majbølgaard . . .	4,16	29de	7,37	2den	1,33	—	8,39	18	„
Ryslinge . . . . .	3,32	20de	7,60	5te	0,73	—	15,92	13	73
Hindholm . . . . .	4,03	20de	8,97	5te	1,27	—	13,21	12	64
Landbohøjskolen.	3,66	21de	8,43	5te	0,67	27"10,76	9,50	18	64
Næsgaard . . . . .	3,88	20de	9,20	5te	1,47	27"10,41	20,43	12	71
St. Nicolai . . . . .	2,76	20 & 29	7,00	5te	0,47	—	10,94	17	78

### Regnhøjde i Skovegne:

#### a) Silkeborg-Frynsborg:

Nørresnede . . . . .	14,79	Linier
Guldforskov . . . . .	17,53	—
Grønbaek . . . . .	11,38	—
Kalbygaard . . . . .	19,40	—
Kraghslund . . . . .	19,98	—

#### b) Frederiksdal ved Fursøen:

Smørum . . . . .	11,13	Linier
Humletofte . . . . .	20,37	—

Regnhøjden ved Drnslund paa Samsø har været . . . . .	13,15	Linier
do. paa Taarnborg ved Korsør . . . . .	9,27	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . . . .	14,53	—
do. „ Lillekjøbelevgaard ved Næstov . . . . .	17,45	—
do. paa Lovisehøst ved Helsingør . . . . .	19,11	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 12 Stationer var  $3,62^{\circ}$  C., hvilket er  $2,02^{\circ}$  lavere end April-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og  $1,93^{\circ}$  lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Høieste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 20de med  $12,0^{\circ}$  C. og laveste Varmegrad d. 15de med  $-5,0^{\circ}$  C.

April Maaned var altsaa meget kold, og Vinden var ogsaa overvejende nordvestlig og østlig, og gif flere Gange over til stærke men kortvarige Storme, som navnlig i den første Uge jævnlig ledsagedes af Hagelbyger. Regnmængden var ikke saa stor som almindelig, nemlig i Gjennemsnit af alle Stationer kun 14,6 Linier, medens den i Almindelighed for Kjøbenhavn er 17,4 Linier. Derne fik oftere Regn end Sjælland, nemlig paa 15 Dage imod 7, men den faldne Regnmængde var dog mindre paa Derne end i Sjælland, nemlig henholdsvis 14,1 L. og 15,1 L.

---