

Vejrforholdene

i Oktober Maaned 1871 paa Landhusholdningselskabets Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel= tryk.	Regn- og Sne- høje i Linier.	Sne- bæges Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad Sl. 2 i pG.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Bi- borg	5,43	22de	10,00	3die	2,13	—	18,00	6	78
Tarm) (Varde), ved Lærer Rasmussen .	6,22	14de	10,67	27de	0,07	—	11,13	6	"
Nordby (Fana) ved Overlærer Lauridsen	7,22	6te	10,87	27de	1,67	28" 1,72	17,63	11	82
Biborg, ved Distrikts- læge Berg	6,17	7de	9,80	27de	2,87	—	6,63	4	71
Eskelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	5,76	7de	10,73	27de	1,80	—	10,03	5	80
Gjerlev (Manders), ved Lærer Frederiksen .	6,99	22de	11,33	1ste	3,47	—	13,54	6	71
Daugaard (Bejle), ved Lærer Lindhardt .	6,38	14de	10,60	27de	2,10	27" 11,16	17,41	8	78
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	6,86	{6te og 14de	9,73	27de	1,53	—	3,00	3	"
Ryðlinge (Odense), ved Lærer Thomsen . .	6,26	7de	10,73	27de	1,93	—	19,26	8	82
Hindholm (Næstved), ved Forvalter Niel- sen	6,35	7de	11,40	27de	2,53	—	14,46	7	79
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Asst- sent Forsberg . . .	6,34	7de	11,27	11te	3,00	28" 1,99	7,40	7	76
Næsgaard (Stubbe- kjøbing), ved Over- lærer Facoppidan .	6,95	7de	11,53	27de	2,07	28" 1,64	13,48	12	82
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen	6,06	7de	10,33	11te	2,20	—	15,74	18	81

Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:	b) Frederiksdal ved Fursøen:
Nørrefne 7,25 Linier	Smørum 9,66 Linier
Grønåb 5,73 —	Hummeltofte 16,53 —
Kalbygaard 6,12 —	
Kraghlund 9,52 —	

Regnhøjden ved Truslund paa Samsø har været . . .	6,50	Linier
do. " Langøre " do. — . . .	11,53	—
do. paa Taarnborg ved Korsør — . . .	11,19	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . .	11,63	—
do. " Lillekjøbelevgaard ved Natstov . . .	6,91	—
do. paa Lovisehøst ved Helsingør	11,07	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 87.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var $6,38^{\circ}$ C., hvilket er $1,56^{\circ}$ lavere end Oktober-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selstabets Stationer og $2,43^{\circ}$ lavere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højest Barmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 7de med $13,0^{\circ}$ C. og laveste Barmegrad d. 26de med $-2,5^{\circ}$ C.

Oktober Maaned var altsaa kold, og hvorvel Dagene fra d. 9de til 12te og efter d. 25de samt for det nordlige og vestlige Jyllands Bedkommende tillige Maanedens Begyndelse var noget koldere end den øvrige Del af Maaned, holdt Barmen sig dog ualmindelig ens, og Vejret var meget stadigt.

Desuden var Maaned og især dens sidste Halvdel ogsaa meget tør; der faldt kun den halve — nemlig 11,25 Linier — af den almindelige Regnmængde for Oktober, som er 25,8 Linier. — Der var vel stor Ulighed mellem de enkelte Stationers Regnmængde, men i det Hele taget fik Øerne og Jylland omtrent lige megen Regn, nemlig i Gjennemsnit af Øernes 14 Stationer 11,31 Linier i 9 Regndage og af Jyllands 11 Stationer 11,18 Linier i 7 Regndage.

De sydhøflige Vinde vare stærkt fremherskende især i Maanedens sidste Halvdel, og Lufttrykket var da temmelig højt.
