

## Vejrforholdene

i April Maaaned 1872 paa Landhuusholdningssekskabet's Stationer.

	Middelvarme. (°C).	Varmeste Dag.		Koldeste Dag.		Luftens Middel- temp.	Regn- og Sne- høide i Linier.	Regn- og Sne- dagens Antal.	Luftens Middel- fugtighedsgrad R. 2 i pēt.
		Dag.	Varme.	Dag.	Varme.				
Smidstrup (Hjørring), ved Forstander Vi- borg . . . . .	4,88	12te	10,40	5te	0,00	—	35,37	14	77
Larm (Varde), ved Lærer Rasmussen .	6,71	28de	14,07	5te	2,80	—	20,11	8	„
Nordby (København) ved Overlærer Lauridsen	7,12	28de	13,83	5te	3,63	27"11,94	13,59	12	78
Viborg, ved Distrikts- læge Berg . . . . .	6,16	27de	11,27	3die	1,40	—	20,97	13	71
Eftelund (Skodborg- hus), ved Læge Bay	6,30	28de	13,53	5te	2,07	—	15,49	5	75
Gjerlev (Randers), ved Lærer Frederiksen .	7,12	27de	12,87	3die	2,60	—	20,94	11	69
Daugaard (Vejlse), ved Lærer Lindhardt .	6,30	26de	11,97	5te	2,10	27" 9,28	16,13	9	77
Majbølgaard (Søn- derborg), ved Pro- prietær Jesen . . .	6,67	27de	11,07	5te	3,13	—	16,50	7	„
Knslinge (Odense), ved Lærer P. Thomsen	6,29	26de	12,20	5te	1,80	—	15,19	12	78
Hindholm (Næstved), ved Lærer Møller .	6,99	26de	13,77	5te	2,17	—	26,97	13	74
Landbohøjskolen (Kjø- benhavn), ved Assi- sient Forsberg . . .	6,73	29de	13,00	4de	2,73	27"11,69	20,83	11	„
Næsgaard (Stubbe- høbing), ved Over- lærer Lacoppidan .	6,40	25de	11,13	5te	2,07	27"11,48	21,23	10	79
Sct. Nicolai (Born- holm) ved Lærer Clausen . . . . .	5,69	29de	12,60	5te	1,00	—	25,88	19	81

## Regnhøjde i Stovegne:

a) Silkeborg-Frynsborg:  
Nørresnede . . . 16,75 Linier  
Guldforkoved . . 16,68 —  
Grønbal . . . . 21,53 —  
Ralbysgaard . . . 12,70 —

b) Frederiksdal ved Fursøen:  
Smørum . . . . . 19,46 Linier  
Hummeltofte . . . 24,13 —  
St. Hareftov . . . 15,25 —

Regnhøjden ved Ornslund paa Samsø har været . . .	31,98	Linier
do. „ Langøre „ do. . . . .	31,09	—
do. paa Taarnborg ved Korsør . . . . .	18,61	—
do. ved Bukkehøve Mølle paa Thorseng . . . .	19,02	—
do. „ Lillekjøbelevgaard ved Raskov . . . .	14,93	—
do. paa Lovisehøft ved Sølfingør . . . . .	29,35	—

Angaaende Reglerne for Jagttagelserne se Side 71.

Middelvarmen af ovennævnte 13 Stationer var  $6,41^{\circ}$  C., hvilket er  $0,96^{\circ}$  højere end April-Middelvarmen af de 11 foregaaende Aars Jagttagelser paa Selskabets Stationer og  $0,86^{\circ}$  højere end Kjøbenhavns Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Jagttagelser. Højeste Varmegrad paa Landbohøjskolen havde d. 29de med  $17,0^{\circ}$  C. og laveste Varmegrad d. 7de med  $-2,5^{\circ}$  C.

April Maaned var altsaa forholdsvis mild iaar, og Varmen var jævnt stigende med Undtagelse af nogle kolde Dage fra d. 16de til d. 22de; Vattefrost havde vel enkelte Gange i Maanedens første Halvdel, men den var ikke stærk og gjorde næppe synderlig Skade paa Vegetationen.

Regnmængden var i Gjennemsnit lidt større end almindelig, nemlig 20,80 Linier mod 17,4 L.; Derne fik i Gjennemsnit 22,03 L. i 12 Regndage og Sylland 19,11 Linier i 11 Regndage.

Fleere Gange i Maaneben havde temmelig stærk Storm.